

CATALOGUS
STIRPIUM

IN

Exteris Regionibus

A nobis Observatarum;

Quæ vel non omnino vel parcè admodum

IN

ANGLIA

Sponte proveniunt.



LONDINI:

Typis *Andree Clark*, Impensis *J. Martyn* Regalis Societatis
Typographi, apud quem possunt ad insigne Campanæ
in Cœmeterio Divi Pauli. MDC LXXIII.

Exercice 1

[illegible]

151

[illegible]

bi
te
pe
P
te
di
ba
im
C
B
op
qu
A
fix
tu
m
P

eò
Q
qu
su
P
qu
g
fi
fi
q

PRÆFATIO.



Cito plus minus abbinc annis plantarum indagandarum studio in transmarinas regiones profectus Germaniæ utriusq;, Italiæ, Galliæ bonam partem peragravi. Cujus itineris quis fructus fuerit, quem nunc exhibeo Stirpium exoticarum Catalogus, Amice Lector, te certiores faciet. An tibi titulos & nomina nuda perlegere jucundum futurum sit nescio; mihi certe Plantas ipsas liberas & spontis suæ quales eas alma tellus è benigno suo sinu effundit, contemplanti incredibilis quædam voluptas oborta est: nec minus gaudebam (ut cum Clusio loquar) nova aliqua stirpe primùm inventa quàm si amplissimum thesaurum offendissem: Cumq; plurimas quotidie vel mihi antea incognitas, vel Britannia nostræ hospites obvias haberem, magnum me operæ-premium peregrinando fecisse ratus, in Hispaniam quoque profectionem meditabar: verùm prætextu belli, Anglis omnibus publico programme Regis Galliæ è finibus suis excedere jussis, Hispanicum iter minùs tutum fore ratus, in patriam reversus sum. Liceat jam mihi pauca quædam de Plantis in genere à me observata Præfationis loco Catalogo præmittere.

I. Quo ad meridiem & Solis cursum propius accedas èd plures plantarum species sponte oriri animadvertes. Quamvis enim Regiones frigida & Septentrionales suas quoq; stirpes peculiare obtineant, paucissimæ tamen eæ sunt si cum earum multitudine conferantur quæ in temperatis & calidioribus tantùm proveniunt. Cui accedit quòd juga, vertices aut etiam latera montium in Regionibus calidis, cum frigidiorum depressis, planis & sylvosis aeris temperamento quodammodo conveniant, quò fit ut easdem fere stirpes producant, adeoq; nè plantæ quidem Septentrionales Meridionalibus desint.

A d d 2

II. Huius

PRÆFATIO.

II. Huc etiam facit quod secundo in loco à nobis observatum fuit : Montes scilicet excelsos quorum vertices maximam anni partem nivibus operiuntur varietate specierum præcipue abundare. Alpes certè quæ Italiam à Gallia & Germania dividunt inexhausto plantarum penu Botanicorum scrutiniis in hunc usq; diem sufficiunt, magna adhuc nondum proditarum residua multitudine. Quod tanta soli fertilitas dicam an luxuria nivibus debeat extra controversiam est, seu quia velut veste imposita radices foveat & ab injuriis cæli & frigoris vehementiâ defendat, sive quod sale nitroso, quo abundare creditur, terram letificet & fecundet.

III. Arbores nonnullæ in aliis regionibus humiles perpetuò & pusillæ fruticum mensuram non excedunt; in aliis eximiam magnitudinem & staturam assequuntur, cum utrobique spontis suæ sint. Hujusmodi sunt Lentiscus, Arbutus, Juniperus, Buxus, &c. Præterea sunt quæ apud nos satæ & in hortis cultæ teneræ & molles perpetuò manent, adedò ut ad herbarum genus pertinere videantur; quæ tamen ubi sponte exerunt in frutices satîs crassos & lignosos adolescunt, quod in Ricino & Tragio observavimus.

IV. Ejusdem generis arbores aut etiam herbæ in aliis Regionibus vel succos fundunt, vel fructus spurios edunt, in aliis minimè. Sic Fraxinus v.g. in Calabria Manna exudat, cum alibi nè in Italia quidem id faciat. Lentiscus in sola insula Chio Mastichen fundit, ut Bellonius & Hermolaus affirmant: certè in Italia & Gallia Narbonensi, ubi tamen copiosissima est, vel nullam vel paucissimam præbet. Idem observatur in Ferula, Panace Heracleo, Aloe aliisque. Quod ad fructus spurios attinet, Quercus in Italia, Illyrico, Hispania aliisque temperatioribus Gallas edit, cum in Britannia & frigidioribus nullus unquam auditus sit Gal-
larum proventus.

Difficilis questio est, an Plantæ quæpiam nullo semine rario sponte e terra oriantur : (1.) Quod ad imper-
fectas

PRÆFATIO.

scilicet vulgò dictas, Fungos, Tùbera & id genus attinet, manifestum est eas ex semine non nasci cùm nullam gignant. (2.) Ob eandem rationem submarinæ omnes Algæ, Fuci, Coralia, Alcyonia, &c. sponte oriri censende sunt, cùm nullum in iis semen hæcenus animadvertum fuerit; quod tamen imprimis mirum videtur, cùm earum innumera ferè species & ingens ubique proventus sit. (3.) Perfectioniores quoq; quamvis plerunq; Seminì ortum debeant, nonnunquam tamen spontis suæ esse magnum nobis argumentum suppeditat viscus arboribus innatus, etiam in prona seu aversa ramorum parte. Unde omnino fabulosum esse constat quod de ejus ortu Veteres prodiderunt, quodq; Proverbio illi, Turdus malum ipse sibi cacat, originem dedisse perhibetur.

Nec minùs anceps & difficilis quæstio est, An Plantæ aliquæ degenerent & speciem mutant? Cui ut aliqua in parte satisfaciam, dico primò, pro diversis speciebus minimè habendas esse quæcunq; ex ejusdem plantæ semine vulgò oriuntur, quæque speciem suam iterum non propagant, quantumvis accidentibus nonnullis, v. g. floris colore, petalorum gemina aut multiplici serie, aliisve accidentibus à nobis in Præfatione Catalogi Plantarum Angliæ recensitis differant. Cùm enim numerus specierum in natura certus sit & determinatus, floris autem colore, multiplicitate, &c. variantium multitudo novis quotannis exorientibus infinita, meritò eas à specierum gradu & dignitate removemus. Nam si hæc sufficerent ad specificam distinctionem inducendam, certè Æthiops quoq; ab Europæo, Juvenus niger ab albo, rubro variorum specie differret; quod nemo, ut opinor, sanæ mentis unquam concesserit. Hinc Tuliparum, Anemonarum, Caryophyllorum, Auricularum, &c. inexplicabilis varietas ad tres quatuorve species facillè reducitur, cùm reliqua diversitas quæ in floris colore, plenitudine, geminatione, &c. consistit, merè accidentalit sit minimèque specifica, cæli aut soli, ali-

PRÆFATIO.

mentive differentiis imputanda. Quid quod Plantæ hæc in eodem loco (ut alibi monuimus) diutius relicte & neglectæ, paulatim degenerent, florum gratiâ, seu quæ in colorum pulchritudine, seu quæ in petalorum numero spectatur, pereunte, & ad sylvestrium tandem formam & ingenium redeant.

Ob easdem rationes nec figura, color saporve fructus seu pericarpium in Pomis & Pyris essentialem & specificam differentiam arguunt. Quod scilicet fructus his accidentibus diversi ex eodem semine oriuntur, quodque constanti naturæ lege speciem suam semine iterum non propagent. Atque hic obiter monere convenit, varietates seu species novas vulgò creditas Pomorum & Pyrorum ab insitione (quantumvis magna cum fiducia id affirmant arcanorum jactatores) frustra sperari, cum, Fructum perpetuò surculi naturam sequi, mihi pro certo & infallibili in Horticultura axiomate semper fuerit, verum quas habemus differentias semini deberi & ex semine novas indies obtineri posse. Quod ad eò verum est, ut varietates etiam in floribus, foliis, caulibus superius memoratas, (quamvis vel translatione iterata de loco in locum, vel irrigando aquâ colore aliquo imbuta nonnunquam effici possent, Laurembergio, in iis quæ ipse expertus est, Authori & aliisq; affirmantibus fidem non denegaverim) frequentius tamen faciliusq; ex semine in terram pinguem & opulentam aut alio quovis modo à naturali & solita diversam projecto oriri minimè dubium sit. Quantam autem vim & efficaciam habeat ad hæc effecta producenda alimentorum diversitas in domesticis & mansuetis animalibus patet. Cum enim fera in plerisque speciebus eosdem colores servant in universum omnia, mansueta & domestica coloribus infinitum variant, nec coloribus tantum sed & carnis sapore aliisque accidentibus. Cæli soli que diversitas quid in hoc genere possit pluribus exemplis facile esset demonstrare. Hinc in Septentrionalibus frigidis & montibus altissimis maximam anni partem nivibus obiectis Ursi, Vulpes, Lepores, Perdices, Corvi

PRÆFATIO.

Corvi albi non pauci reperiuntur, quæ in temperatioribus rarissimè occurrunt & pro monstris ferè habentur. Hinc in Anglia nostra boves Lancastrenses v.g. mirum quantum à Suffexianis cornuum pulchritudine totâq; specie externâ, à Wallicis & Scoticis magnitudine differant. Idem est & de ovibus, quæ in montosis & sterilioribus adeò parum magnitudine proficiunt ut pro quinque solidis singulæ veneant; in pinguibus verò & temperatis in eam molem excrescunt, ut duas etiam libras nostræ monetæ valeant. Quòd si animalia isthæc mutuo transferas, Septentrionalia sci. aut montosa in locum Meridionalium campestriumve, & vice versâ, pro sapiam suam non diu retinent, verùm paulatim degenerant & ad indigenarum mensuram & indolem accedunt.

Dico secundo, Dari interdum in plantis veram specierum transmutationem omnino concedendum esse, ni testibus auctoribus & gravibus imprimis scriptoribus omnem fidem derogare velimus. Nam Wormius Musei lib. 2. cap. 7. pag. 150. asserit se habere bordeum quod Hermaphroditicum vocat, quia in una spica & bordeum & secale continet, cujus descriptionem vide sis loco citato. Johnsonus quoque apud Gerardum lib. 1. cap. 46. pag. 65. sibi ostensum refert à D. Goodyer spicam Triticæ albi, circa cujus mediam partem tria aut quatuor grana avenacea undiq; perfectâ enata sunt. Et biennio abhinc affirmavit mihi, cùm Oxoniæ essem, Jacobus Bobertus filius, è semine Primulæ veris majoris sibi exortas Primulam vulgarem, & Primulam pratensem inodoram luteam. Observandum autem est, transmutationem hanc dari tantùm inter species cognatas & ejusdem generis participes.

LIBRARY

A



Bies fœmina, sive Ἑλάνη θήληα *J.B. Abies Park.* Abies & Abies mas *Ger.* Nos enim has non distinguimus, quamvis *C. Bauhinus* quoq; *Bellonium* & *Dodonaum* secutus præter Piceam duas faciat Abietis species, nimirum I, i.e. conis sursum spectantibus, sive marem, & II, i.e. albam sive fœminam. Hac de re fusiùs differentem vide *J.B. Bauhinum* qui nec *Bellonium* nec *Dodonaum* Abietem distinctè novissè demonstrat. *The female Fir-tree.* In Sueviæ & Baviaræ sylvis primùm observavimus, postea in Alpibus copiosè. Quæ de Abiete annotavimus vide in *Cat. Ang.*

† Abies mas *Theophr.* Picea Latinorum, sive Abies mas *Theophrasti J.B. Picea Park.* Picea major *Ger.* P. major I, sive Abies rubra *C.B.* Hæc est quam vulgò in Anglia *The Fir-tree* vocant, inque hortis & areis colunt. Cum priore, sed copiosius multò.

Abrotanum fœmina vulgare *Park. fœm. foliis teretibus C.B. Chamæcyparissus J. B. Ger. Common Lavender Cotton.* Circa oppidum *S. Cyriaci* in Etruria copiosè, atq; inde incipiendo ad Statum usq; Ecclesiasticum seu territorium Papæ, secus vias.

N. Ventris lumbricos sumptum interimit, quotidiano experimento muliercularum, tum semen, tum etiam herba. Folia sicca ad sistenda alba fœminarum profluvia conferre scribit *Matthiolum.*

Abrotanum fœmina villosis & incanis foliis *C.B. Seriphium Dioscoridis Abrotani fœm. facie Ad. Lob.* In Galloprovincia, montis celsi *D. Magdalena* cryptâ celebris acclivibus *Lobelio* & nobis observatum. Fragrantius mihi visum est vulgari Abrotano fœm. alioquin ei persimile.

Abrotanum fœmina foliis Ericæ *C.B. Park. Chamæcyparissus unguentaria J.B.* In collibus saxosis circa molen-dina *Nemausi.*

† Abrotanum inodorum *Lob. campestre C.B. Ger. Park. Artemisia tenuifolia* sive leptaphyllos, aliis Abrotanum sylvestre *J.B.* In Germania, Italia & Gallia Narbonensi ad vias & in sterilibus ubiq; ferè. Hanc speciem & in Anglia nuper observavimus, v. *Cat. Ang.*

Abstin-

Abſinthium arboreſcens *Lob. Park.* arboreſcens *Lobellii* *ſ.B.* Abrotanum ſœm. arboreſcens *Ger.* Abr. latifolium arboreſcens *C.B.* Italis & Siculis *Herba bianca. Tree-Wormwood.* In Sicilia, Règno Neapolitano, & inſularum adjacentium rupibus maritimis.

Abſinthium Ponticum & Romanum quibuſdam *ſ.B.* Ait Cæſalpinus in collibus argilloſis agro Senenſi frequens eſſe: quod & nos verum comperimus cùm Florentiâ Romam iremus.

Abſinthium Seriphium Narbonenſe *Park.* Seriph. tenuifolium maritimum Narbon. *ſ.B.* Seriph. Gallicum *C.B.* Propè Portum Liburnum in Italia atque etiam juxta Monſpelium ad maris litus & alibi.

Abſinthium tenuifolium Auſtriacum *Ger. Park.* Auſtr. tenuifolium *ſ.B.* Ponticum tenuifolium Auſtriacum *C.B.* Ad vias non longè à Vienna Auſtriæ quâ ad Neapolin Auſtriacam itur. De Abſinthii facultatibus conſule *Car. Ang.*

Acacia altera trifolia *Ger. II.* ſive trifolia *C.B.* ſecunda, ſeu altera Dioſcoridis *Park.* altera Dioſcoridis notior Europææ, folio Cytifi, facie & ſiliquis Geniſtæ-ſparti ſpinoſi *Lob.* Aſpalathus ſecunda trifolia, quæ Acacia ſecunda Matthiolo trifolia *ſ.B.* In Sicilia propè Meſſanam; Italia circa Neapolin, & Gallo-provincia circa Tolonam portum.

Acanthus ſativus *Lob. Ger. Park.* ſativus vel mollis Virgilii *C.B.* Carduus Acanthus, ſive Branca urſina *ſ.B.* *Brank-urſine or Bears-breech.* In Italiæ meridionalibus circa Baias & Neapolin, itémque in Sicilia copioſè.

N. Eſt è 5 herbis emollientibus. Uſus potiſſimum externus eſt in clyſteribus aliſq; paregoricis quarumcunque formularum & ut plurimum in cataplaſmatis. *Schrod.* Prodeſt etiam, auctore Dodonæo, tabidis, ſanguinem ſpuentibus, ex alto delapſis, icu aliquo aut conatu ſupra vires læſis, non minùſ quam Symphyti majoris radices, quas ſubſtantiâ, lento ſucco, & qualitate proximè reſert.

2. Acanthi folia ob figuræ venuſtatem & elegantiam veteres Architecſti columnarum capituliſ inſculpere ſolebant. Frondibus Acanthi (inquit Vitruvius, lib. 4. cap. 1.) Columnas Corinthiacas coronabant.

Acanthium Illyricum *Park.* Illyric. purpureum *Ger.* Spina tomentofa altera ſpinoſior *C.B.* Carduus quibuſdam dictus Acanthium Illyricum, aliis verò Onopordon *ſ.B.* In Italia, Sicilia & Gallia Narbonenſi frequens occurrit.

Acarua flore purpureo rubente patulo *C.B. Park.* *Acanthoides* parva *Apula Col.* In Sicilia propè Messanam, Italia propè Florentiam, & Gallia Narbonensi propè Monspelium, in arenosis.

Acarua major caule folioso *C.B. Park.* *Acaruæ* similis flore purpureo, *Chamaeleon Salmanticensis Clusio f.B.* Propè montem S. Lupi non longè ab oppidulo *S. Lupian* dicto, itémque juxta vias non longè ab oppidulo *Vic* in valle Frontigniana.

Acer acutioribus foliis Gesn. hort. III. five montanum tenuissimis & acutis foliis *C.B.* *Aceris* majoris varietas altera *f.B.* In montibus Stiria & in Alpibus Sabaudicis propè Genevam.

† *Acer majus Ger. emac. ma.* latifolium, *Sycomorus* falso dictum *Park.* maj. multis falso *Platanus f.B. I.* seu montanum candidum *C.B.* *The Sycomore tree or greater Maple.* In montibus propè Genevam.

Acer majus folio rotundiore minúsq; laciniato. An *Acer II.* i.e. montanum flavum five crispum *C.B.?* Observavimus primò in Hetruriae sylvis non longè à Viterbo, postea etiam in montibus Genevæ vicinis.

Acer trifolium C.B. *Creticum trifolium Park.* *Monspessulanum Lugd. f.B.* In sylva Valena propè montem S. Lupi; itémque in collibus juxta *Castelneuf* pagum Monspelio propinquum. Invenimus etiam propè Gratianopolin, in rupibus juxta pontem quem transimus eundo à la fontaine que brusli.

N. Radix, prodente Plinio, contusa è vino jecinoris doloribus utilissimè imponitur.

Acetosa montana maxima v. Oxalis maxima.

Acetosa Ocymi facie Neapolitana C.B. *Neapolitana Ocymi folio Park.* *Ocymus facie Neapolitana Συκασμυφός Col.* In Sicilia & Regno Neapolitano, in vineis & arenosis frequentissima.

Achillea v. Millefolium.

Acini pulchra specès f.B. *Clinopodium IV.* five montanum *C.B.* *Austriacum Clus. Park.* In ascensu montis Juræ variis in locis. *Stone-Basil.*

Aconitum lycoctonum Napello simile Neubergense, foliis latioribus, flore purpureo f.B. An *Aconitum Napello simile sed minus, cæruleum, præcocius ejusdem?* Hanc plantam in sepibus non longè à Memminga Suevix urbe observavimus.

Aconitum folio Platani, flore luteo pallecente f.B. II. five *lycoctonum luteum C.B. lut.* *Ponticum serotinum Park.* luteum *Ponticum Ger. Yellow Wolf-bane.* In colle

colle *La Bastie*, aliisque montibus Genevæ vicinis copiosè.

N. Facultate est hominibus aliisque animalibus exiti-
ali & perniciosâ. Semen ejus aut radix in pulverem
redacta, & oleo temperata ut unguentum indè fiat,
illitu pediculos ac furfures enecat & abstergit. *Trag.*
Aconitum hyemale Ger. Park. hyem. Belgarum *Lob.* 1, si-
ve unifolium luteum bulbosum *C.B.* Ranunculus cum
flore in medio folio, radice tuberosâ *J.B.* Anemone
Bononiensium nonnullis dicitur, quoniam circa Bono-
niam & per totam etiam Lombardiam copiosissimè pro-
venit, mensis Februarii initio florens.

Aconitum pardalianches v. Thora.

Aconitum racemosum v. Christophoriana.

† *Adiantum ~~acerosum~~* sive furcatum *Thalii.* Filix saxatilis
Tragi. J.B. Park. saxat. V, sive corniculata *C.B.* In
rupium fissuris propè Rhenum Fl. invenimus etiam in
Italia. *Tho. Willifellus* nuper in Scotia, *v. Cat. Ang.*

Adiantum sive Capillus Veneris *J.B.* verum, sive Capil-
lus Veneris verus *Park.* 1, seu foliis Coriandri *C.B.* Ca-
pillus Veneris verus *Ger. Black Maiden-hair.* In humidis
& umbrosis rupibus & puteis, in Gallia Narbonensi &
Italia vulgare.

N. Pulmonum renumq; vitis medetur; epatis & lie-
nis obstructions referat; Urinam & menses ciet, *Schrod.*
Verum de ejus virtutibus & usu integrum libellum scrip-
psit Gallice Petrus Formius M.D. Monspelienfis.

Ægilops Narbonensis Lob. Festuca sive *Æg. Narbonensis*
Park. Festuca Italica *Ger.* Gramen Festucæ XIV, sive
Festuca altera capitulis duris *C.B.* In Sicilia, Italia &
Gallia Narbonensi vulgarissima.

Ageratum purpureum Dalechampii J.B. purpureum *Park.*
serratum *Alpinum C.B.* In rupibus ad radices montis
Salevæ & in ascensu montis Juræ prope Genevam;
Utrobiq; copiosè.

Ageratum Septentrionalium Lob. vulgare, sive Costus hor-
torum minor *Park.* foliis ferratis *C.B.* Ager. plerisq;
Herba Julia quibusdam *J.B.* Balsamita fœmina sive
Ageratum Ger. Maudlin Tanse. In Etruria circa Li-
burnum, Florentiam, &c. itémq; circa Monspelium in
Gallia Narbonensi abundè. *Trago & Matth. Eupatorium*
Mesue dicitur.

N. 1. Substantiæ tenuis est, saporis aromatici, atte-
nuat, extergit, putredini resistit; Epaticum est, laxat
alvum quàm blandissimè. Extrinsecus ciet urinam, ute-
rumq; emollit (suffitu) *Schrod.*

2. E foliis hujus & Ophioglossi contusis inque oleo olivarum bullitis, addito ceræ, resinæ siccæ & Terebinthinæ tantillo, unguentum sive emplastrum efficitur sarcoticum præstantissimum, Gerardo sæpius probatum. *Agnus castus* *Offic.* Ag. folio non serrato *J.B.* *Vitex* foliis angustioribus Cannabæ modo dispositis *C.B.* *Vitex* sive *Agnus castus* *Ger.* *Vitex* sive *Agnus castus* folio angusto *Park.* *The Chast tree.* In Sicilia & Regno Neapolitano satis frequens. Agnum castum Officinæ ineptè appellant, non advertentes castum nihil aliud esse quam expositionem Agni.

N. 1. Calt. & siccatur, insigniter discutit, menses ciet; appetitus Venereos cohibet, semen immittit. *Schrod.* Plurimas ei virtutes ascribunt Veteres, quos consulat qui velit.

2. Athenis, Thesmophoriis Cereris sacro mulieres castitatem custodientes foliis Viticis cubitus sibi sternere solebant, unde ei *Ἀγνός* nomen.

Aizoon v. *Sedum*.

Alaternus major seu prior *Park.* *Bourgespine* *Monspeliensium*, *Alaternus* *Plinii* *Clusio* & *Anguillaræ* *Lob.* *Spina Burgi Monspeliensium* *J.B.* *Philyca* elatior *C.B.* In Italia, præcipuè ad mare inferum, necnon circa *Monspeliolum* in collibus saxosis. Foliorum figurâ & incisuris multum variat.

Alcea pentaphyllea *Park.* *Pentaphylli* folio vel cannabina *J.B.* V, sive cannabina *C.B.* fruticosa cannabina *Ger.* In aggeribus fossarum circa *Monspeliolum*.

Alcea villosa *J.B.* VIII, sive hirsuta *C.B.* minor villosa *Park.* In vinetis circa *Monspeliolum*, & in sepibus non procul *Genavâ*.

Alchimilla minor quinquefolia *C.B.* v. *Pentaphyllum*.

Alcyonium 4 *Dioscoridis* v. *Bursa marina*.

Alcyonium 5 *Dioscoridis*, sive *Auricula marina* *Cas.* *Fungus auricularis* *Cæsalpini* *C.B.* In rupibus aquâ marinâ reftis propè *Portum Liburnum* & alibi juxta *Italiam* & *Siciliam*.

Alkekengi *Lon.* *Halicacabum* sive *Alkakengi* vulgare *Park.* *Solanum bacciferum* II, sive *Vesicarium*, quod folliculi vesicæ inflatæ similes; vel ut *Plin.* l. 21. c. 31. quoniam vesicæ & calculis prodest, *C.B.* *halicacabum* *Ger.* hal. vulgare *J.B.* Primò in sylvis in insula *Danubii* juxta *Viennam Austriæ*; deinde in Italia propè *Romam* in scrobibus invenimus.

N. Hujus baccæ nephriticæ, diureticæ ac lithontripticæ insignes sunt. Usus præcip. in calculo renum & vesicæ

vesicæ, in ictero (baccæ & folia) in sanguine coagulato, *Schrod.* Sumi autem possunt vel vino infusæ, vel in sero lactis aut Zythogalo decoctæ, vel in pulverem redactæ in quovis liquore.

Allium Alpinum v. *Victorialis*.

Allium sphærocephalum purpureum sylvestre *Æ.B.* *Allium* seu *Moly montanum purpureum elegantissimo flore* *Clus. pau.* An *Allium IV*, sive *sphæricum folio latiore* *C.B.* ? In *Germania*.

Allium sylv. bicornæ purpureum proliferum *Æ.B.* ubi accurata ejus habetur & figura & descriptio. *Al. montanum II*, sive *mont. bicornæ angustifolium flore purpurascente* *C.B.* *Moly montanum 2 Clusii Ger.* In *Germania* inter *Lodishemium & Basileam*.

Allium sylv. bicornæ flore obsoleto *C.B.* *bicornæ proliferum flore intus albescente, cum stria purpurascente externè* *Æ.B.* *Genevæ inter segetes freq.*

Allium sylv. perpusillum v. *Moly moschatum*.

Aloe vulgaris *C.B.* *Æ.B.* *vulg. sive sempervivum marinum* *Ger. Park.* In *Sicilia & Melita insulis, in muris & tectis*.

N. 1. *Succus hujus plantæ, Aloe dictus, vim præter purgantem obtinet & exiccantem, calefacientemque; prorit hæmorrhoidas & menses, roborat ventriculum, enecat & expellit lumbricos, arcet putredinem, astringit, consolidat, extergit, adeoq; vulnerarium est insigne.* *Schrod.*

2. *Aloe penè sola medicamentorum quæ alvum solvunt; confirmat etiam stomachum, adeo non infestat vè aliqua contrariâ.* *Plin. Galen. &c.*

3. *Quod frequens Aloes usus hæmorrhoidum venas aperiat, ego (inquit Fuchsius) millies observavi; & vos ex 100 eorum qui Aloe ad excernendas fæces utuntur videbitis 90 hæmorrhoidarum fluxum pati; omisso verò Aloes usu venas illas claudì.*

4. *Cæterum tria Aloes genera in Officinis habentur, (1.) Socotrina, omnium optima & purissima, ab insula Socotora unde advehitur dicta. (2.) Hepatica, colorem hepatis referens, priore impuriore. (3.) Caballina, quæ est Aloes crassamentum, seu pars impuriore, arenosa & fordibus conspurcata, adeoq; caballis seu equis exhibenda. His addit Schroderus (4.) Lucidam, adeo depuratam ut transparens sit: Alii non distinguunt Socotrinam ab Hepatica, ut neq; Lucidam à Socotrinâ; adeoq; duo tantum genera faciunt, Hepaticam scilicet & Caballinam.*

Alopecuros

Alopecuros Ger. genuina Park. Gramen *Alopecuroides* spicâ rotundiore *C.B.* Gr. *Alopecuros* spicâ brevi *J.B.* *Fox-tail.* In Sicilia, Italia & Gallia Narbonensi, præsertim in arenosis, ut v.g. propè oppidum Frontinianam, circa Baias, &c.

Alfne baccifera Ger. scandens baccifera C.B. repens baccifera Park. Cacubalum quibusdam vel *Alfne baccifera J.B.* In sepibus, primò non longè à Francosurto ad Moenum, postea in Italia quoq; & Gallia Narbonensi observavimus.

Alfne folio crasso, an Alfne foetida Fabii Columnæ Dioscoridea J.B. ? Primò se nobis obtulit in Liguria circa Portum Veneris, deinde alibi etiam tum in Italia, tum Sicilia.

† *Alfne foliis hederaceis Rutæ modo divisis Lob. recta triphyllus, sive laciniata Park. IV, sive triphyllus cærulea C.B. folio profundè secto, flore purpureo seu violaceo J.B.* Inter segetes propè Lovanium. Hanc nuper in Anglia invenit T. Willisellus, v. *Cat. Ang.*

Alfne folio oblongo serrato, flore cæruleo J.B. item Erinos Columnæ minor ejusdem. Rapunculus minor foliis incisus C.B. In muris & siccioribus Messanæ & Monspelii. Nos cum primùm hanc vidimus ad speculum Veneris retulimus.

Alfne maxima Lugd. max. Hist. Lugdunensis J.B. Alf. oblongo folio C.B. In sylvosis ad latera montium Juræ & Salevæ propè Genevam.

Alfne muscosa quibusdam J.B. tenuifolia muscosa C.B. Locis humidis ad fontes & aquarum scaturigines in montibus Stirix, itémq; in Jura & Salevæ mox dictis. Flos hujus tetrapetalos est.

Althæa frutex Clusii Ger. Alth. frutescens folio rotundiore incano C.B. Alth. arborescens J.B. Hæc eadem non est cum *Althæa Olbii Ad.* licet Lobelius velit, sed diversa, ut rectè Clusius; quamvis & hanc quoq; speciem circa Olbiam Gallo-provinciæ observaverimus spontaneam. Foliis est Malvæ vulgaris rotundis, at incanis, flore majore incarnato. In rupibus non longè à specu Frontignana & propè Tolonam.

Alypum montis Ceti, sive Herba terribilis Narbonensium Ad. Al. Monspelienfium sive Herba terribilis Park. Al. Monspelianum, sive Frutex terribilis J.B. Thymelæa foliis acutis, capitulo Succisæ, sive Alypum Monspelienfium C.B. Titulus locum designat v.g. Promontorium Ceti propè Frontignanam. Invenimus etiam non minùs copiosè in collibus saxosis juxta S. Chamas Gallo-provinciæ oppidum.

Alyssum

Alyssum minus v. *Thlaspi minus*.

Amarantus luteus v. *Stoechas citrina*.

Ambrosia Ger. maritima C.B. *hortensis* Park. *Ambrosia* quibusdam *J.B.* In maritimis Etruriæ arenosis.

Amelanchier Lob. v. Diospyros.

Ammi vulgare Ger. vulgatius Lob. Park. majus C.B. vulgare majus latioribus foliis, semine minus odore *J.B.* In Sicilia & Italia in hortis, vineis & pinguioribus arvis interdum nimis frequens. Hujus differentiam observavimus foliis magis incis.

N. 1. Semen Ammeos veri (quod ab hoc diversum est) partium est tenuium, incidit, aperit, disc. Hinc convenit in dolore colico & uterino, in mensibus & urina obstructis, in inflatione ventriculi, usq; præcipue interni est, hinc & externi. *Schrod.*

2. Mirifice prodest mulierum sterilitati, si in pulverem contritum propinetur manè drachmæ pondere ex vino meraco vel carniū jure, tribus ante cibum horis, &c. Remedium est præstantiss. & pluries expertum. *Matth.*

Amygdalus Ger. Park. Am. dulcis & amara *J.B.* *sativa* C.B. *The Almond tree.* In Italia & Gallia Narbonensi in agris, non tamen ut puto sponte.

N. 1. *Amygdalæ* dulces multum nutriunt, corpus pinguefaciunt, humorum acrimoniam leniunt, semen genitale augent, unde tabidis & macilentis conveniunt. Adhibentur autem præcipue in emulsionibus.

2. *Amygdalæ* (inquit Galenus & experientia confirmat) nihil prorsus habent facultatis adstringentis; unde non audiendi sunt qui in febribus lactis *Amygdalini* dicti usum ideo vetant, nè sc. alvum astringat.

3. Sunt qui sibi persuadent non tutum esse cremoris *Amygdalini* usum febricitantibus & iis qui stomachum biliosum habent, quia ob unctuositatem suam facile inflammatur, choleram auget & vapores ad caput mittit. Nos in cremore unctuositatem illam non observavimus, nec quicquam nocumentorum jam dictorum, licet in febribus & calidis morbis sæpe usi sumus, & utamur ipsi indies etiam in nostro corpore. *J.B.* quem adi. *Bauhino* nostra quoq; experientia suffragatur.

4. Oleum *Amygdalarum* dulcium pulmoni & pectori utilissimum esse nostrâ experientiâ multorum commodo sapissimè exploratum: *J.B.* & paulo post. Est sanè medicamentum verè *emolliens*, & ad multa efficax, blandum, gratum & veluti quidam typus aliorum oleorum ejusdem generis; scimus quid possit in colico dolore ab induratis

induratis facibus, ab humore acri, in quibus tutò & maximo successu multoties exhibuimus. Sed recenter oportet esse expressum. Dos. à ℥iij. ad ℥β. vel per se, vel in jure carniū. In consputa alvo mite, tutum & probatum medicamentum etiam renū dolore divexatis. Est etiam insigne anodynum & unicum prope modum infantium medicamen: quibus etiam recens natis exhibetur ad tormina ventris compefcenda cum Saccharo penidiato ad ℥ij.

5. Magma reliquum post expressionem olei ad expressionem manuum & faciei, & cutis lævigationem quovis sapone præstantius est.

6. Amygdalæ amaræ calide sunt & siccæ; atten. aper. exterg. diureticæ sunt, obstructioni jecoris, lienis, mesenterii, uteriq; conferunt. Extrinsecus lentigines tollunt si masticatæ illinantur, capitis dolori subveniunt (in frontalibus.) *Schrod.*

7. Am. amaræ ebrietatem arcere dicuntur. Novimus tamen (inquit J.B.) qui amuletum illud in usu habentes nihil fecius à Baccho vincuntur, &c.

8. Amygdalas amaras vulpeculis si comedantur lethales esse tradunt. Marcellus Virgilius in fele pestiferam earum vim expertus est: Jo. Lutzius in gallinis, quæ ex esu magnatis post olei expressionem projecti mortuæ sunt. *J.B.*

Anagyris *Lob.* foetida *C.B. Park. Ger.* vera foetida *J.B.* In montibus prope Messanam & alibi tum in Italia, tum etiam in Sicilia.

Anagyris *Ger.* non foetida major vel Alpina *C.B.* non foetida sive Laburnum majus *Park.* Laburnum, arbor trifolia Anagyridi similis *J.B.* In montibus Jurâ & Salavâ prope Genevam & alibi in Alpibus Sabaudicis.

N. 1. Folia Anag. foetidæ trita & imposita tumores reprimunt: sicca in passo pota menses & secundas movent, foetum mortuum ejiciunt. Semen commanducatum vomitus movet. Hæc ex Veteribus, nam Officinis nostris in usu non est. Quod vomitiones faciant tum semen, tum folia omnes consentiunt.

2. Accidit interdum, ut capræ & oves in Creta fame vexatæ, hujus folia depascant, licet odoris sit ingratis-
simi, & postea ex harum lacte caseus conficiatur: quò si forte ignarus aliquis vescatur, aut lac bibat, statim excitentur tum vehementissimi vomitus, tum fluxus ventris; & cum hoc sæpissimè accadat, multi in discrimen vitæ veniunt: quam ob causam frutex hic omnibus sit exosus. *Billus.*

3. Quod Laburri flores apes non attingant, Plinius eumq; secuti recentiores Botanici affirmant. Sæpenu-
mero autem Laburnum ob ligni duritiem & nigrorem
pro Ebena venit ex quo pulchræ sunt pectinum thecæ.
F.B.

Anchusa angustifolia C.B. lignosior *angustifolia* Lob. *Park.*
minor lignosior F.B. Libanotidis species *Rondeletio ejus-*
dem: bis enim describit hanc plantam. In collibus ster-
ilibus agri Monspelienfis, aux *Garigues*, propè *Castel-*
neuf, &c.

Anchusa lutea F.B. *Ger.* major floribus luteis C.B. lutea
major *Park.* In agris sterilibus non longè à Lugduno
quà Genevam iter est.

Anchusa Monspeliaca F.B. itémq; minor seu *Alcibiadion*
& *Onochiles ejusdem*. IV, sive puniceis floribus C.B.
Anchusa Alcibiadion *Ger.* minor purpurea *Park.* In colle
arenoso inter Gramontiam sylvam & Castrum novum,
non longè à Monspelio.

N. Plurimas virtutes *Anchusæ* tribuant Veteres, quos
consule. Radix oleo soluta rubro colore tingit: petroleo
infusa & illita præstans est ad vulnera recentia & pun-
cturas. *Park.*

Androsace Matthioli *Ger.* *Androsaces Matthioli* sive Fun-
gus petrus marinus, sive Umbilicus marinus F.B.
Ard. Matth. sive Cotyledon marina, & Umbilicus mari-
nus *Park.* *Androsaces Chamæ conchæ* innascens vel mi-
nor C.B. In fundo stagni marini Volcarum, inter Pro-
montorium Ceti & *Balleruch* copiosissime & alibi in eodem
stagno.

Androsæmum foetidum *Park.* capitulis longissimis filamentis
donatis C.B. Ruta hypericoides quibusdam, Sicilianæ
affinis sive, *Tragium* F.B. In Sicilia & Calabria ad aqua-
rum rivos & scaturigines, ubi in satis magnum fruticem
adolefcit.

Anemone sylv. alba major C.B. magna alba, plurima par-
te anni florens F.B. sylv. latifolia alba, sive tertia
Matthioli *Park.* In Germania superiore.

Anemone tuberosa radice *Ger.* tenuifolia simplici flore
tertia, sive *Oenantes foliis*, flore violaceo hexaphyllo
C.B. An Italica latiusculis spinosis foliis; Clusii F.B. ?
Itinere à Lericio ad Massam Liguriæ copiosam vidimus,
postea & alibi in Italia.

Anisum Lob *Ger.* *Park.* F.B. An. herbariis C.B. In insula
Melitensi magno proventu seritur.

N. 1. Semen attenuat, discutit; commanducatum ha-
litum oris emendat; diureticum est, calculos pellit; lac
auget,

auget, pulmonicum ac stomachicum imprimis audit. Hinc usus præcip. in tussi & orthopnoea; in ructu & inflatione ventriculi, torminibus intestinorum, &c. Oleum ejus aut Quintessentiam ad phrenesin & morbum comitiale commendat Parkinsonus.

2. Nos in doloribus ventriculi à flatibus & pituitosis humoribus ortis oleum Anisi magni facimus, exhibitum cum jusclo, modò pauca dentur guttulæ, tres sc. aut quatuor, quod tum in nobismet ipsis tum in aliis sumus experti. Colicos cruciatus quos non potuit sanare [aliis remediis] oleo Chymico Anisi sanavit Heurnius. *J.B.*

3. Infantibus *Di.* exhibitum blandè per superiora ac inferiora saburram ventriculi intestinorumque ejicit. *Schrod.*

4. Cæteris flatum discutientibus medicamentis grätius est ventriculo, minus habet acrimoniæ & plus suavitatis.

5. Piusunt hoc in panem ex quo Biscoctum parant: quin & spiritibus illis tenuibus, è quibus generosiores & aquas vitæ dictas eliciunt, leviter contusum ante destillationem infunditur, ad gratum saporem iis iterata destillatione exaltandis conciliandum.

6. Anisum Melitenses Cuminum dulce appellant; unde *C. Bauhinus* deceptus Cuminum dulce Melitensium pro distincta specie Cumini habuit.

Anonis viscosa spinis carens lutea major *C.B.* lutea non spinosa, *Dalechampsio* natrix *J.B.* Natrix *Plinii* sive Anonis non spinosa lutea major *Park.* Primò illam observavimus in arenosis insulæ istius exiguae Promontorio Siciliæ Pachyno dicto nuper impetu maris abruptæ; deinde ad fluvium *Arve* propè Genevam; tandem circa *Monspelim* copiosè.

Anonis non spinosa parva procumbens lutea. In arenosis maris litoribus propè *Cataniam* Siciliæ copiosè.

Anonis non spinosa purpurea supina minima. In sterilibus *Calabriæ* juxta mare. Has duas plantas nondum descriptas putamus.

Anonis pusilla fruticans *Chérleri* *J.B.* Trifoliis affinis. In collibus sterilioribus *Narbonensis* Galliæ inter *Ilices*, *Thymos* aliòsq; frutices multa.

Anonymus flore Colutæ *Clus.* Chamæbuxus flore Colutæ *Ger. C.B.* Chamæbuxus sive Chamæpyxos quibusdam *J.B.* Pseudo-chamæbuxus *Park.* Primò observavimus in sylvis *Constantiam* inter & *Scaphusiam*, deinde in planitie quâdam propè *Augustam* *Vindelicorum*,

tandem non longè à Tiguro Helvetiæ plurimam, mense Maio florentem.

Anthyllis leguminosa purpurascens flore *Clus.* Loto affinis flore subrubente *C.B.* In agrorum marginibus circa Liburnum portum & alibi in pascuis Italiæ.

Anthyllis altera herbariorum *Park. v. Chamæpitys* moschata, marina incana, &c. *v. Paronychia.*

leguminosa Hispanica *v. Trifolium* Halicacabum, & Auricula muris.

Antirrhinum luteum *Ger.* luteo flore *C.B.* flore luteo grandi *Cam.* flore subluteo *Dod.* Circa Messanam in muris: unde Petrus Castellus in Catalogo suo Messanenfe illud appellat. Invenimus insuper in rupibus non procul à Petra sancta Hetruriæ oppido.

Antirrhinum purpureum *Ger.* majus alterum folio longiore *C.B.* vulgare *f.B.* In aggeribus fossarum & ad sepes propè Monspelium abunde.

Antirrhinum minus flore carneo, rictu striato. In Italia & Sicilia.

Anthora flore luteo Aconiti *f.B.* Anthora *Park.* Aconitum salutiferum seu Anthora *C.B.* Anthora sive Aconitum salutiferum *Ger.* In monte Jura circa verticem *Thuiri*, & alibi in istius montis jugis.

N. 1. Radix insigniter amara est: venenis omnibus adversari dicitur, & peculiariter radici Thoræ. Addit Guainerius magnæ etiam esse adversus pestem efficacis, cui subscribit Matth. Solerius non modo per inferiorem ventrem, sed & per superiora largas ait Anthoræ radices expurgationes moliri; modum esse ad quantitatem Phaseoli in jussculo aut vino.

2. Considerent lectores (inquit *f.B.*) an radix purgans conveniat commorsis à viperis & cane rabido, itemq; peste laborantibus. Quis tandem credat radicem purgantem auxiliari omnibus cordis affectibus?

Aparine semine Coriandri saccharati *Park.* In insula ad Prom. Pachynum & alibi in Sicilia.

Aphyllanthes Monspelensium *f.B. Lob.* Caryophyllus cæruleus Monspelensium *C.B. Park.* In collibus juxta *Castelneuf*, aliisq; sterilioribus Monspelio vicinis.

Aphyllanti affinis, &c. *v. Scabiosa.*

Apium montanum nigrum *f.B.* VI, sive montanum folio ampliore *C.B.* ejusdem *Ap. VIII*, seu montanum nigrum: ejusdem Daucus VI, seu montanus Apii folio minor, ex sententia fratris J. Bauhini; adeoq; ex una planta tres facit. Apium montanum vulgatius & Apium montanum Parisiensium *Park.* Oreoselinum *Ger.* In Germaniæ montosis,

Montosis, & ad latera montis Juræ non procul Genavâ.

Apium peregrinum v. Daucus tertius Dioscoridis.

Apocynum latifolium, amplexicaule f.B. v. Scammonea Monspeliaca.

Arbor Judæ Lob. Ger. Park. Judaica arbor f.B. Siliqua sylv. rotundifolia C.B. Primò observavimus in collibus Romæ vicinis, Tyberi fluvio imminuentibus; deinde in Appenninis montibus.

Arbutus Ger. Park. Arb. Comarus Theophrasti f.B. Arb. sive Unedo Lob. Arb. folio serrato C.B. In Sicilia, Italia & Gallia Narbonensis sylvosis plurima.

N. 1. Arbuti fructus, memæcylum Græcis dictus, ventriculo incommodus est & capitis dolorem inducit. Mihi sanè quoties comedi (inquit J. Bauhinus) dolorem causarunt ventriculi hi fructus. Ego sine ulla noxa multos edi. Clus. & revera sapore sunt non ingrato.

2. Amiatum ex Arbuti foliis & floribus aquam vitreis organis elici tradit, eamque servari tanquam sacratissimum adversus pestem & venena antidotum. Matthioli pulverem ossis de corde cervi ei admiscet.

3. Scribit Bellonius in montis Athos, tantopere priscis celebrati, vallibus Arbutos (qui ut plurimum aliis locis fruticent) in vastæ magnitudinis arbores evadere. Juba author est quinquagenum cubitorum altitudine in Arabia nasci. Plin.

Arisarum latifolium Park. Ger. latifolium quibusdam f.B. latifolium alterum C.B. In aggeribus sepium & umbrosis, itinere inter Massam & Lucam copiosum vidimus: postea etiam in Gallo-provincia non longè à Tolona portu, ad montium latera.

Aristolochia rotunda Lob. Ger. f.B. rotunda vulgarior Park. rotundo flore ex purpura nigro C.B. In Italia passim ad sepes & in aggeribus fossarum.

Aristolochia polyrrhizos f.B. Arist. Pistolochia dicta C.B. Pistolochia Ger. Pistolochia vulgarior Park. In arvis propè Sellam novam agri Monspelienfis, sub oleis.

Aristolochia Saracenica Ger. Ar. clematitis Park. Ar. clematitis recta C.B. clematitis vulgaris f.B. Circa Monspelium in vineis, fossis & aggeribus plus satis luxuriat.

N. Aristolochia utraq; cephalica, epatica & pulmonica inprimis est; attenuat, aperit. Hinc prodest ad tartaream mucilaginem resolvendam expectorandamque; ad menses ciendos, tumores internos rumpendos, venena

discutienda. Insuper longæ infusio ad scabiem emicandam vel vulgo hęc usitatissima est. Extrinsecus adhibetur usu creberrimo ad exiccanda & mundificanda vulnera. Rotunda tenuiorum est partium quàm longa, adeoq; efficacior, & in primis mensibus ac secundinis ciendis celeberrima. *Schrod.* Aiunt & radici huic vim purgatricem inesse.

Armeria prolifera Ger. Caryophyllus prolifer Park. sylv. vestris prolifer C.B. Betonica coronaria squamosa sylv. F.B. In Italia, Sicilia, Germania, Gallia satis frequens.

Armeria rubra Ger. Betonica coronaria sive Caryophyllus sylv. vulgarissimus F.B. Caryophyllus sylv. vulgaris latifolius C.B. Cum priore & magis etiam vulgaris.

Artemisia tenuifolia v. Abrotanum inodorum.

Arum venis albis C.B. magnum, rotundius folio Park. majus Veronense Lob. Primo in insulis circa Venetias nobis conspectum, etiam Novembri mense virens, foliis viridibus, vulgaris duplo majoribus; venis albis; vidimus & alibi in Lombardia.

Asarum Lob. Ger. C.B. F.B. vulgare Park. In sylvis ad latera montis Juræ, quæ ascenditur ad verticem Dole dictum copiosè. Vidimus & in Bavaria.


N. Crassam pituitam & utramq; bilem per vomitum ac nonnunquam per secessum violenter expurgat. Diureticum est & emmenagogum insigne. Epas, lienem, vesicamq; fellis aperit. Hinc utile est in arthritide, hydrope, febribus, præcipue tertiana ac quartana, ictero, &c. Folia exhibentur n. 6, 7, 8, vel 9, infusa aut cocta & expressa.

Asclepias Lob. flore albo Ger. Park. C.B. Ascl. sive Vincetoxicum multis, floribus albicantibus F.B. Per Germaniam, Italiam, Galliam Narbonensem in dumetis & ad sepes ubiq; ferè.

N. Alexipharmaca est ac sudorifera insignis. Usus præcip. in peste aliisq; venenosis affectibus, in obstructionibus mensium, in torminibus intestinorum, in palpitatione cordis ac lipothymia, in hydrope. Semen commendatur ad calculum. Extrinsecus usus tam florum quàm radicum & seminis est in ulceribus sordidis ac malignis purificandis, ad ictus insectorum venenatorum, in tumoribus mammarum, &c. *Schrod.* Facultratibus cum *Aristolochia* longa convenit ex sententia Tragi. De vi ejus ad hydropem vide *F.B. & Trag.*

Aspalathus 2 Monspelienis F.B. alter Monspelienis Park. Genista-spartium spinosum majus I, flore luteo C.B. In aridis

aridis & sterilibus saxosis collibus circa Monspelium, Nemausum & alibi in Gallia Narbonensi.

Asparagus marinus *f. B.* marinus crassiore folio *Park.* marit. crassiore folio *C. B.* palustris *Ger.*  sive palustris *Galeno.* In palustribus propè marinum Volcarum stagnum, non longè à Monspelio. Hæc planta mihi non visa est specie differre ab Asparago sativo, sicut nec sylvestris ab eo differt aliter quàm culturâ. Quæ ad Asparagum annoravimus vide in *Cat. Ang.*

Asparagus petraeus sive *Corruda Ger.* petraeus, sive *Corruda aculeata Park.* Asparagus foliis acutis *C. B.* *Corruda f. B.* In Italia ad sepes & in dumetis frequens. Provenit quoq; circa Monspelium in Linguadocia.

Asparagus sylv. aculeatus *Ger.* aculeatus, spinis horridus *C. B.* spinosus, sive *Corruda spinis horrida Park.* In insula Promontorio Pachyno adjacente, & alibi in maritimis Sicilia.

Asparagus sylv. spinosus Clusii *Ger.* aculeatus tribus aut quatuor spinis ad eundem exortum *C. B.* Ad mare propè Tauromenium in Sicilia. Harum specierum meminit J. Bauhinus in capite de *Corruda.*

Asperula flore caruleo *Ger. Park.* carulea arvensis *C. B.* **Rubia carulea** erectior elatiorve *f. B.* In monte Salevâ inter segetes; itémq; propè Neapolin Austriæ & Monspelium.

† **Asphodelus bulbosus Dodonzi**, sive *Ornithogalum spicatum flore virente f. B.* *Ornithogalum angustifolium majus*, floribus ex albo virescentibus *C. B.* **Asphodelus bulbosus** *Ger.* Inter segetes unâ circiter leucâ à Geneva versùs Salevam montem. Hanc T. Willifellus in Anglia invenit. vide *Cat. Ang.*

† **Asphodelus luteus** *Ger. f. B.* lut. minor *Park.* luteus & flore & radice *C. B.* In insula ad Promont. Pachynum & alibi in Sicilia.

N. 1. Asphodeli Veteribus frequens in medicina usus fuit. Videtis Dioscoridem, Plinium & Galenum, qui plurimas ei facultates assignant. Recentioribus nunc dierum fere neglectus est: sunt tamen qui radices ejus ad icterum commendant.

2. Hastulæ regię caulis seu scapus totus Græcis *anthericos* dicebatur, uti Latinis, teste Plinio, *albuscus*. Sunt & qui eo nomine semen Asphodeli significari voluerint.

Asphodelus major ramosus flore albo *f. B.* major albus ramosus *Park.* albus ramosus mas *C. B.* ramosus *Ger.* In montibus Messanæ imminentibus, atq; etiam in collibus saxosis agri Monspelienfis.

Asphodelus minor Clus. albus non ramosus *C.B.* non ramosus *Ger.* In Sicilia circa Syracusas & alibi.

Asphodelus minor foliis fistulosis *v. Phalangium Cretæ Salonenfis.*

Lancastriæ verus Ger. emac. v. Pseudo-asphodelus.

Aster Atticus Italorum flore purpureo Park. Italorum *Lob. Ger.* Atticus cæruleus vulgaris *C.B.* Att. purpureo & albo flore *f.B.* In asperis Germaniæ collibus secus Rhenum & alibi copiose.

Aster Atticus Ger. Cas. Atticus luteus *verus Park.* luteus foliolis ad florem rigidis *C.B.* In Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi ubiq; obuius.

Aster montanus luteus Salicis glabro folio C.B. montanus foliis salicis *Park. Ger.* Conyza media Montpelienfis, quibusdam Asteris Attici genus, folio glabro rigido *f.B.* In collibus juxta *Castelnens* & alibi in vicinia Montpelii. Eundem observavimus in Germania juxta Rhenum ex adverso Manhemii, & in sylvis supra Neapolim Italiæ, versus Camaldulensium cœnobium.

Aster purpureus montanus f.B. Alpinus cæruleo magno flore *Park.* Atticus cæruleus III, sive montanus cæruleus magno flore, foliis oblongis *C.B.* *Aster 7 Clusii Ger.* In summis jugis montis Jura, itemque in montibus maximo Carthusianorum cœnobio imminenti-bus.

Asteri montano purpureo similis f.B. Videtur J. Bauhinus describere plantam quam inveni in montibus sylvestribus nax. Carthusianorum cœnobio vicinis, quamvis per omnia non respondeat Figura aut Descriptio; & quid mirum? cum sicca jam delineata & descripta fuerit.

Aster Tripolii flore C.B. minor angustifolius *Park.* Atticus Montpelienfis purpureus, angustioribus foliis *f.B.* minor Narbonensis Tripolii flore, Linariæ folio *Lob.* In prato juxta molendinum *Castri novi*, inq; sylva Valena & alibi propè Montpelium.

Aster supinus Park. luteus supinus *Clusii Ger.* Ast. luteus supinus spinosus *f.B.* perperam spinosum appellat. Ast. luteus XII, sive supinus *C.B.* Circa Massiliam ad maris litus.

Aster montanus X, sive luteo magno flore *C.B.* montanus 3 *Ger.* Britannica conyzoides, quibusdam Aster Pannonicus *Clusio f.B.* In Germania ad Rhenum; inq; Italia ad margines fossarum inter Liburnum & Pisas. Semper in aquosis.

Aster luteus lanuginosus Park. hirsutus *Ger.* luteus V, sive

sive hirsuto Salicis folio *C.B.* An Aster luteus *XI*, sive luteus montanus villosus magno flore *C.B.* Aster montanus flore luteo magno hirsutus, quibusdam Oculus Christi *J.B.* In montosis medio circiter itinere inter Genevam & Lugdunum. Huic non adeo dissimilis est figura Asteris angustifolii lutei apud *J. Bauhinum*.

Astragalus Monspelianus *J.B.* Securidaca *II*, sive lutea minor corniculis recurvis *C.B.* An potius Astragalus *V*, seu villosus floribus globosis *eiusdem*. Certe Astragalus Monspelianus *J.B.* diversus est ab Hedyaro seu Securidaca minore, proinde reprehendit Lobelium, quod non adverterit Astragalum Monspeliensem diversum esse a Securidaca minore. Verum Monspelienfes, cum ibi essemus Anno 1665, ostenderunt nobis Securidacam minorem pro suo Astragalo: Astragalum autem Monspeffulanum *J.B.* nondum vidimus.

Astragalus Monspeliano candidior, & Onobrychis quorundam *J.B.* An Astrag. *V*, seu villosus floribus globosis *C.B.* qui Astragalum Monspelianum Clusii huc refert. purpureus *Lugd.* In rupibus montis Salevæ Genevam spectantibus copiose.

Astragalus quidam montanus vel Onobrychis albis *J.B.* Onobrychis *X*, seu floribus Viciæ majoribus cæruleo-purpurascens, vel foliis Tragacanthæ *C.B.* In altissimo vertice montis Juræ *Thuri* dicto.

Astragalus major Fuchsio v. Orobus sylvaticus.

Astrantia nigra *Lob.* nigra, sive Veratrum nigrum Dioscoridis *Dod. Ger.* Helleborus niger Saniculæ folio major *Park. C.B.* Sanicula foemina quibusdam, aliis Helleborus niger *J.B.* In sylvis quibusdam non longè à Monachio Bavarie; necnon in Salevæ pratis montosis urbi Genevæ vicinis.

N. Hujus radici vim per alvum purgatricem Helleboro albo similem sed mitiorem multo inesse Gesnerus primum se expertum refert.

Atractylis *Lob. Ger.* lutea *C.B.* flore luteo *Park.* vera flore luteo *J.B.* In Italia & Gallia Narbonensi ad vias & in agrorum marginibus ubiq; ferè.

N. Hujus folia succum sanguineum præbent, quem admodum Theophrastus de Atractylide refert, qui tamen tuis & expressis non elicitur, sed avulsis dum adhuc tenera sunt & succo prægnantia, sponte è venis effluit; quo modo etiam ex Aloes plantæ foliis se Aloen purissimam & optimam Neapoli collegisse scribit *F. Columna*.

Atri-

Atriplex marina Ger. *maritima* f. B. *maritima laciniata* C. B. *marina repens* Park. In litoribus arenosis maris Mediterranei nusquam non occurrit. A nostrati a. maritimo omnino diversa est.

Avicularia Sylvii f. B. v. *Speculum Veneris*.

Auricula muris Camerarii f. B. *Anthyllis leguminosa* marina Batica vel Cretica, sive *Auricula muris Camerarii* Park. Loto affinis IV, sive hirsutis circinatis filiquis C. B. In insula ad Promont. Pachynum, ubi arx praesidio Hispanico tenetur, & alibi in Sicilia.

Auricula muris pulchro flore, folio tenuissimo f. B. In monte *Thur* non procul à Genevâ.

Auricula Urfi flore purpureo Ger. A. U. sive *Primula veris Alpina* flore rubente f. B. *Sanicula Alpina purpurea* C. B. Primò invenimus in Alpibus non longè à *Ponticba* vico qui ab ea parte Limes est Ditionis Venetianæ: postea etiam in clivis maritimis Regni Neapolitani; tandem in Alpibus, *Chambery* inter & max. Carthusianorum coenobium.

Auricula leporis v. *Bupleuron*.

B

B *Arba capri* f. B. Ger. *emac.* B. capræ floribus oblongis, *Melandryon* Plinii C. B. *Ulmaria* major sive altera Park. Propè Genevam à *la Bastie*. Invenimus & in Helvetia non longè à *Scaphusia*.

Balsamita v. *Ageratum*.

Barba Jovis frutex C. B. *Clus. Park.* &c. *Jovis barba pulchre lucens* f. B. In clivis maritimis Etruriæ & Regni Neapolitani copiosè.

Bellis sylvatica f. B. *media sylvest.* Ger. VI, sive *sylv. media*, caule carens C. B. In montibus circa Genevam.

Bellis Alpina major folio rigido C. B. Park. In summis jugis montis Juræ copiosè. *Bellidis* utriusq; facultates quare in *Car. Ang.*

Bellis cærulea *Montpeliaca* Ger. *cærulea* II, sive caule folioso C. B. *Aphyllantes Anguillare*, sive *Globularia Bellidi* similis f. B. *Globularia Montpelensium*, *Bellis cærulea* Park. Circa *Montpelium* plurimis in locis; quin

quin & ad radices montium Juræ & Salevæ propè Genèvam, & alibi tum in Italia, tum etiam in Germania.

Bellis cærulea caule nudo *C.B.* In sylvis & montibus max. *Carthusianorum*, *cænobio* vicinis. Hæc priore elatior est; foliis angustioribus longioribusq; & omnino specie ab ea diversa, quicquid repugnat *J. Bauhinus*, cui certè nunquam conspecta fuit.

Beta Cretica spinosa *Park.* *Cretica* semine spinoso *f.B.* semine aculeato *Ger. minor V.* seu *Cretica* semine aculeato *C.B.* In insula ad Promont. *Pachynum Siciliæ.*

Distorta minima *f.B. IV.* sive *Alpina media* *C.B. minor Alpina* *Park.* In supremis herbis jugis montis Juræ copiosè. Puto hanc non esse specie diversam à nostrate, quamvis *C. Bauhinus* distinguat.

Blattaria lutea *f.B.* lutea minor seu vulgaris *Park.* lutea folio longo laciniato *C.B.* flore luteo *Ger.* Variis in locis hanc observavimus tam in Germania quam in Italia & Gallia *Narbonensi.* Solò floris colore ab hac differt *Blattaria* flore albo, siquidem ex eodem semine oritur, ut in hortulo nostro *Cantabrigiæ* aliquando experti sumus.

Blitum rubrum majus *C.B. Ger. pulchrum rectum*, marginum rubrum *f.B.* In hortis oleraceis circa *Monspelim.*

Blitum rubrum minus *f.B. C.B. Ger. minus sylv. rubrum* *Park.* In vineis, hortis & fimetis circa *Monspelim* & alibi. Quomodo & an omnino specificè inter se differant album minus & rubrum minus, mihi non satis constat. Quod in Germania circa *Basileam* & alibi tam copiosè provenit videtur esse *Blitum minus album* *f.B.*

Botrys *Ger. vulgaris* *Park.* *ambrosioides vulgaris* *C.B.* *Botrys* plerisq; *Botanicis* *f.B.* In arenosis circa *Rhegium* in *Calabria*, *Floréntiam* in *Etruria*, *Monspelim* & *Nemausum* in *Narbonensi Gallia.*

N. 1. Herba in pulverem redacta, mellèq; in Elecuarii formam excepta præstat contra pulmonum vomicas, quo remedio multos ego curavi qui pus screabant. *Math.* Valere dicitur & ad dolores uteri, ad menses ciendos & emortuos foetus ejiciendos.

2. Nonnulli inter vestes eam reponunt ad tineas abigerdas, & odoris suavitatem communicandam.

Botrys verticillata *f.B. v. Chamædrys* foliis laciniatis.

Branca ursina v. *Acanthus sativus.*

Briza monococcos *Ger. Zea Briza dicta*, vel *monococcos* *Ger.*

Germanica *C.B.* Zea monococcus, five simplex, five Briza *Park.* Zea monococcus, Briza quibusdam *f.B.* In Germania Argentoratum inter & Basileam ejus segetes vidimus.

Buglossum angustifolium *Lob.* angustifolium minus *C.B.* vulgare angustifolium minus *f.B.* minus sativum *Park.* Ad vias & agrorum margines in Italia, Gallia, Germania subinde occurrit. An hoc à sativo aliter quam culturâ differat considerandum. Vulgare latifolium circa Messinam invenimus.

N. Viribus cum Boragine convenit. Flores inter quatuor illos cordiales famosos recensentur. Omnibus affectibus ex atra bile oriundis conducunt, ut & radix & folia. In oleis usurpantur, valentque ad sedandos dolores varios.

Bugula v. Consolida.

Bupthalmum vulgare *Ger.* Dioscoridis *C.B.* Matthioli, five vulgare Millefolii foliis *Park.* Chamæmelum chrysanthemum quorundam *f.B.* Variis Germaniæ in locis, v. g. in muris oppidi *Bonnæ* propè Coloniam, &c. In Italia circa Florentiam in alveis torrentum.

N. Uſus sum hâc herbâ in vino decoctâ adversus inveteratam fellis suffusionem, potu illam decoctionem calidam hoc morbo laborantibus tanquam concoquens & discutiens remedium exhibui, certôq; deprehendi eam extenuandi, discutiendiq; & educendi citra dolorem & periculum vi præditam. *Trag.*

Bupthalmum Cotulæ folio *C.B.* alterum Cotulæ folio *Park.* tenuifolium folio Millefolii ferè *f.B.* In agris circa Liburnum portum. Vel eadem est hæc planta, vel certè simillima Chrysanthemo Valentino Clusii. Chrysanth. tenuifolium Bæticum Boelii. *Ger.*

Bupleurum angustifolium; An Bupleurum III, five argissimum folio *C.B.* ? Figura Bupleuri angustifolii Monspeliensis *Ger.* optimè convertit huic plantæ quam circa Monspelium invenimus. Est a specie distincta a nostrate Auricula leporis seu minimâ *f.B.*

Bupleuron latifolium Monspeliense *Ger.* I, seu folio rigido *C.B.* latifolium *Park.* Auricula leporis altera five rigidior *f.B.* In sylvis & dumetis circa Monspelium.

Bupleurum folio subrotundo five vulgatissimum *C.B.* An B. angustifolium *Park.* ? Auricula leporis umbellâ luteâ *f.B.* In Germaniæ & Italiæ montosis, ad sepes & in dumetis.

Bursa marina & Alcyonii genus 4 Dioscoridi *Ces.* Arancio marino *Imper.* Algæ pomum Monspeliensium *f.B.* Alcyonium

cyonium XII, five Bursa marina Cæfalpini C.B. Apud Scriptores nostros Anglicos nulla hujus mentio, quod sciam. In litoribus maris arenosis ad Siciliæ *Punctum Cerciolum* dictum reperi.

Bursæ pastoris loculo sublongo affinis pulchra planta *f.B.* B. p. major folio non sinuato C.B. Thlaspi Veronicæ folio *Park.* Medio circiter itinere inter Lucam & Pisas ad sepes. Hanc nuper in Anglia nostra invenimus spontaneam, v. *Cat. Ang.*

Bursa pastoris minor foliis Perfoliatæ *f.B.* v. Thlaspi oleraceum.

C

Cacalia quibusdam *f.B.* III, five foliis cutaneis acutioribus & glabris C.B. folio glabro *Ger.* glabro folio acuminato *Park.* In sylvis montium Jarz & Salevæ propè Genevam.

Cacubalum Plinii v. Alsine baccifera.

Calamintha montana præstantior *Lob. Ger. Park.* montana flore magno, ex calyce longo *f.B.* magno flore C.B. In montibus propè maximum Carthusianorum cœnobium. Invenimus & in montosis Etruriæ sylvis.

Caltha arvensis C.B. simplici flore *f.B.* Calendula simplici flore *Ger.* Circa Monspelium, Liburnum, &c. An Caltha minima *f.B.* ? *Small wild Marigold.*

N. Flores cardiaci censentur, hinc & hepatici & Alexipharmaci, sudores movent, variolas expellunt, ictero medentur, menses cient, partum promovent (sumus subditus parturienti.) Aqua destillata oculorum rubedini & inflammationi medetur. Folia in olere sumpta alvum leniunt.

2. Decoctum florum Calendulæ in Zythogalo seu liquore posseti vulgò præscribitur ad variolas expellendas; ejusq; usus à longo tempore ferè inter omnes increbuit.

3. Planta hæc Solsequia & Solis sponsa dicitur, quòd flos ejus ortu Solis aperiatur & occasu claudatur.

Campanula rotundifolia minima C.B. *f.B. Park.* An Camp: glabra XXII, five minor rotundifolia Alpina C.B. ? Fortè enim hæc duæ non differunt specie. In Alpibus Stiriacis & Carinthiacis. Folia hujus ex rotunditate oblonga sunt & serrata eo ferè modo quo Saniculæ Alpinae guttatæ.

Cam-

Campanula minor folio rotundo, flore caeruleo pentagono grandi. In clivis maritimis Regni Neapolitani. An quoquam descripta sit nescio.

Campanula Persicifolia Ger. Park. angustifolia caerulea & alba f. B. Rapunculus glaber X, seu Persicifolius magno flore C. B. Observavimus hanc propè Spadam urbiculum acidulis celebrem flore albo: in montibus & collibus Genevæ vicinis flore caeruleo.

Campanula repens flore minore caeruleo f. B. An *Trachelium* sive *Campanula hirsuta* VIII, i. e. *Urticæ* foliis oblongis, minus asperis C. B. ? Hujus meminit Clusius in Hist. cap. de *Trachelio*, quem adj. In arvis inter segetes prope Genevam & alibi.

Camphorata hirsuta C. B. Monspel. f. B. major *Monspeliensium* Park. *Monspeliensium*, an *Chamaepeuce* Plinii Lob. Circa *Monspelim*, *Nemausum*, *Avenionem* & alibi in Gallia Narbonensi.

Camphoratae congener C. B. *Camph. Monspeliensium* quoad figuram f. B. *Anthyllis altera* Italicorum Ger. *Camphoratae* congener, sive *Anthyllis altera* Italicorum Park. In Germania, Italia & Gallia Narbonensi in arvis & vevactis frequens.

Capparis spinosa folio rotundo Park. rotundiore folio Ger. *spinosa* fructu minore folio rotundo C. B. *Cap. spinosa* f. B. qui species hasce non distinguit. In muris & ruderibus Romæ, Senarum, Florentiæ, & alibi in Italia. Circa Tolonam in Gallo-provincia colitur.

N. Florum gemmæ antequam explicantur decerpæ & muriâ conditæ ad nos transportantur, & intinctus ferè loco ad carnes & pisces assatos adhibentur: appetitum augent, hepatis & lieni conferunt obstructions eorum referando. Memorabile est (si modò verum) quod scribit Plinius. Ferunt eos (inquit) qui quotidie *Capparin* Italicam edunt *Paralyfi* non periclitari, nec *Lienis* doloribus. Cortex, radicis inprimis, lienes induratos juvat, tum intus assumptus, tum foras impositus; menses educit, ulcera extergit & desiccatur, ad dolorem ischiadicum valere dicitur, & affectus Arthriticos.

Cardamine Alpina v. *Nasturtium* *Alpinum*.

† *Cardamine impatiens* vulgò. Sicut minus *impatiens* Ger. minimum *Alpini*: minimum, Noli me tangere dictum, sive *impatiens Nasturtii* sylv. folio Park. An *Sisymbrii* *Cardamines* species quædam insipida f. B. ? Certè & icon & descriptio huic ad amussim quadrant. In Germania juxta Rhenum, locis glareosis ubi aquæ scaturiunt.

Carduus

Carduus chrysanthemus Narbonensis Ger. Scolymos chrysanthemus C.B. Spina lutea F.B. Scolymus Theophrasti, siva Eryngium luteum Monspeliensium Park. In Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi, ad mare præsertim frequentissimus.

Carduus chrysanthemus Dod. Scolymus Theophrasti Hispanicus Clus. Propè oppidulum S. Lupiani, eundo ad Pedenatium, & alibi circa Monspelim. Hæc planta reverà specie differt à præcedente, quicquid contradicit C. Bauhinus.

N. Salmanticenses tenellam adhuc plantam & primùm germinantem, cum ipsa radice elotam crudam aut etiam coctam cum carnibus edunt : ipsius lacteo succo omne lactis genus coagulant : etiàmq; ejus flore Crocum adulterant, ut quædam nationes Cnici flore. Hujus autem radice Sues non minùs libenter vescuntur quàm Eryngii *Clus.*

Carduus chrysanthemus procerus caule eduli. Ad radices montis *Ætnæ* 8 mil. supra Cataniam, ubi vulgus cum aceto & pipere caules ipsius crudos acetarii loco comedit. Hæc planta an à præcedente specie diversa sit subdubito, quamvis duplo altiùs assurgat. At fortè illud solo debetur.

Carduus caruleus sphærocephalus minor C.B. Crocodilium Monspeliensium Læd. Card. globosus minor Ger. Echinopus minor F.B. In Gallia Narbonensi vulgarissimus.

Carduus galactites F.B. Apud alios Botanicos hunc non invenio. In Sicilia & Melita insulis, itèmq; in Italia propè pharum Genuensem, necnon circa Monspelim in locis ruderatis & incultis.

Carduus lacteus peregrinus Camerarii F.B. albis maculis notatus exoticus C.B. Silybum minus Bæticum Park. In Melita & Sicilia insulis. Color seminis in hoc fuscus est & minimè albus, ut in peregrino Camerarii, & proinde fortè rectiùs refertur ad Silybum majus annuum *Park.*

Carduus lanceolatus ferocior F.B. Primò invenimus eum proximè fontem quem vocant *ardentem*, à Gratianopoli duabus circiter leucis remotum, deinde in itinere ab Auranthia ad Nemausum ; tandem propè montem S. Lupi, tribus Monspelio leucis distantem. Est ei flos albus & major quàm Lanceolati vulgaris.

Carduus parvus F.B. In Sicilia agris non longè à castello *Pargallu* ex adverso Melitæ.

Carduus Cirsium dictus folio laciniato nigrius F.B. In montibus propè Genèvam. — Hic an ab alijs descriptus sit

fit video J. Bauhinum dubitare; proinde & ego *mixta*.
Carduus pratensis Asphodeli radice latifolius *C.B.* bulbosus *Monspeliensium Park.* bulbosus *Monspeliensis*, sive *Acanthus sylv.* quibusdam, foliis laciniatis *J.B.* In pratis *Monspelio* vicinis.

Carduus pratensis latifolius *C.B. Park.* pratensis *Tragi.* mollis *Lapathi folio J.B.* In pratis *Rheno* vicinis circa *Argentoratum, Basileam, &c.*

N. Hujus folia in cibis ut reliqua olera expetuntur, unde à mulierculis *Brassica pratensis* nominatur. *J.B. Trag.*

Carduus solstitialis Ger. stellatus IV, sive luteus foliis *Cyani C.B.* *Cardui stellati* varietas, *Jacea lutea Clusii Lob.* *Spina solstitialis J.B.* In *Italia & Gallia Narbonensi* ubiq; ferè;

N. Herba hæc in morbo regio efficacissima est experientiâ *Fontanoni*; valet & ad *cachexiam, hydropem, febres diurnas, virginum decolorem faciem, &c.* *J.B.*

Carduus sphaerocephalus latifolius vulgaris C.B. globosus *Ger.* *Echinopus major J.B.* In montosis sylvis propè *Viterbum* quâ inde *Romam* itur.

Carlina herbariorum Lob. humilis *Park.* *Carlina*, sive *Chamæleon albus Dioscoridis Ger.* acaulos magno flore *C.B.* caulifera & acaulis *J.B.* nam hæc dux specie non differunt. In *Germaniæ* pascuis sterilibus & dumetis frequens; nec minus in *Italia, Gallia Narbonensi, & circa Genevam.* De hujus viribus, v. *Cat.*

Ang.

N. 1. Refert *Gesnerus*, hujus floris calycem tum recentem, tum etiam siccum noctu claudi, ad Solem verò aperiri. *Germanis Eberwurtz* dicitur, i e. *Apri herba*, quia nimirum *Apri* ejus radices appetunt; non (ut vult *Fuchsius*) quòd sues si in polenta exhibeatur, perimat; hoc enim experientiæ repugnat.

2. Hujus capitula carnosâ, calyce, floribus ac semine resectis, ex aquâ cum butyro, sale & pipere suave edulium præbent. *Gesn.*

3. *Chamæleonem album* ideò *Ixiâ* appellatum ait *Dioscorides*, quòd quibusdam in locis *Viscum* ad ipsius radices inveniatur, quo etiam pro *Mastiche* utuntur mulieres. Hæc appellatio ab aliis *Chamæleoni* etiam nigro rectè tribui dicitur: quin & plantæ cuidam venenatæ ab utroq; *Chamæleonte* distinctæ, cujus meminit *Dioscorides lib. 6.* competit, autore *Guilandino*, quem consule aliòsq; herbarios, qui plura de hac voce habent.

Cartha-

Carthamus v. Cnicus.

Carlina sylvest. vulgaris Clus. Cnicus sylv. spinosior C.B.

An sylv. spinosior polycephalos ejusdem? Hujus plantæ radix est diuturna, cum vulgaris nostratis annua ferè sit; plures quoque ab eadem radice caules ei exeunt, cum vulgari unus tantum: Deniq; floris color in hac flavus est, in nostrate pallidè luteus. v. *Cat. Ang.*

Caryophyllata montana Park. Ger. montana flore magno luteo f.B. VI, sive Alpina lutea C.B. In montibus altissimis maximo Carthusianorum cœnobio imminetibus

Caryophyllus arvensis umbelliferus f.B. arvensis umbellatus Park. holosteus arvensis Ger. holosteus arvens. V; sive arv. umbellatus folio glabro C.B. Inter segetes propè Lovanium.

Caryophyllus gramineo folio minimus seu saxifraga Cas. Caryoph. saxat. IX, sive minimus muralis C.B. Betonica coronaria sive Tunica minima f.B. Circa Genevam, Florentiam, Lansbergum & alibi tam in Italia, quàm in Germania copiosum vidimus.

† *Caryophyllus sylv. humilis flore unico C.B. &c. Hunc in Anglia variis in locis sponte natum vidimus. v. Cat. Ang.*

Caryophyllus simplex laciniatus I, seu flore tenuissimè dissecto C.B. Betonica coronaria tenuissimè dissecta, sive Caryophyllea superba elatior vulgaris f.B. In montibus Genevæ propinquis, minus tamen frequens; invenimus & in Germania, non longè à Weissenberg Franconiz oppido.

Caryophyllus montanus major flore globoso C.B. Caryophylleus flos aphyllorcaulos, vel junceus major f.B. Caryophyllus mediterraneus Ger. In collibus propè Morguntiam. Non alia in re quàm magnitudine omnium partium à vulgari sive maritimo nostrate differre videtur.

N. Mirum alicui videri possit, plantam hanc, quæ nullibi apud nos quàm in maritimis oritur, in regionibus transmarinis tam procul à mari provenire. Verùm nos alias præter hanc maritimas in mediterraneis nascentes observavimus, v. g. Tragion Matthioli sive Kali spinosum in arenosis propè Viennam Austriæ; Rhamnum secundum Clusii non longè ab Augusta Vindelicorum; Althæam vulgarem variis Germaniæ in locis. Quin & Tragus lib. i. cap. 39. scribit se invenisse magnâ copiâ in agro Vangionum inter segetes Papaver corniculatum luteum, quod in Anglia nusquam nisi in arenosis Oceani littoribus provenit.

Caryophyllus holosteus Alpinus tenuifolius Lini flore albo.
In ascensu montis Juræ propè supremum verticem
Thuiri.

N. Aqua florum sylvestris *Caryophylli* destillata singulari experimento ad pellendum calculum mensurâ trium aut quatuor cochlearium bibitur. *℞.B.*

Caryophyllus sylv. vulgarissimus & Car. sylv. prolifer v. *Armeria*.

Cassia poetica Lobelii *Ger.* poetica *Monspeliensium Park.* *Olyris* frutescens baccifera *C.B.* *Cassia lignea* *Monspeliensium ℞.B.* In Italia ad mare inferum, itémq; circa *Monspelim* plurima.

Catanance Dalechampii flore cyani, folio coronopi *℞.B.* *Chondrilla cærulea* cyani capitulis *C.B.* *Chondrilla Sesamoides* dicta *Park.* *Sesamoides parvum Matthioli Ger.* In aridis & saxosis collibus agri *Narbonensis* passim obvia, invenimus etiam propè *Gratianopolin* eundo ad max. *Carthus. cœnobium*.

Caucalis albis floribus Ger. vulgaris albis floribus *Park.* IV, sive arvensis echinata magno flore *C.B.* *Lappula canaria* flore pulchro magno albo *℞.B.* Inter segetes in *Germania* passim, itémque circa *Genevam* & *Monspelim*.

Caucalis maritima supina echinata magno fructu. *Lappula canaria* sive *Caucalis maritima ℞.B.* XI, sive pumila maritima *C.B.* In arenosis *Siciliæ* litoribus propè *Messanam* & alibi.

Caucalis minor pulchro semine sive *Bellonii ℞.B.* *Seseli Creticum minus C.B. Ger.* *Tordylium*, sive *Seseli Creticum minus Park.* In *Sicilia* intra ipsa urbis *Messanæ* mœnia.

Caucalis Peucedani folio *Ger.* XII, sive folio *Peucedani C.B. Park.* *Saxifragiæ tenuifoliæ* affinis, quibusdam *Caucalis ℞.B.* In planitiè quadam propè *Augustam Vindellicorum* in *Germania*.

Cedrus Lycia retusa *Bellonio* dicta *℞.B.* baccifera I, seu folio *Cupressi* major, fructu flavescente *C.B.* *Cedrus Phoenicea* folio *cupressi Park.* *Oxycedrus Lycia Ger.* Ab hac non diversam existimamus secundam speciem *Cedri* bacciferæ *C.B.* ut neq; tertiam, cum ipse asserat eas magnitudine solâ differre. Fortè etiam *Sabina* baccifera dicta ab hac non fuerit diversa: certè hæc nobis *Monspeli* ostensa fuit pro *Sabina* baccifera. Et nos quoq; in eadem planta observavimus inferiores & primos in tenellis plantis ramulos foliis pungentibus & acutis, superiores verò & in adjectioribus obtusis & rotundis vestitos.

Cen-

Centaurium luteum pusillum *C.B.* minimum luteum *Park.* luteum novum *Col.* Centaurii lutei varietas *Ger. Emac.* In testro veteris ædificii Baiani *Piscina mirabilis* dicti. Solo floris colore à minore purpureo differre videtur.

Centaurium minus spicatum album C.B. Park. In agro Monspeliensi & alibi in Narbonensi Gallia flore purpureo frequens.

Cerithe asperior flavo flore Ger. major flavo flore *Park.* Cer. quorundam major spinoso folio, flavo flore *J.B.* flore flavo asperior *C.B.* In Italia & Sicilia admodum frequens.

Cerithe major Ger. major flore luteo & rubro *Park.* quorundam major, versicolore flore *J.B.* *Cerithe*, seu *Cynoglossum montanum majus C.B.* In montibus sylvosis max. Carthus. cœnobio imminentibus. Perennis m. hi visæ est hæc planta: semina a. ei minora sunt quàm vel purpureæ vel flavæ.

Cerasus sylv. amara Mahaleb putata *J.B.* *Cerasus XV*, sive *Ceraso* affinis *C.B.* *Macaleb Gesneri Ger.* *Machaleb Germanicum Park.* qui C. Bauhinum reprehendit, quòd confundat *Machaleb Matthioli & Gesneri.* In sepibus propè Gratianopolin quæ itur à *la grand Chartreuse.* Nuclei hujus fructus calefaciunt & emolliunt, saponarios globulos ingrediuntur, pilosq; horridiores & duriores emolliunt affricu crebro *Matth.* Ex iis etiam oleum conficitur jucundi odoris, quo ad illinendas manicas utuntur. *Lugd.*

Ceratia v. Siliqua.

Cerrus minore glande Ger. *Haliphlos*, sive *Cerrus* fœmina minore glande *Park.* *Quercus Burgundica* calyce hispido *J.B.* VI, sive calyce hispido, glande minore *C.B.* In Etruria ad lacum Volsinientem. Vidimus Veneriis Cerrî glandium calyces maximos, quos *Vallonia* ibi appellant, ab Apollonia Dalmatiæ urbe vulgò nunc *Vallonia* dictâ, unde adferuntur. His coriarii utuntur ad coria sua densanda. J. Bauhinus horum usum esse ad inficiendos atro colore pannos Gallarum vice scribit.

Chamæbalanus leguminosa J.B. *Lathyrus arvensis repens tuberosus C.B.* *Lathyrus arvensis*, sive *Terræ glandes Park.* *Terræ glandes Dod. Lob. Ger.* In arvis juxta *Genavam & alibi.*

N. 1. Hujus radices tuberosæ sapore sunt subdulci Glandis aut Castanæ, astringente; flatulentum, suavem tamen succum creant: Sanguinis, uteri, renum, ventris fluores compescunt. *Lob.*

2. Ex hujus floribus aquam distillant quidam, qui ita rosaceam ementitur, ut pro illa nonnunquam vendi solet.
Cam.

Chamaebuxus flore Coluteæ *v.* *Anonymus* flore Coluteæ;

Chamaecyparissus v. Abrotanum fœmina.

Chamaecistus v. Helianthemum.

Chamaecerasus Alpina v. Periclymenum.

Chamaedrys major Park. major latifolia *Ger.* major repens *C.B.* Itinere à Vienna ad Venetias.

Chamaedrys vulgaris Park. minor *Ger.* minor repens *C.B.*

Chamaedrys vulgò vera existimata *J.B.* In Italia & Gallia frequens.

Chamaedrys laciniatis foliis Park. Lob. ob. Chamaepitys fœmina *Ger.* *Botrys chamaedryoides C.B.* Bot. verticillata *J.B.* In Germaniæ agris sterilioribus itémq; circa Genevampassim.

Chamaedrys falsa maxima, an Teucrium I, seu majus Pannonicum Clusio J.B. *Chamaedrys spuria major altera* sive frutescens *C.B.* *Ch. ma. sp. frutescens Park.* *Teucrium majus Pannonicum Ger. emac.* In sylvis Germaniæ atque etiam circa Genevam plurimis in locis.

† *Chamaedrys spuria montana Cisti flore Park.* *Ch. Alpina* flore *Fragariæ albo J.B.* *Ch. Alpina Cisti flore C.B.* *Teucrium Alpinum Cisti flore Ger.* In montis Juræ supremis jugis: invenimus & in Alpibus Carinthiacis. Hanc in Hybernia invenit D. Heaton *v. Cat. Ang.*

Chamaedryi vulgari falsæ aliquatenus affinis, & Clinopodium Alpinum Ponz J.B. *Clinopodium Alpinum Park.* *Teucrium Alpinum comâ purpureo-cæruleâ C.B.* In suprema parte montis Juræ, & in Alpibus Sabaudicis.

Chamaedrys spuria angustifolia J.B. spuria major angustifolia *C.B.* *Veronica supina Ger.* *Teucris facie Park.* supina, facie *Teucris pratenfis Lob.* Circa Genevam & in Germania in pascuis propè Rhenum frequens.

Chamaegenista v. Genistella minor.

Chamelæa tricoccos J.B. C.B. Park. *Arabum tricoccos Ger. Widow-wail.* Inter Monspelium & Frontignanum in collibus saxosis plurimam vidimus.

Chamelæa Germanica v. Mezereon.

Chamaemelum vulgare leucanthemum Dioscoridis C. B. vulgare amarum *J.B.* Inter segetes circa Genevam.

Chamaemelum chrysanthemum v. Bupthalmum vulgare Ger.

Chamaespilus Ger. v. Cotoneaster.

Chamaespilus J.B. *Cotoneaster folio oblongo serrato C.B.* *Cotonaster Gessneri Ger. emac.* in Append. In summitate montis Juræ.

Chamae

Chamænerion Gesneri Lob. alterum angustifolium *Ger.*
Lyfimachia Chamænerion dicta angustifolia *C.B. Lys.*
 filiquosa angustifolia, *Chamænerion Gesnero* dicta *Park.*
Lys. filiq. speciosa angustifolia *J.B.* In alveis torrentum
 & fluviorum in *Foro Julii* Italix & alibi variis in locis,
 v.g. *Genevæ* ad fluv. *Arve* & *Rhodanum*.

Chamæpitys moschata foliis ferratis *C.B.* *Cham.* five *Iva*
moschata Monspeliensium J.B. *Iva moschata Monspe-*
liaca Ger. *Anthyllis* altera herbariorum *Park.* In
 saxosis collibus circa *Monspelim* & alibi in *Gallia*
Narbonensis; itémque in insula ad *Promont. Pachy-*
num.

Chamærrhiphes Dod. Lob. *Palma minor C.B.* *Palma hu-*
milis spinosa J.B. *Palmites* five *Chamærrhiphes Ger.*
Palma humilis, five *Chamærrhiphes*, vel *Palmites Park.*
 In insula ad *Promont. Pachynum Siciliae*, itémq; in ru-
 pibus maritimis *Hetrurix*.

N. 1. Species illa quam nos observavimus spinosa fuit,
 prout rectè eam describit *Matthiolum*, diversa ergo à *Pal-*
ma humili Hispanica non spinosa. Figuræ a. apud *Par-*
kinsonum transpositæ sunt.

2. Pars tuberosa juxta radicem, tenerrima, sapida &
 ori gratissima (*Encephalum* vocant) estur secundis men-
 sis pro bellariis, cardui esculenti modo, cum pipere &
 salis momento; adstringenti facultate pollet. *Math.*
 Ad *Venerem* excitandam haud parùm præstare creditur.
 E foliis *Hispanicæ sportulæ*, tegetes & scopæ fiunt.

Chamæsyce Dod. Lob. C.B. J.B. Ger. Park. In vineis &
 agris Italix, Siciliae & *Gallix Narbonensis*.

Chondrille vel *Chondrilla cærulea J.B.* *Ch. cærulea* five
purpurea Park. *cærulea Ger.* *cærulea altera Cichorei*
sylv. folio C.B. In *Germania superiore* inter *Confluentes*
 & *Moguntiam* secus *Rhenum flumen*.

Chondrilla lutea J.B. *Coronopi* aut *Cyani facie*, tenui-
 folia lutea vinearum *Lob.* In aggeribus & vineis circa
Monspelim & ad muros ipsius urbis. Ad *Sonchum læ-*
vem vulgarem proximè accedit.

Chondrilla rara purpurea, *Crupina Belgarum* dicta *Park.*
 rara, purpurante flore, semine nitido deciduo *Lob.* *Hi-*
spanica Ger. foliis laciniatis, ferratis, purpurascēte
 flore *C.B.* *Cyanus pulchro semine Centaurii majoris J.B.*
 Circa *Monspelim* in colle *Castri novi*, necnon propè
Scaleam in Regno *Neapolitano*.

Chondrilla foliis non dissectis, caule nudo *J.B.* Ad ra-
 dices montis *Salevæ*, & in arenosis ad fluv. *Arve* propè
Genevam.

Chondrilla juncea Ger. juncea viscosa arvensis, quæ prima Dioscoridis C.B. viminea *J.B.* viminalibus virgis *Park.* In Germania, Italia & Gallia Narbonensi, in arenosis copiosè.

Chondrilla viscosa, caule foliis obducto C.B. viscosa saxatilis caule *xmudobp Col.* In Sicilia circa Messanā, & in Gallia Narbonensi circa Monspel.

Chondrilla bulbosa, conyzæ facie, foliis angustioribus C.B. *Conyza marina* *Lugd. J.B.* In planitie quadam non longe à monte Lupi. Hæc planta *Conyza* aut *Aster rectius* dicitur quàm *Chondrilla*.

Chondrilla cærulea cyani capitulis C.B. v. Catanance.

† *Christophoriana* *Lob. Ger. vulgaris Park.* *Aconitum* racemosum, *Actæa* quibusdam *J.B.* *Acon.* ramosum, an *Actæa* *Plinii*? C.B. In sylvis montosis circa Genavam, & in Germania ad Rhenum copiosè. Nuperimè & hæc quoque in Anglia sponte orta nobis ostensa fuit.

Chrysanthemum Bellidis folio *hort. Pat.* latifolium *J.B.* *Hispanicum* rotundioribus foliis *Park.* *Bellis lutea* III, sive foliis subrotundis C.B. Inter segetes circa Liburnum portum copiosè.

Chrysanthemum Creticum *Ger. J.B. Park.* majus, folio in minores lacinias diviso C.B. In vineis & hortis oleaceis circa Messanā & alibi.

Chrysanthemum Valentinum *Clus. v. Bupthalmum* *Costæ* folio.

Chrysocome v. *Stœchas citrina*.

Chrysocome capitulis conglobatis *Ger. Helichrysum* IX, sive sylvestre angustifolium capitulis conglobatis C.B. *Stœchas citrina* altera odora *Park.* *Stœchadi citrinæ* alteri inodoræ *Lobellii* affinis capitulis brevioribus *J.B.* In muris & rupibus circa Messanā in Sicilia, Tolonā in Gallo-provincia, &c.

Cicér sylvestre *Matth. Ger. sylv. multifolium J.B. sylv. foliis oblongis hispidis majus C.B. sylv. majus Park.* Inter segetes non longè ab oppido *Fay* Genavam versùs. Hæc planta (me judice) ad *Glycyrrhizam* sylv. propius accedit quàm ad *Cicér*.

Cicér sativum *Ger. C.B. arietinum J.B. sativum*, sive arietinum rubrum, nigrum vel album *Park.* *Cicera* in Italia, Sicilia & Melita in agris feruntur, ubi Rustici ea cruda comedunt, viridia scilicet & adhuc immatura?

N. Quod cicera urinam & menses cieant, calculos pellant, ad Venerem stimulent, flatu gignant, ferè omnes

mnes tum Veteres, tum Recentiores consentiunt. Extrinsecus adhibetur farina in cataplasmatibus.

Cichorium spinosum Ger. *f.B. C.B.* *spinosum* Creticum *Park.* In insula sæpius memorata ad Promont. Pachynum in Sicilia.

Cichorium pratense vesicarium *Park. Col.* prat. hirsutum vesicarium *C.B.* In sepibus & agrorum marginibus à Liburno portu non longè.

Cichorium verrucarium sive *Zacintha* Ger. *Park.* verrucosum, sive *Zacyntha hieraciis* adnumerandum *f.B.* *Chondrilla verrucaria* foliis intybaceis viridibus *C.B.* Ad ostia Tybridis copiosè: itèmq; circa Liburnum portum, & Florentiam.

Cicutaria latifolia hirsuta *f.B.* palustris alba *Park.* palustris latifolia alba *C.B.* palustris latifolia rubra *ejusdem* ab hac fortè non differt specie. In pascuis montosis Juræ & Salevæ montium propè Genevam, præcipuè ad rivulos.

Cinara sylvestris Ger. sylv. latifolia *C.B.* *Scolymus* *Dioscoridis* *Park.* *Carduus Scolymus sylvestris* *f.B.* *Wild.* *Artichoke.* In Sicilia & Italia, necnon Gallia Narbonensi; ubi floribus ejus coaguli vice ad lac condensandum utuntur.

N. 1. Apponuntur capita [sativæ] aqua decocta; eorúmq; pulpa estur cum butyro & pipere; nec tantum capita nondum florecentia, sed & caules teneriores elixatos & cum butyro conditos comedunt Germani & Galli. Itali rarò decoquunt, sed cruda cum sale, oleo & pipere vorant. Venerem in utroq; sexu irritant, ut quod maximè; unde nil mirum si in tanto pretio sint, ut sine cibo hoc, nisi tempus anni neget, vix ulla opipara sit aut adjicialis cœna. *Scolymus* quoq; urinam ciere præcipuè traditur. *f.B. Plin.*

2. *Cinaræ* [sativæ] folia in liquore posseti [è lacte & vino albo] decocta ad icterum inprimis commendantur, ut medicamentum nulli secundum.

Circæa Lutetiana minor *Park.* minima *Col.* *Solanifolia* *Circæa Alpina* *C.B.* In sylvis montosis max. Carthusianorum cœnobio vicinis.

Cirsium v. *Carduus* *Cirsium* dictus *f.B.*

Cirsium foliis non hirsutis, floribus compactis *C.B.* montanum capitulis compactis *Park.* *Carduus* *Cirsium* *Monspelianum*, folio glabro longo *Matthioli* *f.B.* Ad Ladum amnem & alibi propè *Monspelim*.

Cirsium foliis non laciniatis virore *Brassicæ* *f.B.* Hujus iconi valde simile fuit quod invenimus propè *Plombinum* in Etruria.

Cistus annuus 2 *Clusii Ger.* annuus flore guttato *Park.* flore pallido, punicante maculâ insignito *C.B.* annuus 2 *Clusio*, flore pallido, punicante maculâ insignito *J.B.* Ad radices Vesuvii montis, ubi tamen maculam non habet. Vide Columnam. Suspiciatur *J. Bauhinus* plantam hanc eandem esse *Cisto* annuo flore guttato *Pona* & *Tuberariæ Myconi*; nec sine ratione.

Cistus foemina Ger. foem. *Monspeliaca J.B.* foem. vulgaris *Park.* foem. folio *Salviæ C.B.* Per Siciliam, Italiam & Galliam Narbonensem in sterilibus & saxosis collibus & sylvis. Duplex habetur, elatior & humilior, ut rectè notat *C. Bauhinus*.

Cistus ladanifera Monspeliensium C.B. ladanifera, sive *Ledum Monspeliacum* angusto folio nigricans *J.B.* *Cistus ledon* 5 *Clusii Ger.* An *Cistus Ledon IX*, i.e. foliis *Oleæ* sed angustioribus *C.B.*? In iisdem cum priore locis, & multò etiam copiosior.

Cistus mas folio oblongo incano *C.B.* mas 4, folio oblongo albido *J.B.* mas cum *Hypocistide Ger.* mas vulgaris *Park.* Cum prioribus. Cum *Clusius* in Hispania tot *Cisti* species invenerit, mirum nos neque in Italia, neque in Sicilia, neq; in Gallia Narbonensi, alias observasse species quàm tres proximè scriptas.

N. 1. Hujus folia & tenella germina, sed præcipuè flores desiccant & astringunt strenuè, unde & dysentericis & solutionibus ventris profunt, & ulcera sanant.

2. *Cisti* radicibus adnascitur *Hypocistis* dicta, quemadmodum *Rapum Genistæ*; Hæc magis adstrictoria est quàm *Cisti* folia, unde ad omnes fluxiones, hæmorrhagiam, profluvia muliebria, coeliacos, dysentericosq; affectus prodelt. Succus ejus in usu est. Cæterum *Hypocistin*, qua passim utuntur *Officinæ*, ex *Hirci* barbæ radicibus impostores conficiunt, succum inde exprimentes, ac ut conrescat insolantes. Errandi causam dederunt *Arabes*, quòd *Cistum Hirci* barbulam appellent. *J.B.*

3. E foliis *Cisti* (*Ledon* appellati) exudat liquor quidam, *Ladanum* dictus, in massas graves ex purpura fuscas coactus, odore valido sed suavi, inflammabilis, accensq; gratum odorem halans. Tradit *Dioscorides* succum hunc hircorum barbis dum fruticem depascuntur adhærescere, indeq; depecti. Quidam etiam (inquit) funiculos per frutices trahunt, & adhærentem ipsis pinguedinem ita derasam efformant. *Bellonius* hujus colligendi rationem, quam ipse in *Cretâ* observavit, ita describit, *Græci* (inquit) colligendo *Ladano* peculiare instru-

instrumentum parant rastro dentium experti simile, *Er-gastiri* illis dictum. Huic affixæ sunt multæ ligulæ sive zonæ e corio rudi nec præparato confectæ, eas leniter affricant ladaniferis fruticibus, ut inhæreat liquidus ille humor circa folia concretus, qui deinde à ligulis per fummos ardores solis cultris est abradendus.

3. *Ladanum* emollit, digerit, maturat, attenuat, aperit, orificia venarum referat, inspissat. Usus præcip. in capite humido ac catarrhoso, in dysenteria, &c. Extrinsecus ejus usus est in emplastris emollientibus, anodynis, tussim sedantibus, in Alopecia (inunge vel coque in vino & lava) in odontalgia, & cardialgia doloreque yentriculi (cum modico *Bdellii* pilulas faciunt dandas num. 1. & 2. horâ 1. ante pastum. *Crato.*) in suffocatione uteri (introrsum adhibitum) cicatrices curat. *Schrod.*

Clematis sive *Flammula* surrecta alba *f.B.* *Clematidis* VI, sive *Flammula* recta *C.B.* *Flammula* Jovis surrecta *Ger. Park.* In sepibus ad montes propè Ratisbonam in Germania.

Clematis sive *Flammula* repens *C.B.* *Clem.* sive *Flammula* scandens, tenuifolia alba *f.B.* *Clem.* urens *Ger.* urens flore albo *Park.* Circa Monspelim in collibus saxosis.

N. Hujus folia facultatis sunt acris & adurentis, imposita cutem exulcerant: intra corpus vix tuto assumentur.

Clematis *Daphnoides* major *C.B.* ma. flore cæruleo & albo *f.B.* *Daphnoides* sive *Pervinca* major *Ger.* *Clematis* *Daphn.* latifolia, sive *Vinca* *Pervinca* major *Park.* Circa Monspelim variis in locis. Vires *Clematidis* vide in *Cat. Ang.*

Clinopodium v. *Acinos.* *Alpinum* v. *Chamædryi* vulgari, &c.

Cneorum *Matth.* v. *Thymelæa* minor *Cordi.*

Cnicus sativus sive *Carthamum* *Officinarum* *C.B.* *Cnicus* sive *Carthamus* sativus *Park.* *Carthamus* sive *Cnicus* *f.B.* *Ger.* *Bastard Saffron.* Ab hortulanis Argentensibus & Spirensibus quotannis inter æstivas fruges sequitur.

N. 1. Flosculis tuis condimenti vice utuntur nec malè, cibos namq; croceo colore commendant, & alvum emolliunt: dicuntur & ictero mederi.

2. Præcipuus florum usus est ad sericum aliòsq; pannos tingendos, [colore incarnato] quin & eorum admixtione *Crocum* adulterant.

3. Me-

3. Medulla feminis pituitam viscosam ac aquas vomitu & dejectione purgat: pectori maxime confert, mirè status discutit, proinde colicis & anasarcae conducit. Ventriculo adversatur, ideòq; corrigitur stomachicis, anis. galang. zinzib. &c. Dosis in infuso à ℥iij. ad vj.

4. Ex semine facta compositio diacarthami insigniter confert hydropicis.

4. Seminis succus lac cogere dicitur, & magis ipsum resolvendæ alvi facultate donare.

Coccygia aut Coggygia v. Cotinus.

Colus Jovis v. Horminum luteum.

Colutea Ger. vesicaria C.B. *f.B.* vesicaria vulgaris Park. In Italia multis in locis reperitur, & speciatim in ascensu montis Vesuvii plurima, ubi nullæ fere aliæ plantæ. Habetur etiam circa Monspelium.

Colutea scorpioides Ger. *f.B.* Scorp. major Park. siliquosa five scorpioides major C.B. In collibus circa Genevæ, Monspelium & Salernum.

Colutea minima five Coronilla Ger. Coluteæ parva species, Polygala Valentina Clusii *f.B.* Polygala Valentina Clusii Park. Polygala altera C.B. In clivis maritimis propè Salernum, atq; etiam in Hetruria.

Colutea caule Genistæ fungoso *f.B.* qui titulus optime respondet huic nostræ. Polygala I, seu major Massiliotica C.B. Polygala Valentina 3 Clus. Val. marina Clusii Park. sub quinta. In Gallo-provinciæ clivis montosis propè oppidum S. Chamas.

N. Hujus folia, sed præcipuè semina, non solum purgant per inferiora, sed & vomitiones movent, velut semina Genistæ; sunt autem ventriculo & visceribus inimica, ideòq; nonnisi robustioribus exhibenda.

Consolida media Genevensis *f.B.* An Consolida media cærulea Alpina C.B. ? Bugula Alpina cærulea Park. Ad agrorum margines circa Genevæ & Basileam copiosè.

Consolida regalis v. Delphinium.

Convolvulus Althææ folio Park. argenteus Althææ folio C.B. Ger. *emac.* peregrinus pulcher folio Betonicæ *f.B.* Circa Messaniam in lingula inter fretum Siculum & portum Messanensem procurrens, inter frutices copiosè.

Convolvulus cæruleus minor folio oblongo Ger. VII, five peregrinus cæruleus folio oblongo C.B. Aa minor cæruleus Hispanicus Park. ? In insula ad Promont. Pachynum. Flos huic pulcher cæruleus.

Convolvulus spicæ-folius Park. minimus spicæ-folius Ger. Ad.

Ad. Lob. Linariae folio C.B. Volvulus terrestris f. B.
 In Italia, Sicilia & Narbonensi Gallia vulgatissima.
Conyza mas Theophrasti, major Dioscoridis C.B. major
verior Dioscoridis Park. major Monspeliensis odorata
f. B. odorata Ger. In Italia, Sicilia & Gallia Narbo-
nensi passim.

Conyza minor vera Ger. f. B. minor vera Ponæ Park.
fœmina Theophrasti, minor Dioscoridis C.B. Circa
Monspelim & in Italia ad mare inferum.

Conyza quædam marina. Propè Peroul non longè à Mon-
spelio.

Conyza marina f. B. v. Chondrilla.

Coris cærulea maritima C.B. cærulea Monspeliaca Ger.
Monspeliensium Park. Monspessulana purpurea f. B.
In arenosis maris litoribus propè montem Ceti & a-
libi.

Cornus mas Ger. sylv. mas C.B. mas fructu rubro Park.
sativa sive domestica f. B. In sepibus Pedemontanis &
Mediolanensibus.

N. Corna refrigerant, exiccant, adstringunt, consti-
 pant quomodocunq; sumpta. Hinc conveniunt præ-
 cipuè in diarrhœa ac dysenteria: ardorem febrilem &
 sitim gratâ suâ aciditate leniunt & restinguunt.

2. Condiuntur muriâ ut Olivæ; sit etiam ex iis sapa
 quemadmodum ex cerasis; itémq; è pulpa electuarium,
 ad febres, ad fluxiones biliosas, ad sitim, ad excitandam
 appetentiam utilia. In diarrhœa & dysenteria ex-
 hibentur fructus exiccati & pulverisati ad ʒj.

3. Cornum arborem caveri oportet circa alvearia;
 nam flore ejus degustato alvo concita moriuntur apes.
Plin.

4. Hujus lignum omnibus lignis durius perhibetur,
 ad radios rotarum utilissimum; quin & eundem habet
 effectum in demorsis à cane rabido quem fœmina Cor-
 nus.

Coronopus foliis acutis in margine dentatis. Plantagini
affinis Bibinella Siciliæ herbula f. B. Hæc planta optimè
describitur à Cæsalpino sub titulo Bibinella. Non est
à Plantago maritima nostras, nec ei multum similis,
quamvis C. Bauhinus eandem faciat. Plantago Apula
bulbosa laciniata Col. i. e. angustifolia VII, sive Plan-
tago pilosa bulbosa C.B. Apula bulbosa Park. huic no-
stræ persimilis est, & fortasse eadem, verum an bulbo-
sam habuerit radicem non animadvertimus. Propè
Messanam in lingua quæ portum efficit, & alibi in Si-
cilia.

Coro-

Coronopus Massiliensis Lobelii *J.B.* Coron. five Serpentina minor *Ger.* *Holotheum VIII*, five *Massiliense C.B.* An VI, five strictissimo folio majus *ejusdem*? Verum quicquid de aliis sit, Planta quam volumus ipsissima est quam *Lobelius* describit; namq; in eodemmet loco eam invenimus *Massiliæ*.

Coronopus maritimus Rainaudeti *J.B.* *Coronopi* & *Sedi montani* media planta *Massiliensium Lob.* In arenosis ad mare propè *Massiliam*.

Corruda v. Asparagus sylvestris.

Cotonafter folio oblongo v. Chamæspilus.

Cotoneaster Gesneri *J.B. Park.* *Cotonafter folio rotundo non ferrato* & *Chamæspilus Cordi C.B.* *Chamæspilus* *Ger.* *Epimelis Lugd.* In montibus propè *Genevam* & *Rhenum flumen*.

Cotinus Matth. *Coccygia* five *Cotinus putata* *J.B.* *Coccygia Theophrasti* vel *Cotinus coriaria Plinii* *Ger.* *Coggigia* five *Cotinus coriaria Park.* *Cocconilea* five *Coccygia C.B.* Propè pontem quà transitus est eundo à *Gratianopoli à la fontaine que brusle.*

Cotyledon media foliis oblongis ferratis C.B. v. Sedum.

Crithmum 4 Matth. v. Eryngium.

Crithmum spinosum *Ger.* *maritimum spinolum C.B.* *marit. spinosum* five *Pastinaca marina Park.* *Pastinaca marina*, quibusdam *Secacul.* & *Crithmum spinosum J.B.* In arenosis *Maris Mediterranei* litoribus nusquam non obvium.

Crocus vernus latifolius flore purpureo *Ger.* *vernus minor purpurascens C.B.* *vernus latifolius flore purpureo minore J.B.* In agris & pascuis *Romæ* vicinis; inque montosis pascuis circa *Curiam Rhætorum*, necnon in summitatibus montis *Juræ*.

Cruciata minima muralis Col. minima in maritimis *Cæs.* *Rubia echinata saxatilis Park.* *Rubeola echinata saxatilis C.B.* *Rubia quadrifolia verticillato semine J.B.* In arenosis juxta mare propè *Liburnum*.

Cucumis asininus *Ger.* *agrestis* five *asininus Park.* *sylv. asininus dictus C.B.* *sylv. five asininus J.B.* *Cucumis Elaterii sylv. Lob.* In locis rudèratis & ad vias in *Italia*, *Sicilia* & *Gallia Narbonensi* frequens.

N. Hujus succus leniter expressus ac inspissatus *Elaterium* dicitur. Ultra 100 annos efficax manere creditur. Aliis maximè probatur quod lucernæ objectum facillè flagrat; alijs quod lucernis admotum lumen extinguat. *v. Park. & J.B.* Humores serosos vehementer purgat supernè & infernè, menses movet, foetumq; interimit. Verum quia malignitate non caret corrigi debet

bet *Lacte*, *Tragacantho*, *Bdellio*, & corroborantibus idoneis, ut *Cinnam*, *Spec. Diarrhod*, *Abbatis*, &c.

Cyanus major Lob. Ger. major vulgaris *Park.* *Alpinus* radice perpetua *J.B.* *montanus latifolius*, vel *Verbasculum cyanoides C.B.* Primò invenimus in montibus juxta *Spadam vicum*, postea etiam in monte *Jurâ* sæpius memoratâ.

Cyanus V, sive repens *latifolius C. B.* *peramarus repens folio Lavendulæ J. B.* *repens latifolius Lobelii Park.* *repens latifolius Ger.* Circa *Montspelim* frequens. Reftius, meâ sententiâ, *Jaceis* annumeraretur.

Cyclaminus folio rotundiore elatior J.B. *Cyclamen orbiculato folio*, infernè *purpurascens C.B.* *orbiculato folio Ger.* *Autumnale vulgare folio rotundo Park.* In montibus circa *Genevam* *Junio & Julio* floret; invenimus etiam in *Alpibus Stiriâcis*.

N. *Cyclamini* hujus caput interdum in longitudinem excrescit, & in duo velut cornua dividitur, ut nos cum *J. Bauhino* observavimus, cum in *Alpibus Stiriâcis* aliquot ejus radices erueremus. Proinde frustra multiplicat species *C. Bauhinus*, cum *Cyclaminum* longius radicatam *Gesn.* & *Cycl.* radice instar capitis arietini ejusdem species ab hac distinctas facit.

Cyclaminus folio anguloso J. B. *hederæ folio C.B. Lob. Ger.* *autumnale folio hederæ Park.* In collibus sylvestribus circa *Romam* abundat, mense *Septembri* florens.

Cyclamen vernum Lob. Ger. *folio anguloso C.B.* In sylvis quas transivimus itinere à *Massâ* ad *Lucam* primo vere floruit.

N. Hujus radix potenter incidit, aperit, absterget, errhinum est. Ufus præcip. in obstructis mensibus, impellendo foetu mortuo, in ictero, in calculo expellendo; strumis ac tuberculis discutiendis. Internè cauto opus est; externo usui præstat. Adeò vehemens ejus facultas est (inquit *Galenus*) ut abdomine illito ventrem subducatur & foetum interimat. Icterus sanat experientiâ certâ prodente *Mesuiâ*. Ad tinnitum aurium singulare est remedium oleum, &c. v. *Matth.*

Cymbalaria C.B. *Italica hederacea Park.* *Italica Ger.* *flocculis purpurascens J.B.* *Basileæ* in ipsius urbis muris; At in *Italia* nihil frequentius.

Cuminum sylvestre alterum Dioscoridis Italorum Lob. *Cuminum corniculatum*, sive *Hypecoon Clusii Ger.* *Hypecoon C.B.* *Hypecoon siliquosum J.B.* *Hypecoon legitimum Clusii Park.* In *Sicilia*, lingulâ illâ *Portum Messanensem* à freto *Siculo* dirimente.

Cuminum

Cuminum five *Cuminum sativum* *J.B.* vulgare *Park.* sativum *Ger.* semine longiore *C.B.* In insula Melita se-
ritur.

Cuminum five *Cuminum* seminibus hirsutis seu villosis. In insula prædicta cum præcedente succrescit, sed rari-
us. Hoc nescio an à quoquam hætenus sit descri-
ptum.

N. Semen resolvit ac flatus discutit, ideòq; utile est in colica, tympanite & vertigine: tussim sedare & tho-
racem expurgare dicitur. Utiliter pani incoquitur, & caseis inditur, ita concoctionem juvat & flatus dissipa-
t.

Cynoglossum minus *J.B. C.B.* minus flore cæruleo *Park.* Circa Moguntiam & Genevam se nobis in conspectum
dedit.

Cyperus longus *Ger.* longus odoratus *Park.* odoratus ra-
dice longa; five *Cyperus Officinarum* *C.B.* paniculâ
sparsâ speciosâ *J.B.* In pratis circa Monspelium; ob-
servavimus etiam in Italia & Sicilia.

N. Stomachica est ac uterina. Usus præcip. in urinâ
ac menses ciendis, cruditate ventriculi consumenda,
hydrope inchoato præservando, colica ac vertigine dis-
cutienda; ad ulcera oris & pudendorum exsiccanda &
sananda [pulvis inspersus] valere dicitur: masticata
emendat oris foetorem. Cocta in oleo, contusa & im-
posita renibus ac pestini, urinam proritat. *Schrad.*

Cytisus glaber siliquâ latâ *J.B.* *Cytisus* *Ger.* *Cyt.* glaber
foliis subrotundis, pediculis brevissimis *C.B.* Pseudo-
cytisus foliis subrotundis *Park.* In clivis maritimis
propè Salernum.

Cytisus incanus siliquis falcatis *C.B.* *Cyt.* *Maranthæ* *Mat-
thiolo Lob.* siliquâ incurvâ, folio candicante *J.B.* 7 cor-
nutus *Ger.* *Cyt.* *Galen*i creditus *Maranthæ*; cornutus
Park. Ad Baias invenimus.

Cytisus hirsutus *J.B.* *Hispanicus* arboreus *Park.* *Incanus*
vel *hirsutus VI*, five foliis subruffâ lanugine hirsutis *C.B.*
Pseudo-cytisus hirsutus *Ger.* Hic in magnum fruticem
adolefcit, estque in Italia & Sicilia vulgarissimus.

Cytisus sylvestris *Ratisponensis* floribus luteis, ad exortum
foliorum prodeuntibus *horti med. Altorffini.* In Suevia
& Bavaria propè Ratisponam. Hic an descriptus sit,
nondum scimus.

Cytisus Gesneri cui flores ferè spicati *J.B.* glaber *III*, five
glaber nigricans *C.B.* *Cytisus* *Ger.* Pseudo-cytisus niger
Park. In Austria & Stiria itinere à Vienna ad Venetias
copiosum observavimus.

Cytisus

Cytisus Hispanicus 1 Clusii, folio virescente *f. B.* minori-
bus foliis, ramulis tenellis villosis *C. B.*? Dubitat
J. Bauhinus an *Cytisus* suus montis *Calcaris* sit idem huic
primo Clusii necne, & an uterq; sit idem *Cytiso* Lo-
bellii in Adv. descripto, quem viâ à Roma ad Floren-
tiam in planitie propè *Aquas pendulas* invenit, ubi &
nos hunc nostrum. Cortex ei glabra & candicans.

D

D *Amasonium* v. *Helleborine*.

Daucus Creticus semine hirsuto *f. B.* *Alpinus*, Cre-
tico similis *Park.* *Alpinus* multifido longôq; folio;
five montanus umbellâ candidâ *C. B.* In summitate mon-
tis Juræ.

Daucus 3 *Dioscoridis Col.* *Apium IX*, five peregrinum
foliis subrotundis *C. B.* *Visnaga* minor quorundam, *Se-
linum* peregrinum Clusio, semine hirsuto *f. B.* *Selinum*
five *Apium* peregrinum Clusii *Park.* In sepibus circa
Messanam Siciliæ urbem.

Daucus glauco folio, similis *Fœniculo* tortuoso *f. B.* In
collibus inter vepres juxta *Castelneuf*, *Monspelio* non
longè.

Daucus montanus *Apii* folio, flore luteo *C. B.* *Park.* In
montosis propè *Ratisponam* primò, deinde etiam circa
Genevam in monte Jurâ. Hujus foliorum divisura ac-
cedit ad *Pimpinellam saxifragam* minorem; eiq; satis
aptè congruit icon *Park.* & *C. B.* Aliquando existimavi
hanc fuisse *Umbelliferam* *Alsatiam* magnam, umbellâ
parvâ luteâ *f. B.*

Daucus *selinoides* v. *Saxifraga* *Venetorum*.

Delphinium simplici flore purpureo-cæruleo vulgare *f. B.*
Consolida *regalis arvensis C. B.* *regalis sylvestris Ger.*
Delphinium siye *Consolida regalis sylvestris Park.*
In *Germania*, *Italia* & *Gallia Narbonensi* inter se-
getes.

Delphinium flore cæruleo minore, folio lato. Flos *Ca-
puccio* 2 *Cas.* *Consolida regalis latifolia* parvo flore
C. B. *reg. peregrina*, parvo flore *f. B.* In insula *Melita*
circa urbem novam in ruderibus & muris. Vidimus etiam
in *Sicilia* & *Italia*.

N. Visum acuit & roborat tum succus florum expressus,
tum eorundem aqua destillata; imo vel continuus intus.

itus. In potionibus vulnerariis utile esse perhibetur, consolidat enim & glutinat, unde & *Consolida* nomen indeptum est. Et ut nihil omittam, tradit Jo. Bauhinus, Herbam in pulverem redactam cum ejusdem aqua stillicitia potam venenis adversari, cardialgiæ conferre, calorem præter naturam extinguere, bilem reprimere, necnon tussim & stillicidium. Conserva florum commendatur ad tormina ventris infantum, & ad ardorem stomachi. *Schrod.* qui *Calcatrippam* appellat.

Dens caninus flore albo *Ger.* canis latiore rotundioréque folio *C.B.* In *Liguria* montibus eundo à *Nova* oppido ad *Genuam*.

Dens caninus flore purpureo *Ger.* *Erythronium* flore purpureo *Lob.* *Satyrion* quorundam *Erythronium* bifolium, flore unico radiato albo & purpureo *J.B.* Propè *Augustam* *Taurinorum* ad latera montis quem ascendimus eundo indè ad *Astam*. Hæ duæ plantæ mihi non aliter differre visæ sunt quàm solo floris colore.

N. Ventris tineas necare; coli dolores mitigare; vires rescire & nutrire; Venerem excitare; ex aqua pueros Epilepticos juvare dicitur. *J.B.* è *Clusio* & *Lob.*

Dens leonis bulbosus *Ger.* D. I. III, sive *Asphodeli* bulbis *C.B.* D. I. *Monspeliensium*, sive *Asphodeli* bulbis *Park.* Circa *Sellam novam* vicum *Monspelio* vicinum.

Dentaria aphyllas purpurea cespite denso. Ex singulis squamis singulos promit flores, pediculis semuncialibus insidentes, è calyce amplo in quinque lacinias diviso, galeatos, magnos, purpurascens cum staminibus intus plurimis. Calyx striatus, turgidulus. In Italia eundo à *Lericio* ad *Lucam* in umbrosis vidimus

Dentaria heptaphyllos *C.B. Park.* heptaphyllos *Clusii Ger.* *Coralloides* altera sive septifolia *J.B.* In *Jura* & *Saleva* montibus copiosè.

Dentaria pentaphyllos *C.B. Park.* pentaphyllos *Clusii Ger.* quinquefolia *J.B.* In sylvestris jugis montis *Juræ* copiosè.

Dentellaria Rondeletii v. *Plumbago*.

Dictamnus albus Officinarum v. *Fraxinella*.

Digitalis lutea magno flore *C.B.* lutea folio latiore, flore majore *J.B.* amplo flore *Park.* In montibus circa *Genevam* & in *Germania*.

Digitalis lutea *Ger.* lutea vel pallida parvo flore *C.B.* flore minore subluteo, angustiore folio *J.B.* Cum priore, itémq; circa *Salernum* & *Neapolin* in Italia.

Diospyros

Diospyros *J.B.* Alni effigie lanato folio minor *C.B.* *Vitis* Idæa tertia *Clusii Park.* *Vaccinia* albâ *Ger.* *Amelan-*
chier Lob. In montibus circa Genevam, & in lateribus
montium Rheno imminentium.

Doronicum vulgare *J.B. Park.* majus *Officinarum Ger.*
Romanum Lugd. radice *Scorpii C.B.* In montibus pro-
pe Genevam copiose : at radix nihil habet cum *Scorpio*
similitudinis.

N. Disputatur inter Botanicos, an *Doronicum* sit
venenatum necne : *Matthiolus* illud affirmat, & expe-
rimento caniculæ, quam 4 drachmis radicis strangula-
vit, probat. Huic contradicit *Lobelius*, & more suo
in *Matthiolum* acriter invehitur : nec refert (inquit)
quod caniculis perniciosum sit, cum non pauca reperi-
antur aliis animantibus noxia & lethifera, quæ homini
non modò innocua sed & salutaria sunt. Nam expe-
rimento certum habemus, Aloe saluberrimâ interfici
vulpes, & ex *Plutarcho* easdem enestas *Amygdalis* ama-
ris discimus, &c. Verum ego mallem suffragari *Mat-*
thiolo, quàm in humano corpore experiri quod canibus
aliisve quadrupedibus perniciosum comperi. *Gesnerus*
ut manifestè redargueret *Matthiolum*, scribit se 3ij.
radicis hujus sumpsisse, & per 8 quidem horas bene
habuisse ; verum is elapsis ventrem ac stomachum in-
flari sensisse, & circa os ventriculi imbecillitatem quan-
dam, & corpus totum infirmius, ita ferè ut aliàs semel
ac iterum ex nimio frigida potu perceperat. Quæ
symptomata cum biduo durarent, nec videbantur sponte
cessatura ingressum fuisse aquæ calidæ solum & curatum
fuisse. *Costus* scribit *Gesnerum* esu radicis *Doronic*
obiisse. *C. Hoffm. De Medicam. Officin.*

Dorycnium *Monspessulanum* fruticosum *J.B.* suppositi-
tium *Monspeliense* & *Hispanicum Park.* *Hispanicum Ger.*
Trifolium album angustifolium, floribus velut in capitu-
lum congestis *C.B.* In saxosis collibus & ad sepes propè
Monspelum.

Dorycnio congener planta *J.B.* *Dorycnio* congener *Clusii*
Park. Lotus pentaphyllos incanus *C.B.* In palustribus
prope mare non longe à *Monspelio*. In Germania ad fl.
Lycum propè *Augustam*.

Draba albâ siliquosa repens *C.B. Park.* *Hesperis* Alpina
seu muralis minor repens *J.B.* *Draba* altera repens *Ger.*
emac. In montibus Jura & *Salvæ*, præsertim locis hu-
midis ad aquarum scaturigines.

Draba vulgaris *Park.* *Diolcoridis Ger.* multis flore albo
J.B. *Draba* umbellatâ, vel *Draba* major capitulis dorâ-

- ta C.B.* Intra muros Antverpiæ. Quin & in Germania, Italia, Gallia non infrequens.
- Draba lutea Park.* lutea quibusdam *f.B.* lutea siliquis strictissimis *C.B.* 4 *Ger.* In Italia aliquoties vidimus viis humidis ad sepes. In Germania prope *Weissenbergh.*
- Draba siliquosa Lyfimachiz facie, an Myagri species?*
In alveo torrentis cujusdam prope Florentiam Etruriz urbem.
- Dracunculus aquaticus Ger. f.B.* noster aquaticus *Park.* palustris, sive radice arundinacea *Plinii C.B.* In Hollandiz fossis prope *Sevenbuys.*

E

- E** *Chinopus v. Carduus Sphærocephalus.*
Echium Alpinum luteum C.B. *Alopecuros Alpinus* quibusdam, *Echium montanum Dalechampii f.B.* *Trachelium spicatum tenuifolium Park.* In altissimis jugis montis Juræ.
- Echium majus & asperius flore albo C.B.* flore albo majus *f.B.* In agro Salernitano & Romano, inq; Etruria & Gallia Narbonensi. Hæc reverà totâ specie distincta est à vulgari *Echio*, & non floris colore tantum.
- Echium Candiz, flore pulchrè rubentè f.B.* *Creticum latifolium rubrum C.B. Park.* Flos plantæ quam intelligimus dilutè rubet. In Galliz Narbonensis locis plurimis copiosè, circa Monspelium tamen rariùs occurrit.
- Echium procumbens flore parvo cæruleo.* In Sicilia circa Messanam.
- Elatine folio acuminato, flore cæruleo C.B.* flore cæruleo, foliòq; acuminato *Park.* In Sicilia circa Messanam, itémque in Italia & Gallia Narbonensi inter segetes. Non alia re differt à vulgari quàm floris colore.
- Epimedium Lob. Ger. C.B. Park. &c.* quorundam *f.B.* In Alpibus non longè à *Pontieba*, quâ ad Viennam Austriæ indè iter est.
- Erica arborescens, floribus luteolis vel herbaceis minimis f.B.* major *Scoparia*, foliis deciduis *C.B.* *Scoparia Park.* In luco Gramuntio prope Monspelium, & in ericetis prope Liburnum.

Erica

Erica arborefcens Monfpelienfis flore purpurafcente, ramulis ternis *J.B.* An *Erica* ramulis per intervalla ternis *Ger. C.B.*? *Er. coris folio* 5 *Clusii Park.* Maxima hæc eft ex omnibus quas hætenus vidimus *Ericis*. In itinere à *Nova* ad *Genuam* observavimus quæ humanam altitudinem longè superaret, jam tum *Aprilis* initio florere incipientem. Flosculi dilutâ purpurâ obiter tinguntur. In *sylva Gram.* tantam altitudinem non affequitur.

† *Erica folio Corios multiflora J.B.* maxima purpurafcens longioribus foliis *C.B.* *Juniperifolia* densè fruticans *Narbonensis Lob.* *Ericæ Corios folio* secundæ species altera *Clus.* *Coris folio* maxima purpurafcens *Park.* Circa *Pedenatium* quâ indè *Monfpelium* itur copiofè: itémq; eundo à *Monfpelio* ad oppidulum *S. Lupian* fecus vias. Seriùs & sub finem æstatis, inq; multum *Autumnus* floret. Hanc speciem non ita pridem invenimus in *Cornubia Angliæ*, v. *Cat. Ang.*

Erica Pannonica 4 *Clus.* parva *Pannonica*, foliis *Corios* ternis, flore carneo, capitulis *Thymi J.B.* procumbens, ternis foliolis carnea *C.B.* *Er. coris folio* 9 *Clusii Ger. emac.* supina carnea *Park.* In rupibus eundo à *Tridento* ad *Bolzanum* mense *Februario* florentem copiofam invenimus.

Erica procumbens herbacea *C.B.* supina herbacea *Park.* parva foliis corios quaternis, flore herbaceo, foliaceis capitulis *J.B.* In *sylvis* montosis non longè à *Lindavia Germaniæ* urbe ad lacum *Acronium* sitâ, sub finem mensis *Augusti* jam tum florere incipientem observavimus. Primæ speciei similis est sed minor.

Erinus Cas. & Col. v. *Alfine* oblongo ferrato folio.

Eruca echinata siliquâ *C.B.* *Monfpeliaca* siliquâ quadrangulâ *Park.* *Sinapi echinatum J.B. Lugd.* Inter segetes non longè à *Lucâ*, secus viam quæ indè ad *Pisas* ducit.

Ervilia v. Ochrus.

Eryngium luteum Monfpeliense v. Carduus Chrysanthemus.

Eryngium arvense foliis serræ similibus *C.B.* montanum *Ger.* *Crithmum* 4 *Matthioli umbelliferum J.B.* Inter segetes in *Germania* circa *Rhenum* frequens. Hoc *Park.* cum *Sphondyllo* ineptè confundit.

Eryngium caruleum J.B. montanum *Amethystinum C.B.* In montibus *Stiriæ.* Solo summitatum colore à vulgari campestris differre videtur.

Erysimum Matthioli alterum *Lob.* alterum *Italicum Ger.*

verum five montanum *Park.* alterum Matthioli, filiquis parvis, quibusdam *Dentaria* *J.B.* Eryf. polyceration five corniculatum *C.B.* In ipso maris litore ad Rhegium *Calabriæ* urbem.

Esula v. *Tithymalus*.

Euphrasia pratensis lutea *C.B.* prat. major lutea *Park.* *Coris Monspessulana lutea* *J.B.* *Sideritis pratensis lutea* *Lugd.* Primò eam invenimus in Germania non procul *Altdorffio* *Norimbergensium Academia*, deinde in *Etruriâ*, tandem in *Narbonensi Gallia*. Serius post mediam ætatem floret.

F

F *Aba* veterum serratis foliis *Park.* *Ger. in App.* *Ara-*
cus fabaceus serratus *J.B.* Inter frutices circa
Baias.

Ferrum equinum *Lob. Ger.* equinum majus *Park.* *Solea*
equina *J.B.* *Ferrum equinum* filiquâ singulari *C.B.*
Circa *Liburnum*, *Neapolin* & alibi in *Italia*.

Ferrum equinum Gallicum *Park.* *Gallicum* filiquis in
summitate *C.B.* *Polygalon Cortusi* *J.B.* Ad latera
montis *Salvæ* propè *Genevam*, & in *Delphinatu* circa
Gratianopolin.

Ferula *Lob. Ger.* foemina *Plinii C.B.* tenuiore folio *Park.*
folio *Fœniculi*, semine latiore & rotundiore *J.B.* In
montibus *Messanæ* imminentibus copiosè, & alibi in
Sicilia & *Italia*: plurima quinetiam & procera in *Nar-*
bonensi Gallia, præsertim illis rupibus præruptisq; saxis
propè subterraneas cryptas, viâ qua *Monspelio Fronti-*
gnanam itur ad dextram, *Lobelio* olim, nobis nuperrimè
observata.

N. 1. Medullâ hujus caulium fungosâ pro fomite ad
ignem concipiendum nonnullos in *Sicilia* usos observa-
vimus, cum in insula illa peregrinaremur; unde intel-
ligitur cur *Poetæ* finxerint *Prometheum* ignem cœlestem
cavâ ferulâ exceptum deportasse in terram. *Ἐν κοιλῇ
ταῖς ὄνυ λαθόν Δία περικέλευσεν. Hesiod.*

2. Hujus viridis medulla pota sanguinem spuentibus
& celiacis prodest, sanguinis eruptiones sistit: Semen
potum torminibus auxiliatur: *Diosc.*

3. Hujus

3. Hujus succus inspissatus seu Gummi *Galbanum* dicitur : cujus usus intrinsecus est in mensibus ac partu pellendis ; in tussi inveterata ac asthma : Adversatur toxicis. Extrinsicus prodest in partu ac mensibus, suffocatione uteri, vertigine ; in furunculis & lentiginibus. *Schrod.*

4. E ferulis primâ tantum germinatione corculum quoddam pastores eximunt, ovi luteum induratum referens, quod sub cineribus assatum, prius tamen chartâ aut linteo madefactis involutum, mox pipere & sale conspersum, non modò gustui gratissimus est cibus, sed etiam ad excitandam Venerem valentissimus.

Ficus F.B. Ger. vulgaris Park. communis C.B. The common Fig-tree. In Italia & Gallia Narbonensi frequentissima, non tamen sponte.

Ficus sylvestris Dioscoridi C.B. Caprificus Ger. F.B. Park. The wild Fig-tree. In Italia & Gallia Narbonensi passim provenit.

N. 1. Veteres in descriptione virium hujus arboris admodum sunt prolixi, videbis Plinium & Dioscoridem. Caricæ calefac. & humectant, pulmonariæ sunt & bechicæ, arenulis renum & vesicæ medentur, venenis resistunt : præcipui usûs sunt in variolis & morbillis ad cutem pellendis ; maturant, molliunt, attrahunt, undè & bubonibus pestilentialibus (innuente S. Scripturâ) conferunt. Mulierculis nostratibus, appropinquante partu, ficuum tostatum esus ad partum facilitandum est familiarissimus. Quin & familiare est super ficus spiritum vini accendere, brodiûmq; ad tussim sedandam propinare. *Schrod.*

2. Ficuum frequentem elum pediculos generare præter Galenum Paulus Ægineta, Oribasius & recentiorum quamplurimi sibi persuasum habent : quæ opinio & apud vulgus nostratum viget. Cujus rei causam tum demum inquiremus cùm de experimento nobis constiterit.

3. Ficus recentes modò maturæ sint à ventriculo ocysimè & facillimè conficiuntur, imò quovis alio fructu horario celerius coquuntur. Quod vel indè constat, quòd non solum citra noxam copiosius aliis fructibus eas ingerimus, sed etiam illis præsumptis, si consuetum & parem cibi modum addamus id nihil incommodat. *F.B.* Nos certè in Italia ante prandium ficus sæpenumero sine ullo incommodo copiose ingessimus. Galenus, ut salubrem vitam degeret ab omni fugaci pomo abstinuisse se tradit à 28. anno ætat, ad senectutem

usque, exceptis exactè maturis ficibus atq; uvis : Quin & amicos qui ejus monitu ab ~~improvisis~~ fructibus abstinentur sine morbis fuisse. *J.B.*

4. Quæ de caprificatione Veteres tradunt sic brevibus complexus est *J. Bauhinus*. E putrescente Caprifici fructu culices geniti, in urbanæ fructus evolant, eosq; morfu aperientes superfluum humiditatem depascuntur, radiosque unâ solares intromittunt, adeoque eorundem concoctionem & maturitatem promovent & accelerant.

5. Literæ quæ succo seu lacte turionum hujus arboris in charta exarantur omnino inconspicue sunt, donec charta igni admota vehementer calefiat; quod etiam aceto, succo limonum aliisque pluribus commune est. Acris est & causticus hic succus, lac coagulat, &c.

6. Ficus à plerisque botanicis flore carere traditur. Verum (inquit *J. Bauhinus*) Fructus cum ad mediam magnitudinem pervenerit, flores intra se concipit, figurâ confertis staminibus similes, colore in candido purpurascens, undiq; è carne exeuntes, atq; ad mediam fructus cavitatem se dirigentes: quod Cordus primum observavit.

Filix saxatilis non ramosa minima, an Dryopteris Dalechampi *J.B.*? An Dryopteris sive Filix querna repens *Adv.*? In rupibus squalidis montium Juræ & Salevæ.

Flos Adonis flore rubro *Ger.* Adonis vulgo, aliis Eranthemum *J.B.* Adonis sylvestris, flore phoeniceo ejusq; foliis longioribus *C.B.* Circa Liburnum inter segetes.

Filix saxatilis corniculata *v. Adianthum*.

Flammula Jovis *v. Clematis*.

Faniculum tortuosum *J.B.* Sefeli Massiliense Fœniculi folio quod Dioscoridi censetur *C.B. Park.* In Sicilia circa Messanam primò, postea circa Monspelium copiosissimum vidimus. Serius floret.

Fœnum Burgundicum *v. Medica*.

Fraxinella *Ger. Park.* Cordi & Officinarum *Lob.* Dictamnus albus vulgo, sive Fraxinella *C.B.* Fraxinella, Officinis Dictamnus *J.B.* In præruptis montium Rheno vicinorum non semel vidimus.

N. 1. Radix cordialis est, alexipharmaca, uterina, cephalica. Vermes necat, menses & urinas movet, secundas & foetum mortuum educit, valet ad alvi torsiones & ejiciendos renum calculos in vino pota. Usus præcip. in peste & morbis malignis, in Epilepsia, aliisque affectibus capitis.

2. Siliquæ

2. Siliquæ & flores contactu pruritus faciunt, & in calidioribus regionibus cutem exulcerant.

Frumentum Indicum v. Maiz.

Fucus marinus rotundifolius *C.B. v. Opuntia marina.*

Fumaria bulbosa flore albo *C.B. bulbosa, radice cava; flore albo f.B. Radix cava major alba Ger. Ubiq; fere ad sepes, inq; scrobibus umbrosissq; sepibus Alpium Helveticarum.*

Fumaria bulbosa flore purpureo *C.B. radice cava, flore purpureo f.B. Radix cava major purpurea Ger. Cum priore sed magis frequens, nec aliter ab ea differre videtur quàm solo floris colore. Invenimus hanc in agro Mediolanensi, cum vere primo Mediolano Taurinum iter faceremus.*

Fungus auricularis *Cæsalpini v. Alcyonium.*

G

Galeopsis sive Urtica iners flore purpurascens majore, folio non maculato *f.B. Synonyma quære apud J. Bauhinum. Autores nostri hanc speciem confundunt cum Lamio purpureo, folio & flore minore, quod solum in Anglia sponte provenit. Suspiciatur Parkinsonus Lamium purpureum minus incognitum fuisse Cæsalpino, Matthiolo & antiquioribus Botanicis, quoniam Lobelius & Dodonæus primi veram ejus iconem ediderunt, & proinde Angliæ peculiare & exteris regionibus minus notum conjectatur. At verò utrumq; Lamium purpureum regionibus transmarinis frequens & ubiq; fere obvium. Speciem majorem in Anglia nondum spontaneam vidi.*

Galeopsis maculata *f.B. Lamium albâ lineâ notatum C.B. Lam. Plinii montanum Columnæ Park. Milzadella vulgò, Leucas Dioscoridis fortè Cas. In Italia & Gallia Narbonensi frequens occurrit. Nescio an alia re quaquam à minore purpureo differat quàm albo hoc ductu in foliis mediis.*

Galega *Lob. Ger. f.B. vulgaris C.E. Park. Ruta capraria Gesn. In Italia nusquam non obvia.*

N. 1. Celeberrimum est alexipharmacum ac sudoriferum, venenum inprimis pestilentielle insigniter discutiens. Usus ejus præcipue in petechiis expellendis;

aliisq; morbis pestilentialibus, ipsaq; peste curanda; in morbillis; in Epilepsia infantum (exhibetur succi cochlear. 1.) in ictibus serpentum; in lumbricis, quos etiani extrinsecus applicata fugat. Estur a. herba ipsa cruda vel cocta, ad hos usus.

2. Foliorum succus vel etiam folia ipsa tusa & imposita tumoribus apum aut vesparum ictibus excitatis, dolorem statim mitigant & tumores discutiunt.

Gallium rubrum *Ger. C.B.* flore rubro *Park.* flore rubro *Sprengerianum f.B.* In Alpibus dum Viennâ Austriæ Venetias iter faceremus sæpius in conspectum se dedidit.

Gallium flore albo majus v. *Mollugo montana.*

Genista Hispanica *Ger. juncea f.B.* **Spartum Hispanicum** frutex vulgare *Park.* **Spartum arborescens** seminibus *Lenti similibus C.B.* In Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi vulgarissima.

Genista argentea f.B. In planitie non longè ab oppido S. Lupiani quam transimus eundo à Monspelio ad montem Lupi.

Genistella aculeata *Ger. Park.* aculeata foliosa *f.B.* spinosa minor *Germanica C.B.* In Germania passim. Hæc omnino specie differt à **Genistella spinosa** nostrate vulgò dicta, ut in *Cat. Ang.* monuimus.

Genistella montana Germanica Park. lagopodoides major *Ger.* herbacea, sive **Chamaspartium f.B.** **Chamægenista sagittalis C.B.** In pascuis Germaniæ sterilioribus abundè provenit, itémq; circa Genevam.

Genistella tinctoria Hispanica f.B. insectoria *Ger.* **Genista tinctoria Hispanica Park.** **Genista tinctoria** frutescens foliis incanis *C.B.* In montibus sylvestribus supra Neapolin versus Camaldulensium cœnobium.

Gentiana major *Ger. major lutea C.B. Park.* vulgaris major **Hellebori albi folio f.B.** *Great Gentian or Fellwort.* In montibus circa Genevam copiosè.

N. 1. Alexipharma est [Radix] aperit, attenuat. Usus præcip. in peste aliisq; venenatis affectibus, in obstructione epatis & lienis, &c. & hinc in hydrope, tum in suffocatione uteri, in imbecillitate ventriculi, lumbricis, febribus intermittentibus, morfu canis rabidi, &c. Extrinsecus adhibetur creberrimè in vulneribus ac fonticulis mundificandis, in morfu canis rabidi arcendo (cum theriaca imposita) *Schrod.*

2. Succus inspissatus creberrimi est usus in febribus intermittentibus in quibus ante paroxysmum à 3ß. ad 3j. vel ʒiv. exhibetur felici cum successu. *Schrod. Maib.*
Aqua

Aqua destillata maculas cutis deterget. Est a. *Gentiana amara* admodum, indèq; putredinis hostis insensibilissimus & veneni mors (ut inquit Lobelius.)

3. *Hepaticis* & *stomachicis* qui cibum sumptum retinere non valent, *Gentianæ* radicis pulvis e vino exhiberi debet; quod qui fecerit auxilium præsens sentiet. *Trag. Gentiana Asclepiadis folio C.B. Park.* major & cæruleo flore *Clusii Ger.* folio *Asclepiadis* vulgò creditæ *J.B.* In montosis propè *Lindaviam* & alibi in *Germania*.

Gentiana cruciata C.B. Park. minor *cruciata Ger.* minor seu vulgi *cruciata J.B.* In *Germaniæ* pascuis montosis passim. Habetur etiam satis frequens in *Gallia* & *Italia*.

Gentianella verna major Ger. *Alpina verna major Park.* *Alp.* magno flore *J.B.* *Alp. angustifolia* magno flore *C.B.* In altissimis verticibus montis *Jurz.*

Gentianula quæ Hippion J.B. *Gentianella Alpina verna major C.B.* *Alpina verna Ger.* minor *verna Park.* In montibus *Genevæ* vicinis.

Gentianula lanugine ad singulorum foliorum floris lacinias donata, flore quadripartito *J.B.* *Gentiana angustifolia* *Autumnalis* major, itémq; minor floribus ad latera pilosis *C.B.* *Gentianella Autumnalis* *imbriata* flore *Park.* Itinere ab *Augusta* ad *Norimbergam*.

Gentianella Autumnalis minima calyce turgido pentagono, In planitie ad fluvium *Lycum* non procul *Augustâ* *Vindelicorum* copiosè, exeunte *Augusto* florens.

Gentianella omnium minima v. *Muscus Alpinus*.

Geranium Althææ folio C.B. *Althæodes majus Park.* *malacoides Ger.* *malvaceum J.B.* Circa *Genuam* in *Italia*, *Monspelim* & alibi in *Gallia Narbonensi*.

Geranium Creticum Ger. Park. folio *Cicutæ* vel *Myrrhidis VII*, sive latifolium longissimâ acu *C.B.* speciosum annuum longissimis rostris *Creticum J.B.* In *Sicilia* propè *Messanam*.

Geranium cicutæ folio, acu longissima *C.B.* *Monspeliacum* laciniatum *Park.* Ad agrorum margines & in aggeribus circa *Monspelim*.

Geranium nodosum Park. *Anemones* folio rotundo *XII*, sive nodosum *C.B.* nodosum *Plateau Clus. Ger.* magnum folio trifido *J.B.* Ad sepes, itinere à *Gratianopoli* à la fontaine que brusle.

Geranium phæo sive pullo flore *Clusii J.B.* pullo flore *Park.* *Ger.* *Anemones* folio rotundo *VIII*, sive montanum fuscum *C.B.* *batrachoides* pullo flore *Ger.* In monte *Jura* propè *Thuri*.

Geranium

Geranium Romanum versicolor sive striatum *Park.* In sylvis montosis Salernum inter & *Cavam* in Regno Neapolitano.

Gingidium v. *Visnaga*.

Gladiolus sive *Xiphion* *J.B.* *Gladiolus Narbonensis* *Lob.* *Ger.* *Glad.* floribus uno versu dispositis major *C.B.* Circa *Liburnum* inter segetes.

† *Glastrum* sylvestre *Ger. Park.* *Isatis* sylv. vel *angustifolia* *C.B.* In *Germania* secus *Rhenum*. Culturâ tantum â sativa differre videtur.

Glaux peregrina annua. *Vicia* *Sesamacea* *Apula* *Col.* *Fœnugræco* sylvestri *Tragi* in quibusdam accedens planta *J.B.* *Ornithopodio* affinis hirsuta semine stellato *C.B.* qui *Stellam* leguminosam huc refert, cum sint distinctæ plantæ. In *lingula* *Fretum Siculum* à *portu Messanenfi* dividente.

Globularia *Monspeliensis* v. *Bellis cærulea*.

Gnaphalium *Alpinum* pulchrum *J.B.* *montanum* *IV.* sive *Alpinum* magno flore, folio oblongo *C.B.* *Leontopodium* *Dod.* *Gnaph.* *Alpinum* *Ger.* In montis *Juræ* præalto vertice *La Dolaz* dicto.

Gnaphalium *roseum* *Park.* *roseum* sylv. *C.B.* *Umbellatum* minimum *J.B.* In insula ad *Prom.* *Siciliæ* *Pachynum* vulgò *Capo Passaro*, ubi arx ab *Hispanis* præsidio tenetur.

Gnaphalium ad *Stœchadem citrinam* accedens *J.B.* In pratis non longè à *Castro novo* vico *Monspelio* vicino.

Gossipium sive *Xylon* *Ger.* *Goss.* frutescens annuum *Park.* frutescens semine albo *C.B.* *Xylon* sive *Gossipium* herbaceum *J.B.* In insula *Melitenfi* quotannis magno proventu seritur.

N. *Seminis* medulla tussientibus & difficulter spirantibus mirificè auxiliatur, Venærem stimulat; oleum inde expressum lentigines, varos, alphos, cæterâsque cutis infectiones delet. *Lanugo* usta sistit sanguinis profluvia.

† *Gramen dactylon* latiore folio *C.B.* *Graminis* genus *Dens caninus* 3, sive *Gramen primum*, vel *Galli crus* *J.B.* Ab hoc sativum, quod *Gramen Mannæ* vocant, nonnisi culturâ differre videtur, inquit *J.B.* *Ischæmon* vulgare *Ger.* sylvestre latiore folio *Park.* In *Germania*, *Italia*, *Gallia*, in agris passim. Hanc speciem in *Angliâ* non ita pridem invenit *T. Willifellus*.

Gramen digitatum hirsutum *J.B.* *Gr. dactylon* sive *Ischæmum* *V.* i.e. *Dactylon angustifolium* spicis villosis *C.B.* *Ischamôn*

Ischæmon sylvestre spicis villosis Park. Ab hoc non diversum putamus Gramen scoparium *Ischæmi paniculis Gallicum*, ex cuius nimirum radiculis scopulæ sunt. Gramen illud è quò *Cremæ præsertim in Lombardia scopulæ huiusmodi sunt, Capriola* ibi appellant: unde *Matthiolum* falsum esse suspicamur, qui Gramen Mannæ pro *Capriola* habet, quod annua est planta, cuiusq; radices huic usui nec adhibentur, neq; idoneæ sunt. Fortè *Capriola* nomen commune est huic generi Graminis digitati; vulgus enim non distinguit.

Gramen repens cum panicula Graminis Mannæ *f.B. dactylodes radice repente Ger. canarium ischæmi paniculis Park. dactylon folio arundinaceo majus C.B.* quod nomen huic nostro, utpote minori & supino, minimè convenit. Circa Genevam & Monspelium in arenosis.

Gramen dactylon Messanense geminâ ab eodem exortu spicâ. An Gramen distachophoron *Col.?* Habet a. in eodem caule (ni malè memini) plura spicarum paria. In montibus Messanæ alteri Siciliæ metropoli adjacentibus.

Gramen tremulum maximum *C.B. f.B. trem. maximum Hispanicum Park. Phalaris pratensis altera Ger. emac.* Pluribus Italiæ & Siciliæ in locis, speciatim circa Baias copiosè.

Gramen pulchrum parvum paniculâ latâ compressâ *f.B. cyperoides paniculâ sparsâ sufflavescente Park. cyp. minus paniculâ sparsâ subflavescente C.B.* Cur a. paniculâ sparsâ denominat, cum è contra paniculâ sit conglomeratâ? In humidioribus & ubi per hyemem aquæ stagnârunt in Germania, Italia, & Narbonensi Gallia.

Gramen parvum pulchrum paniculâ compressâ nigricante *f.B. cyperoides paniculâ nigricante Park. cyp. minus paniculâ sparsâ nigricante C.B.* In palustribus non procul Monspelio. Quin & in Italiâ ad ipsos Florentiæ urbis muros in fossulis collegimus.

Gramen Alopecuros spicâ longâ tomentosâ candicante *f.B. Alopecuros major spicâ longiore C.B. Gr. alopecuroides alterum radice repente, five Pseudo-schœnanthum Monspeliensium Park. Schœnanthum adulterinum Ger.* In maritimis Monspelio vicinis.

Gramen paniculatum elegans *Ger. Gr. amoris dictum f.B. Gr. paniculis elegantissimis, five ~~legitimus~~ major C.B. Phalaris pratensis major, five Gramen tremulum maximum Park. ineptè.* Primò nobis occurrit Francofurti ad Mœnum; deinde passim per Germaniam, Italiam &

& Galliam Narbonensem. Hujus varietatem circa Monspelium & Florentiam observavimus, quæ dici poterit

Gramen amoris alterum paniculis strigosioribus magisq; sparsis.

Gramen minimum Dalechampii *f.B.* minimum paniculis elegantissimis *C.B.* In vineis circa Monspelium sub initium veris, imò ipsâ adhuc hyeme floret.

Gramen paniceum spicâ simplici *C.B.* Panicum sylvestre spicâ simplici *Park.* *sylv. Ger.* *sylv.* & Dens canis primus *f.B.* In Germania, Italia & Gallia passim.

Gramen paniceum spicâ divulsâ *C.B.* Graminis genus quibusdam, Gallis Dens canis 2, sive Panicum sylvestre spicâ divulsâ *f.B.* Panicum vulgare *Ger.* sylvestre herbariorum *Park.* Ad rivulos & in locis ubi per hyemem aquæ stagnârant in Germania, Italia, Gallia.

Gramen paniceum spicâ aristis longis armatâ *C.B.* paniceum *Ger.* paniceum aristis longis armatum *Park.* Est hoc (ut rectè monèt J. Bauhinus) naturæ duntaxat lusus: in eadem enim planta observavit spicarum utriculos alios desinentes in aristam, alios eadem destitutos. Advenire autem illud dicit ratione soli atq; ætatis, quod & mihi probatur. Unde meritò reprehendendus videtur C. Bauhinus qui sine necessitate entia multiplicat.

Gramen parvum echinatum *f.B.* caninum marinum asperum *Park.* caninum maritimum spicâ echinatâ *C.B.* In arenosis circa Monspelium copiosè; Vidimus etiam in Arni fluminis alveo Florentiæ.

Gramen nemorosum hirsutum minus paniculis albis *C.B.* nem. hirsutum minimum *Park.* præter rationem minimum appellat, cum satis altè assurgat. Gramini Luzulæ affine flore albo *f.B.* Ad latera montis Salevæ propè Genevam, & in colle *La Bastie*.

Gramen supinum aculeatum *f.B.* aculeatum Italicum *Park.* echinatum & aculeatum III, sive album capitulis aculeatis Italicum *C.B.* Inter Liburnum & Pisas, necnon circa Monspelium copiosè.

Gramen arvense paniculâ crispâ *C.B.* *Park.* minimum rubrum sive Xerampelinum *Ger.* Gramen cum paniculâ molli rubente *f.B.* Genevæ inter segetes copiosè, quin & in muris ipsius urbis. Simillimum est hoc gramen montano nostro spicâ gramineâ foliaceâ dicto.

Gramen alopecuroides spicâ asperâ *C.B.* alopecuroides spicâ asperâ brevi *Park.* Gr. cum cauda leporis aspera, sive spicâ murinâ *f.B.* Circa Monspelium collegimus.

Gramen

Gramen arundinaceum ramosum plumosum album C. Bauhini *J.B.* quod asserit circa *Perault* & Magallonam reperiri, ubi & nos illud invenimus, uti etiam propè litus Calabriae.

Gramen calamogrostis Lobelii *J.B.* arundinaceum I, five spicâ multiplici *C.B.* Calamogrostis five gramen tomentosum *Park.* at cur tomentolum denominat? Gr. harundinaceum paniculatum *Ger.* In arenosis maris litoribus circa Magallonam non longè à Monspelio. Figura *J.B.* optimè respondet nostræ plantæ: non autem Parkinsoni, uti nec titulus, nec descriptio Lobelii in *Adv.* Gramen marinum cyperoides *J.B.* cyperoides maritimum *C.B.* Juncus cyperoides maritimus *Lob.* marit. Narbonensis *Park.* In arenosis litoribus propè Neapolin copiosè. Habetur etiam ad mare Monspelii.

Gratiola *J.B. Lob. Ger.* vulgaris *Park.* centauroides *C.B.* In palustribus propè Constantiam Germaniæ urbem uberrimè. Provenit etiam in aquosis tum in Italia, tum in Gallia Narbonensi, ut v.g. propè lucum Gramontium non procul Monspelio.

N. 1. Efficax remedium est in humoribus aquosis, lentis biliosisq; specificè evacuandis, quos vel ex remotissimis partibus trahir, atq; tum per secessum, tum per vomitum expurgat. Hinc magnus ejus usus esse poterit in hydropè, ictero flavo, &c. Et quia amaritudine insuper dotata est insigni, fugat lumbricos, eorumq; saburram expurgat. Hactenus *Schroderus*.

2. Prodesse dicitur adversùs diutinos coxendicis dolores & inveteratas febres sive sicca sive recens decocta; verùm quoniam nimis violenter nec sine molestia purgat, corrigenda est.

Grossularia v. Uva crispa.

Guaiacum Patavinum *Park.* Patav. latifolium *Ger.* Guaiacana *J.B.* Lotus Africana latifolia *C.B.* In præruptis collibus non longè à Massa quâ indè Lucam iter est, hanc ipsam plantam vel ei simillimam collegimus, proinde fortasse deceptus non fuit Gesnerus, qui eam in montibus circa Veronam nasci scripsit, quod *J. Bauhini* pace dixerim.

Halimus

H

H Alimus *Lob.* Hal. Clusii *J.B.* latifolius sive frutescens *C.B.* latif. sive *Portulaca marina incana major Park.* In Sicilia propè Messanam hinc indè ad maris litus copiosè.

Hedypnois Monspesulana, sive *Dens leonis Monspesulanus J.B.* *Chondrilla lutea X.*, sive foliis *Cichorei tomentos C.B.* *Chondr. prior Dioscoridis*, legitima Clusii *Park.* *Chondrilla lutea Ger.* Circa Messanam & Monspelim copiosè. Ab hac planta omnino diversa est *Dens leonis Asphodeli bulbis dicta*, utcumq; *J.B.* eandem faciat.

Hedysarum clypeatum Ger. clypeatum vulgare *Park.* *Astragalus Romanus*, sive *Hedysarum clypeatum filiquâ alperâ J.B.* *Onobrychis semine clypeato aspero major C.B.* In montibus Messanæ imminentibus, ubi etiam flore albo observavimus.

Hedysarum clypeatum minus flore purpureo. An *Onobrychis semine clypeato aspero minor C.B.?* In insula Promontorio Siciliæ *Pachyno* proximâ.

Hedysarum minus Park. v. Securidaca minor.
majus *siliquis articulatis Ger. v. Securidaca.*

Helianthemum flore albo, folio angusto hirsuto *J.B.* *Chamæcistus foliis Thymi incanis C.B.* An *Helianthemum angustifolium Park. Ger.?* Propè Monspelim in collibus *Castro novo* adjacentibus, atq; etiam circa *Nemausum*. Folia hujus oblonga sunt, incana, & figurâ sua ad *Rorismarini* folia nonnihil accedunt, nisi quod breviora sint.

Helianthemum tenuifolium glabrum flore luteo J.B. *Chamæcistus Ericæ folio luteus C.B.* *Chamæc. Ericæ foliis Park.* Ad radices montis *Juræ*, inq; collibus saxosis circa *Genevam*. Ab hoc diversum facit *J. Bauhinus*

Helianthemum folio Thymi incano, quod putat *Lobelum* miscere cum *Helianthemo tenuifolio glabro*. Has similes esse plantas, differentes tamen diligentius consideranti asserit. Et nos idem cum *Bauhino* aliquando sensimus, postea tamen in eadem planta vidimus inferiora folia tenuissima, qualia ferè *Camphoratæ Monspeliensis*: superiora autem longè diversa, viridia & *Helianthemi* proximè scripti foliis omnino eadem. Invenimus

nimus tamen circa Massiliam cujus omnia folia tenuissima
camphorata similia & glabra. q. ult.

Helianthemum Alpinum folio *Pilosellæ* minoris *Fuchsi*
f. B. Ad latera & radices montis Salevæ propè Gene-
vam copiosè. Hoc an ab aliis descriptum sit necne
mihi nondum constat. Consule f. B.

Heliochrysum v. *Stoechas* citrina.

Heliotropium majus *Lob. Ger. Park.* majus flore albo f. B.
majus *Dioscoridis* C. B. In Italia & Gallia Narbonensi
in agris ubique ferè: Vidimus & circa Moguntiam
Germaniæ.

Heliotropium tricocon C. B. f. B. *Ger. Park.* Circa Mon-
spelium cum priore sed rariùs.

N. 1. Hujus capita sive siliquæ pannis affrictæ, florido
viridi colore eos inficiunt, qui temporis momento in cæ-
ruleum eumq; elegantem mutatur. Hujusmodi panni
aquam cui immerguntur vini rubri colore imbuunt;
eorumq; usus est ad gelatinas aliàsq; confectiones pur-
pureo colore tingendas.

2. *Heliotropium* dicitur non quòd ad Solis diurnum
motum convertatur, sed quòd æstivo solstitio floreat,
cùm Sol longissimè ab Æquinoctiali circulo digressus
ad ipsum rursus *Æquinoctium* sive conversionem faciat. *Dod.*

Helleborine ex albo sublutea f. B. In sylvula monti Sale-
væ vicina. Floret omnium hujus generis prima.

Helleborine flore albo C. B. *Damafonium* Alpinum, sive
Helleborine floribus albis f. B. In sylvosis propè sum-
mitatem montis Salevæ. Floret vere simul cum pri-
ore, aut aliquanto seriùs. *Elleborine* minor flore albo
Park.

Helleborine montana angustifolia purpurascens C. B. *Da-*
masonium purpureum dilutum, sive *Helleborine* 6 *Clusii*
f. B. *Hel. angustifolia* 6 *Clusii* *Ger.* *Elleborine* flore
purpurante *Park.* Ad radices montis Salevæ, versùs
Genevam sci. copiosè.

Inveni insuper *Helleborinem* flore atro-rubente in
ascensu montis Juræ propè oppidum *Fay* copiosè. *Cal-*
ceolum Mariæ dictum in sylvis ad latera montis Salevæ.
Verùm hæc duæ species in Anglia habentur.

Helleborus albus *Ger. f. B.* albus vulgaris *Park.* albus flo-
re subviridi C. B. In montosis pascuis in summitate mon-
tis Juræ copiosissimè.

N. 1. *Hellebori* albi radix ob violentiam purgationis
quam per superiora & inferiora movet, usum purgandi
internum soli ferè *Helleboro* nigro reliquit. *Schrod.*
Potest tamen (inquit *Tragus*) per 24 horas vino aut oxy-
melite

melite macerata posteaq; resiccata 3ß. pondere cum vino exhiberi furiosis & melancholicis. Helleborum utrumq; dicit Gesnerus [si cum aceto & melle temperetur & decoquatur ut syrupus fiat] medicamentum innoxium & ad plerosq; phlegmaticos morbos [thoracis & capitis inprimis, ut asthma, dyspnœam, epilepsiam] *πλύχρον* sæpe utilissimè se expertum esse, &c. vide apud *F.B.* Optima ejus præparatio, (inquit Parkinsonus) est ut succo mali Cydonii infundatur, aut Cydonio indita in furno aut sub cineribus coquatur. Quin si ab Elleboro sumpto strangulationis periculum sit, Cydonia comesta eorūve succus aut syrupus remedia sunt.

2. Rad. in aceto decocta, ac in ore aliquandiu retenta dolorem dentium tollit. *F.B.* è Trago.

3. In lixivio decocta, si illo postea caput abluas, pediculos & furfures enecat & abstergit: idem unguento aliquo permista efficit. *Idem.* scabies, impetigines, serpignes sanat: animalia pleraq; interimit, mures, lacertas, aves, &c.

4. Pulvis naribus inditus sternutamenta movet, unde & Anglicè *Neeze-wort* dicitur.

5. De Hispanorum toxico ex ea facto consule Parkinsonum & Jo. Langium *Epist. med. lib. 1. Epist. 68.* Helleborus autem uterq; in furiosis & insanis sanandis olim celeberrimus.

Helleborus niger *Lob.* niger verus *Ger. Park.* niger flore roseo *C.B.* niger flore albo, interdum etiam valde rubente *F.B.* In Alpibus non longè à Pontieba abundè.

N. Purgat potenter humores melancholicos, utile per consequens medicamentum est omnibus affectibus inde originem trahentibus, quales mania, insania, hypochondriaca passio, elephantiasis, herpes, cancer, quartana, vertigo, epilepsia, apoplexia, scabies, &c. *v. Schrod.* qui eam [radicem] violenter purgare ait; alii, si rectè usurpetur innoxium esse medicamentum scribunt, ut tutò pueris, gravidis & debilibus corporibus dari possit. Corrigitur cardiacis ac stomachicis ut Cinnamonomo, Aniso, Fœniculo, &c. Dosis à ℥j. ad ℥ij. Variis modis ad usum præparatur.

Helleborus niger Saniculæ folio major *v. Astrantia nigra.*

Helleborus niger Saniculæ folio minor *Park. C.B.* In summis montium jugis max. Carthusianorum cœnobio vicinis.

Helle-

Helleborum nigrum foetidum sive Enneaphyllon in Germania, lateribus montium quos eluctatur Rhenus inter Coloniam & Moguntiam, &c. copiosissimum observavimus. Helleborum nigrum hortensem flore viridi *C.B.* in monte illo præcelso cui inrdificatur *S. Marini urbs*, 10 circiter milliaribus Arimino distans. Hæ species in usum medicum rarissimè veniunt, iisdem tamen cum Helleboro nigro vero facultatibus dotata videntur.

Hemionitis multifida *C.B.* altera Dalechampii filici floridæ similis *J.B.* Ilvensis Dalechampii, multifido folio *Park.* Propè *Salernum* primò, deinde in viis umbrosis circa Neapolin, quà ascenditur ad Gamaldulensium cœnobium copiosè.

Hepaticum trifolium *Lob. Ger.* Trif. hepaticum flore simplici *C.B.* hepaticum sive Trinitatis herba flore cæruleo *J.B.* In montibus circa Taurinum, Scaphusiam, Genavam copiosè.

Herba Doria Lobelii *Ger.* H. D. vulgaris *Park.* Alisma Matthioli, sive Doria *J.B.* Doria Narbonensium quasi Aurea, quam perperam Doriā vocant, foliis Limonii aut Rumicis *Adv.* Virga aurea major vel Doria *C.B.* Ad Ladum amnem Monspeliacum copiosè.

Herba venti Monspelienfibus *J.B.* Marrubium nigrum longifolium *C.B. Ger. Park.* In aggeribus & ad vias circa Monspelium copiosè.

Herniaria hirsuta *J.B. C.B.* In arenosis primò circa Sylvam Ducis in Brabantia, deinde per Germaniam, Italiam & Galliam Narbonensem copiosè.

Hesperis sylvestris latifolia flore albo parvo *Park.* Hesperidi Alpina murariæve similis surrecta & magna *J.B.* In monte Salevâ copiosè, collegimus etiam in montibus non longè à Luca versùs Massiam.

Hesperis *v.* Viola matronalis.

Hesperis Alpina *v.* Draba.

Hieracium Alpinum glabrum, flore singulari magno, cauli cubitali insidente. In summo montis Juræ dorso *La Dole* dicto. Hoc an à quoquam descriptum sit inquirendum.

Hieracium asperum *v.* Hypochæris.

Hieracium montanum latifolium Genevense, folio Conyzzæ majoris Monspellulanæ *J.B.* In ascensu montis Juræ propè *Thuri*.

Hieracium falcata siliquâ *Lob. C.B.* falcatum Lobelii *Ger.* falcatum sive stellatum *Park.* stellatum *J.B.* An forte

Hieracium stellatum Boelii *Ger. emac.* in *App.* ? Circa Monspelium non longè à *Castro novo*.

Ecc -

Hierac

Hieracium capitulum inclinans semine adunco C.B. flo-
rem inclinans F.B. Hieracium folio Hedypnoidis Park.
 Circa Monspelium & Messanam.

Hieracium calyce barbato Col. falcatum barbato Park.
proliferum falcatum C.B. Messanæ & Monspelii pal-
sim.

Hieracium parvum hirtum caule aphylo, crispum ubi sic-
catum F.B. In agro Monspeffulano non longè à Sella
nova in arvis.

Holosteum Massiliense C.B. v. Coronopus.

Holosteum Plantagini simile F.B. Salmanticense primum
Clus. hirsutum albicans majus C.B. Salamanticum Ger.
Park. Propè Monspelium.

Horminum sylvestre latifolium Ger. sylv. latifolium verti-
cillatum C.B. Germanicum humile Park. Gallitricho
affinis planta, Horminum sylvestre latifolium Clusio F.B.
In agris & vervactis non longè ab Auguttâ Vindelicorum,
eundo inde ad Monachium Baviaræ metropolin.

Horminum luteum glutinosum C.B. Colus Jovis Ger.Lob.
Horminum luteum sive Colus Jovis Park. Galeopsis
species lutea, viscida, odorata, nemorensis F.B. In
colle La Bastie, & in montibus circa Genevam. Vidi-
mus etiam sæpius in Italia & Germania, locis lutosi ubi
fontes scaturiunt ad latera montium.

Horminum pratense foliis ferratis C.B. Gallitrichum syl-
vestre vulgò, sive sylv. Sclaræa flore cæruleo purpureove
magno F.B. Hæc plantâ à vulgari nostrate Oculo Christi
floris magnitudine potissimum differt: unde & nostrum
vulgare Horminum, sylvestre Lavendulæ flore Clusio
dictum est. Ait enim se observâsse Greenvici ad arcis
regiæ Hippodromum hanc speciem. Nos autem penè
certi sumus non aliam ibi unquam enatam hujus generis
plantam.

Hyacinthus cæruleus Ger. racemosus cæruleus minor junci-
folius C.B. vernus botryoides minor cæruleus, angustio-
ribus foliis, odoratus F.B. In agro Pedemontano ad vias.

Hyacinthus comosus Ger. comosus major purpureus C.B.
maximus botryoides comâ cæruleâ F.B. Inter segetes
circa Liburnum & Genevam copiosè.

Hyacinthus palustris vernus flosculis fimbriatis albidis. Ad
fossarum margines & in humidioribus inter Liburnum &
Pisas. Hanc speciem nondum descriptam puto.

Hypecoum v. Cuminum sylvestre alterum.

Hypericum foliis parvis crispis seu sinuatis. In Sicilia pro-
pè Punto Cerciolo non longè à Castello Puzallu. Nondum,
quod sciam, descripta est hæc species.

Hype-

Hypericum Nummulariæ folio Park. C.B. Ex ipsis rupium max. Carthusianorum cœnobio imminentium fissuris emergit. Flos ei odoratissimus.

Hypericum tomentosum Lob. f. B. tomentosum *Lobelii Ger.* lupinum tomentosum minus *Park.* sup. tom. minus, vel *Monspeliacum C.B.* In insula Melitenſi primum, deinde circa *Monspeliū* in fossis & humidioribus.

Hyoscyamus albus major & minor C.B. albus *Park.* albus, & albus minor *f. B. Ger.* Ego enim cum *Parkinsono* unam duntaxat speciem agnosco. In Italia ad mare inferum, inq; Sicilia, & circa *Monspeliū* copiosè. Floris color in hoc nostro pallidè luteus est, & fundum habet purpureum, in quibus cum *Cretico dicto* convenit.

Hypochaeris porcellia Ger. *Hieracium asperum*, *Hypochaeris* sive *Porcellia dictum Park.* *Hieracium dentis leonis folio obtuso V.* sive minus *Dentis leonis folio subaspero C.B.* *Hieracii parva species*, *Hyoseris angustifolia aspera f. B.* In quibusdam *Bavariz sylvis*.

Hyssopoides major flore grandiore. In palustri planitie propè *Syracusas*, itémq; non longè à *Messana Sicilia.* Hujus flos quadruplo major est vulgaris flore. Quin & utramq; speciem unà crescentem observavimus propè *Messanam*, uti eas specie differre ampliùs non dubitemus. *J. Bauhinus* duas habet *Hyssopifoliz species*: verùm quam ille minorem inscribit est vulgaris nostras: quam *Hyssopifoliam aquaticam simpliciter* vocat planta est de qua agimus.

I

J *Acea non spinosa laciniata lutea*, An *Jacea laciniata lutea C.B.*? *Jacea montana minima lutea Park.*? In alveis torrentum & fluviorum quorundam, qui brumali tempore planities latè inundant in Foro Julii. Mihi nondum planè constat plantam hanc descriptam esse, nam diversa videtur à *Jacea lutea montana minima tenuifolia Col.*

Jacea Olex folio v. Xeranthemum.

Jacea purpurea maritima capitulo spinoso Neapolitana.

An *Jacea cyanoides echinato capite C.B.*? i.e. *Jacea montana purpurea echinato capite Park.*? an *Jacea laciniata Sonchi folio Park.*? In maris litore arenosè propè *Neapolin Italiz copiosissimè.*

E c c z

Jacea

- Jacea lutea* capite spinoso *C.B.* lut. cap. spinosis *Park.* major lutea *Ger.* Centaurium collinum, sive *Jacea spinosa* flore luteo *J.B.* Circa Monspelium & Messanam.
- Jacea* cum spinosis capitulis purpurea tenuifolia *J.B.* Stœbe IX, sive squamis asperis *C.B.* Circa Monspelium & alibi in Gallia Narbonensi. Habetur & in Etruria.
- Jacea incana* tenuiter laciniata, capitulis *Jaceæ* nigræ vulgaris. An *Jacea incana* laciniata, capitulis *Cirsii* flore uno aut altero *J.B.*? *Jacea montana* candidissima Stœbes foliis *Park.* *C.B.* qui titulus huic nostræ optimè convenit. In rupibus seu clivis maritimis Calabriae.
- Jacea montana* capite magno Strobili *J.B.* incana Pini capite *C.B.* pumila Narbonensis *Park.* In collibus saxosis circa Monspelium.
- Jacobæa marina* *Ger.* marina, sive *Cineraria vulgaris* *Park.* marina, sive *Cineraria* *J.B.* maritima *C.B.* Ad litora maris inferi ubiq;.
- Jacobæa Senecionis* facie. Calix floris Senecionis calicem exactè refert, verum circulum seu coronam aut limbum foliolorum in margine ad modum chrysanthemi obtinet. Plantula tenera est, radice fibrosa, foliis Bellidis maj. Prope Messanam.
- Jasminum luteum* v. *Polemonium*.
- Iberis* *J.B.* *Cardamantica* *Lob.* *Ger.* *Nasturtii* folio *C.B.* *Park.* *Sciatica* *Cresses.* In incultis, ruderatis & secus vias ubiq; ferè tum in Germania, tum etiam in Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi.
- N. Tusa cum modica axungia & coxendici imposita 4 horarum spatio, & deinde ablata dolores ischiadicos & podagricos lenit, &c. vide Plinium aliòsq; Veteres.
- Ilex arborea* *J.B.* major aculeata & non aculeata *Park.* IV, sive folio rotundiore molli modicèq; sinuato *C.B.* ejusdem. I, seu folio oblongo ferrato; Ego enim has non distinguo. In arbusculis junioribus folia sinuata sunt, aculeata & Aquifolii æmula: in vetustioribus oblonga, neq; aculeata, neq; sinuata, & Oleaginis similia. *Ilex* major glandifera *Ger.* In Italia & Gallia Narbonensi in sylvis & sepibus passim.
- Ilex coccigera* *J.B.* *Ger.* aquifolia, sive coccigera *Park.* aculeata cocciglandifera *C.B.* In collibus saxosis circa Monspelium, Nemausum, Avenionem & alibi in Gallia Narbonensi.
- N. Huic arbusculæ seu frutici innascitur granum illud tinctorium seu coccus baphica tantopere celebrata, & tinctoribus expetita, ex quo paratur confectio illa cardiaca *Alkermes* Officinis dicta.

2. Arbuscula hæc non ubiq; coccum gerit. Nam iis solùm regionibus quæ Mediterraneo mari vicinæ sunt, & magno Solis ardore torrentur, nasci animadvertēbam. Sed neq; isthic perpetuò fert; cū enim frutex adeò adolevit ut glandem alere incipiat, coccum non gignit: ideòq; solent incolæ quadriennes aut adultiores frutices urere, ut proximo anno novelli resurgant, qui deinde singulis annis aliquot subsequētib; coccum ramulis in-hærentem instar exiguorum pisorum coloris cinerei gignunt. *Clus.*

Imperatoria *J.B. Ger. major C.B. Imper. five Astrantia vulgaris Park.* In montibus max. Carthusianorum cœnobio imminētib;.

N. Saporis est acerrimi, Alexipharmaca ac sudorifera: discutit mirificè ventriculi, intestinorum, & uteri flatus, unde in colico cruciatu utilis. Usus præcip. in venenatis morbis ac iſtibus; in pulmonum tartaro resolvendo & expectorando, in fœtore anhelitûs corrigendo, in capitis affectibus phlegmaticis, Paralyſi, Apoplexiâ, &c. Aiunt nonnulli quartanâ eos sanari qui pulveris cochlearis dimidium horâ unâ ante accessionem ex mero biberint. Commendatur & ad hydropem. Extrinsecus in Odontalgia (gargaris.) in catarrhis exiccandis (suffitu) in tumoribus ac Arthritide frigida. In scabie capitis exiccanda (lotione) in serpigine inveterata sananda (cum adipe suillo illita) in globulis sagittisve corpori extrahendis (imposita) *Schrod. & Matb.* Unde non immeritò inquit J.B. Imperatoris nomen sibi as-civit, cū tot tantisq; viribus præstet. Cæterum ut facie externa & odore Angelicam refert, ita iisdem cū illa facultatibus dotata est.

Iris humilis latifolia flore violaceo *J.B. Chamviris II.* five variegata *C.B.* Primò in rupibus quibusdam maritimis non longè à Liburno portu eam observavimus, flore purpureo atq; etiam albo: deinde circa Monspeli-um aux *Garigues*, ubi & *Lobelius*.

Iris Germanica *Fuch.* vulgaris Germanica five sylvestris *C.B.* vulgaris violacea five purpurea hortensis & sylvestris *J.B.* vulgaris *Ger.* In muris, tectis, locis rudera-tis, &c. in Germania.

Iris Florentina *Ger.* latifolia V, five Florentina alba *C.B.* flore albo *J.B.* In muris urbis Florentiæ magna ejus habetur copia.

N. 1. Plurimæ hujus plantæ radici virtutes à Veteri-bus & Neotericis assignantur. Sic. breviter *Schrod.* Usus præcip. in mucilagine seu tartaro pulmonum, tussi, asth-

mate, obstructione mensium, torminaibus ventris infantum. Extrinsicus abstergit cutis maculas & lentigines (cum Elleboro & melle mixta.) Creberrimus usus modernis est in pulveribus qui capillis insperguntur: vulgus vocat pulveres de Cypro. Aiunt & hydropi eam conferre & ictero.

2. Iridis radix in vino aut cerevisia suspensa, hanc dulcem conservat, illud jucundo tum odore tum sapore commendat, illius plane æmulo quem mora Rubi Idæi communicant, ut nos in vino rubro sæpius experti sumus. Sed & pistoribus ad parandum fermentum triticei panis magnopere usitata est. Hæc partim è Tiago, partim nostræ sunt observationis.

Ischæmon v. Gramen dactylon.

Iva moschata Monspeliensium v. Chamæpitys moschata.

Jujube Arabum v. Zizyphus.

Juncus acutus maritimus capitulis rotundis C.B. acutus maritimus alter Lob. Park. In Sicilia, Italia & Gallia Narbonensi ad maris litus valde frequens.

Juncus cyperoides maritimus Lobelii v. Gramen cyperoides.

Juncaria f.B. Junc. Salmanticensis Ger. Park. Rubia VIII, sive linifolia aspera C.B. In Germania non longè à Ratispona.

Juniperus major bacca rufescente C.B. Oxycedrus Park. Oxycedrus Phœnicea Ger. Cedrus Phœnicea Bellonio, sive Oxycedrus, quibusdam Juniperus major bacca rubra f.B. In collibus circa Monspelim.

K

K Ali semper virens grandius perpetuum C.B. Prod. geniculatum majus f.B C.B. Salicornia sive Kali geniculatum Ger. In palustribus ad Mare Mediterraneum valde frequens. Multò lignosius est nostrate h.e. minore; per multos annos durat & in satis magnum fruticem adolescit, inq; hortis culturam patitur, experimento J. Bauhini.

Kali majus semine cochleato C.B. Ger. majus cochleatum Park. vulgare f.B. Ad mare Mediterraneum sponte provenit plurimis in locis. Seritur Monspeli in lacubus salis ad Sal Alkali conficiendum, cujus modum v. apud J. Bauhinum.

L

L Aburnum v. Anagyris.

Lactuca sylvatica purpurea *f.B.* montana purpureo-cærulea major *C.B.* sylvestris purpureo flore *Park.*
Sonchus sylvaticus *Ger. emac.* In sylvis montosis Juræ,
 Salevæ &c. frequens

Lagopus altera angustifolia *Lob.* major angustifolius *Park.*

Trifolium angustifolium spicatum *f.B.* *Trifolium montanum angustissimum spicatum* *C.B.* In montibus supra Messanam; atq; etiam circa Monspelium, utrobiq; copiosè. Flores dilutè rubent. Ab hac non diversam speciem puto *Lagopus angustifolium* Hispanicam *Clus.*

Lagopus maximus *Ger. max.* flore rubro *Park.* *Trifolium spicatum subrotundum rubrum* *C.B.* *Trif. albo-incarnatum, spicatum, sive Lagopus* *f.B.* Quod circa Neapolim provenit flores habet pulchrè rubentes aut coccineos; quod prope Genevam albo-incarnatos aut pallidos.

Lagopus major folio pinnato *Park.* major spicâ longiore *Ger.* *Trifolium purpureum majus, folio & spicâ longiore* *f.B.* montanum spicâ longissimâ rubente *C.B.* In collibus circa Genevam.

Lamium peregrinum sive Scutellaria *C.B.* peregrinum, *Scutellaria dictum* *Park.* *Cassida* *Col.* In Italia circa Florentiam, Liburnum & alibi. Magnam habet similitudinem seu convenientiam florum respectu cum *Lyfimachia galericulata*; unde eam primo aspectu *Lyfimachiam galericulatam* *Urticæ* folio denominavimus.

Lamium v. *Galeopsis.*

Lanaria sive Struthium *Dioscoridis* Imperato *f.B.* *Saponaria Lychnidis folio, flosculis albis* *C.B.* In prærupis montium Messanæ proximorum aut ipsum Imperati *Struthium*, aut plantam ei simillimam collegimus, necdum ineunte Junio floruerat.

Larix *C.B.* *Ger. Park.* folio deciduo conifera *f.B.* *The Larch-tree.* In Alpibus Stiriacis & Carinthiacis eundo à Vienna ad Venetias copiosè.

N.1. Hujus Resina est quam Torebinthinam Venetam Officinæ vocant. *Matth. Park. f.B.* Quæ de Resinæ viribus traduntur, vide sub Pinu. Laricis materies firmissima est atq; solidissima, adeòq; Solis ardoribus aerisq; injuriis resistit nec rimas facit.

2. Hæc sola arbor ex Resiniferis folio est deciduo. Folia a. monente J. Bauhino, non decidunt Autumno, nec antequam alia initio Veris succedunt.

3. Hujus trunco seu caudici innascitur Fungus ille pituitæ purgatrix *Agaricum* dictus.

4. Quæ Plinius aliq; Veterum tradunt, non ardere eam, nec carbonem facere, nec alio modo vi ignis consumi quàm lapides; omnino falsa esse vel inde constat, quòd apud Vallesianos quibusdam in locis non alia ligna in usum foci adhibeantur, ac alicubi etiam in Alpibus ad ferrarias fodinas carbonem ex eâ fiant. *J.B. Matth.*

Lathyrus major Narbonensis angustifolius J.B. angustifolius Park. Circa Monspelium non longè à *Sella nova*, & alibi.

Lathyrus sativus flore purpureo C.B. angustifolius flore purpureo Ger. anguloso semine J.B. Circa Genevam copiosè: feritur & in Germania.

Lathyrus sativus flore fructuq; albo C.B. Cicercula sive Lathyrus sativus flore albo Park. Et hic circa Genevam & in Germania feritur.

† *Lathyrus filiquâ hirsutâ J.B. angustifolius filiquâ hirsutâ C.B.* Inter segetes circa Genevam. Hic etiam in Anglia sponte oritur.

Lathyrus sylvestris flore vario ex albo & coccineo. Et hunc etiam circa Genevam inter segetes copiosè enatum vidimus, necnon circa Liburnum.

Lavendula major, sive vulgaris Park. Lav. flore cæruleo Ger. Lavandula latifolia C.B. Pseudonardus, quæ vulgò spica J.B. In Gallia Narbonensi passim & copiosissimè. Provenit ibidem & *Pseudonardus* quæ *Lavendula vulgò J.B.*

N. Saporis est subacris & subamari, partium tenuium; cephalica ac nervina. Usus præcip. in catarrhis, paralyti, spasmo, vertigine, lethargo, & tremore artuum. In urina, mensibus ac foetu pellendo (unde & parturientibus exhiberi solet) in torminibus ventris flatulentis. Extrinsecus in lixiviiis capitis ac artuum, in masticatoriis pro catarrho exiccando ac revellendo ad palatum, ne in pulmones defluat. Odore suo fugat pediculos. *Schrod.* In usu sunt præcipuè flores. Hi quoq; cum linteaminibus & vestimentis in arculas recondi solent ad odoris suavitatem communicandam.

Laureola folio deciduo v. Mezereon.

Laurus Ger. J.B. vulgaris C.B. major sive latifolia Park. In sylvis & sepibus Italiæ satis familiaris.

N. Baccæ paulò calidiores sunt, emolliunt, resolvunt.

Ufus

Ulus præcip. in mensibus & urinis ciendis ; in affectibus nervorum, paralyfi ; in colica, in dolore post partum, in cruditatibus ventriculi. Extrinsecus conferunt folia ad ictus vesparum, molliunt tumores, promovent menses (in suffitu & balneo) leniunt dolores, odontalgiamq; mitigant (in gargarism.) *Schrod.*

Laurus *Tinus* cæruleâ baccâ *Lob. sylv.* Corni fœminæ foliis, subhirsutus *C.B.* *Laurus* *Tinus* *Ger.* *Tinus* altera *Æ.B.* An *Laurus* *sylv.* folio minore *C.B.* ? In Italia circa Romam, Tybur & alibi frequens. Invenimus quoq; in sylvâ *Valenâ* prope montem *Lupi* non longè à *Montepeliô*.

Ledum *Alpinum* hirsutum *C.B.* *Ledum* *Alpinum*, sive *Rosa Alpina* *Park.* *Nerium* *Alpinum* quibusdam, aliis *Ledum* hirsutum *Æ.B.* In Alpibus prope *Pontiebam*.

Ledum *Alpinum* foliis ferrea rubigine nigricantibus *C.B.* *Nerium* *Alpinum* quibusdam, aliis *Ledum* glabrum *Æ.B.* *Chamærhododendros* *Alpigena* *Ger.* *Ledum* *Alpinum* sive *Rosa Alpina* *Park.* In summis jugis montis *Juræ* prope *Genevam*.

Ledum *Alpinum* hirsutum minus, An *Cistus* *pumilus* montis *Baldi* fortè *Austriacus* *myrtifolius* *Æ.B.* ? Unâ cum *Ledo* *Alpino* hirsuto ; cui quoad folia satis similis est, multis tamen numeris minor, & flore (quantum memini) luteo.

Lentiscus *Lob. Ger. Park. Æ.B.* vulgaris *C.B.* In saxosis collibus *Italix*, *Siciliæ* & *Narbonensis* *Galliæ* ; ubi nunquam (quod equidem viderim aut audiverim) justam arboris staturam & magnitudinem assequitur, sed frutex perdurat ; quamvis alibi, teste *Bellonio* & aliis, in arborem satis proceram adolescat.

N. r. Partibus suis omnibus (fructu, foliis, cortice) adstrictoria est, unde utilis est ad fluxiones cujuscunq; generis, hæmorrhagiam, sanguinis exuptionem, alvi profluvium & dysenteriam, menses immodicos, procidentiam uteri & sedis. In summa *Acaciæ* & *hypocistidis* vices supplet ; urinam ciet.

2. *Dentiscalpia* ex *Lentisco* parata tum priscis, tum hoc seculo magnatibus ac delicatioribus in usu quotidiano pro optimis & præstantissimis habentur.

3. *Lentiscum* in sola insula *Chio* *Mastichen* præbere tum *Bellonius*, tum *Hermolaus Barbarus* affirmant. Alii in Italia quoq; *Mastichen* ferre sed non copiosam tradunt, ut v.g. *Matthiolus*, *Cæsalpinus*, *Lacuna*. *Schroderus* refert se habere ex donatione *Glaferi* frustulum *Mastiche* ditissimum ex *Helveticis* Alpibus transmissum.

Nos

Nos cùm in Italia & Gallia Narbonensi peregrinaremur nunquam Mastichen fundentem vidimus hanc arborem ; nec quis fide dignus nobis unquam retulit se vidisse.

4. Huic arbori vel sponte vel vulneratæ exudat Mastiche dicta, quæ (referente Schrodero) subastringit, emollit, ventriculum roborat. Usus præcip. in vomitu, nausæa ac fluxu alvi compescendo. Obtundit ac corrigit purgantium acrimoniam, reprimit exhalationes ventriculi quæ caput aliàs ferire solent (grana aliquot post pastum deglutita) roborat caput, nervosumq; genus, expuitioni sanguinis ac tussi medetur : emendat oris halitum, pituitam è cerebro elicit (masticando.) Extrinsecus ejus usus creberrimus est in dentifriciis, emplastris ac cataplasmatibus stomachicis.

Leontopodium *Dod. v. Gnaphalium* *Alpinum* pulchrum.

Lepidium *annuum* *Ger. Park. II, sive glastifolium C. B.* non repens *J. B.* In agris prope Ratisponam ; ibidem *Fœnugræcum* aut satum aut sponte provenit.

Lepidium *Dentellaria* dictum *v. Plumbago.*

Leucoium *bulbosum* præcox minus *Ger. bulbosum* minus *triphylon J. B.* In convallibus *Alpium*, viâ quâ *Bassano Tridentum* itur.

Leucoium *bulbosum* vulgare *C. B. bulbosum* *hexaphyllum* cum unico flore, rarius bino *J. B. bulb. serotinum Ger.* In umbrosis *Helvetiæ* pascuis pluribus in locis ; quin & in Italia prope *Taurinum*, sylvis montosis, itémq; inter *Bassanum* & *Tridentum*.

Leucoium *bulbosum* majus *polyanthemum Ger. Leuc. narcisso-lirion pratense Lob. Leuc. bulb. polyanthemum* tardius florens, floribus minoribus *J. B. L. b. majus sive multiflorum*, quod aliqui *Acrocorion* *Plinii* statuunt *C. B. In palustribus prope Pisas.*

Leucoium *maritimum* *angustifolium C. B. J. B. marinum* minus *Park. marinum* minus *Lobellii & Clusii Ger.* In arenosis maris *Mediterranei* litoribus prope *Frontignan*.

Leucoium *spinosum v. Thlaspi spinosum.*

Libanotis altera *Theophrasti nigra v. Saxifragia Venerorum.*

Libanotis *Theophrasti minor Park. latifolia* altera sive vulgarior *C. B. Lib. Theoph. quorundam, sive Sefeli Æthiopicum Matthiolo, Cervaria alba J. B.* In montibus circa *Genevâ* copiosè.

Lichen *marinus rotundifolius Ger. v. Opuntia marina.*

Ligusticum v. Siler montanum.

Lilium aureum v. Martagon Chymistarum.

Lilium

Lilium floribus reflexis montanum *C.B.* montanum minus *Ger.* flore nutante ferrugineo majus *J.B.* In colle *La Bastie* & in monte Saleva prope Genevam copiosè.

Limonium folio sinuato *Ger.* peregrinum *Rauwolfii Park.* peregrinum foliis *Asplenii C.B.* Lim. quibusdam rarum *J.B.* In insula ad Promontorium Pachynum, & ad *Punto Cerciolo* in Sicilia, utroque, copiosè.

Limonium parvum Narbonense oleæ-folium *Lob.* minus *J.B.* minus maritimum oleæ folio *C.B.* parvum *Ger.* Narbonense parvum *Park.* Ad mare prope Monspelium copiosè. Invenimus quoque in Etruria circa Liburnum.

Limonium aliud parvum Narbonense floribus majoribus. An *Limonium* minimum *C.B. Park.*? In iisdem cum priore locis.

Linariæ aliquatenus similis folio *Bellidis J.B.* Lin. erecta latifolia VII, seu *Bellidis* folio *C.B.* *Linaria* odorata *Park.* purpurea odorata *Ger.* In agris quibusdam Lugdunum inter & *Gratianopolin* & aut 6 leucis Lugduno remotis.

Linaria aurea Tragi *Ger.* L. folioso capitulo luteo major *C.B.* *Heliochrylos* Tragi, sive *Linaria* 3 *J.B.* In montibus prope *Ratisponam* & alibi in Germania. Hanc plantam ad *Virgam auream* rectius retuleris quam ad *Linariam*.

Linaria purpurea magna *J.B.* L. erecta angustifolia X, sive purpurea major odorata *C.B.* Circa Neapolin & ad radices montis *Vesuvii*. Maxima est omnium quas hactenus vidimus: flore parvo, intense purpureo.

Linaria graminea floribus congestis purpureis. *Linaria* cærulea calcaribus longis *J.B.* Ad radices montis *Vesavii* copiosè. Altitudo ei dodrantalis, folia graminea; flores in summo caule dense stipati velut in brevi spica.

+ *Linaria* odorata *Monspeffulana J.B.* erecta angustifolia XI, sive capillaceo folio odora *C.B.* Circa Monspelium ubique. Hanc speciem in Cornubia invenimus. Consule *Cat. Ang.* Folia capillacea huic plantæ perperam attribuit *C. Bauhinus*.

Linaria purpurea parva *J.B.* pumila seu repens IV, sive cærulea repens *C.B.* purpureo-cærulea repens *Ger.* cærulea repens *Park.* In Alpium jugis & monte Jura. Male inscribitur repens.

Linaria parva purpurea foliis sine ordine dispositis *J.B.* Lin. foliis carnosissimis cinereis *C.B.* In alveis fluviorum *Alpestrum* & torrentum.

Linaria lutea parva annua *J.B.* pumila seu repens II, i.e. pum. foliis carnosissimis, flosculis minimis flavis *C.B.* In cacumine montis *Lupi*, duobus à Monspelio leucis distantis. Autumno florentem inveni.

Li-

Linaria pumila procumbens latifolia flore pallido, rictu luteo. In vineis quibusdam Messanæ. Vere florēt.

Linum luteum Narbonense *J.B.* *marinum luteum* *Ger.* *maritimum luteum* *C.B.* *sylv. angustifolium luteum* *Park.* In pratis juxta Monspelium & *Sellam novam*. Floret Septembri: Hujus varietatem duplo grandiorem invenimus ad mare, quam tamen specificè differre neutiquam concedimus. Flores nempe, caules, capitula, semina utriq; eadem. Differentia tantum in magnitudine & statura, quæ ratione loci evenit. Instinctu J. Bauhini hæc duo studiosè inter se contulimus.

Linum sylv. angustis & densioribus foliis, flore minore *C.B.* Hæc species an eadem sit nostrati *Lino tenuifolio*, an diversa inquirendum. In sterilioribus circa montem *Lupi* Septembri florentem observavimus. Est autem iis in locis perexigua, foliis angustiss. densis, flore satis grandi, coloris ex purpurâ albicantis.

Linum sylv. latifolium *Ger.* *sylv. latifolium cæruleum* *Park.* *sylv. latifolium hirsutum cæruleum* *C.B.* *sylv. latifolium hirsutum flore cæruleo* *J.B.* In planitie quadam prope Augustam Vindelicorum. An potius *Linum sylv. latifolium* caule viscoso, flore rubro *C.B.*? quod circa Ingolstadtium reperiri asserit. Nostri certè flos ruber potius quàm cæruleus, quamvis nullius in caulibus viscositatis meminimus.

Lithospermum Linariæ folio *C.B.* v. *Passerina*.

Lonchitis aspera *C.B.* asp. major *Ger.* asp. major *Matthioli* *Park.* altera cum folio denticulato, sive *Lonchitis* altera *Matthioli* *J.B.* In summis rupibus montis Juræ.

Lotus arbor *Lob. Ger.* *L. arbor fructu Cerasi* *J.B.* *L. fructu Cerasi* *C.B.* In Italia circa Romam & Gallia Narbonensi circa Monspelium.

Lotus siliquâ quadratâ *Ger.* quadripinnatis siliquis *Park.* ruber siliquâ angulosâ *C.B.* flore fusco tetragonolobus *J.B.* In Sicilia propè Messanam in olivetis.

Lotus siliquosa lutea Monspelienfis *J.B.* *pratensis siliquosus luteus* *C.B.* *pratens. Monspelienfium* *Park.* Circa Tybridis fluvii ostia in pratis. Circa Genevam quoque & Monspelium copiosè.

Lotus siliquosa lutea siliquis strictioribus & longioribus. In Italia prope Tybridis fluvii ostia.

Lotus edulis Cretica *Park.* *L. pentaphyllos siliquâ convexâ I.* sive pentaphyllos siliquâ cornutâ *C.B.* *Trifolium* sive *Lotus Hieracune* edulis siliquosa *J.B.* Primò observavi in Italia prope Neapolin, postea in Sicilia.

Lotus siliquis Ornithopodii *C.B.* *J.B.* Circa Messanam ad latera montium urbi proximorum. Lotus

Lotus flore luteo, corniculis articulatis. An *Lotus* pentaphyllos siliquis recurvis, pedes corvinos referentibus *C.B.*?
Coronopus ex codice *Cæsareo Dod. Ger.*? Ad *Punto Cergolo* non longè à *Castello Puzallu* in *Sicilia*.

Lotus siliquis rectis incana vulgaris major. Neap. in rupibus maritimis.

Lotus asperior fruticosior *Park.* fruticosus incanus siliquosus *C.B.* *L. trifolia corniculata Ger.* Trif. argentatum floribus luteis *f.B.* Hanc plantam *C.B.* perperam pentaphyllum denominat, cum trifolia sit. In collibus circa *Monspelim*.

Lotus corniculata siliquis singularibus vel binis tenuis *f.B.* corniculatus minor pilosus *Park.* Trifolium corniculatum minus pilosum *C.B. Prod.* Prope *Neapolin* collegimus.

Lotus *Libyca Dalechampii Lugd.* *L. pentaphyllos* siliquis rectis *X*, sive siliquosus glaber flore rotundo *C.B.* Trifolium hæmorrhoidale alterum minus, sive *Lotus Libyca Dalechampii Park.* Trifolium rectum *Monspessulanum f.B.* In locis humidis circa *Messanam Siciliæ*, *Tropiam Calabriæ*, & *Monspelim Galliæ Narbonensis*.

Lotus incana, sive *Oxytriphylum Scribonii Largi Ger.* *Lotus* pentaphyllos siliquis rectis *IX*, sive pentaph. siliquosus villosus *C.B.* An *Lotus hæmorrhoidalis* major, sive Trifolium hæmorrhoidale majus *Park.*? Trifolium album rectum hirsutum valde *f.B.* Circa *Monspelim* eundo ad *Peroul.* Prope *Messanam* major habetur & lignosior. Figura quæ à *Parkinsono* exhibetur pro Trifolio argentato floribus luteis *f.B.* à *Gesardo* pro hoc ponitur, cui quidem nullo modo convenit.

Lotus pentaphyllos vesicaria *C.B.* Anthyllis leguminosa vesicaria *Hispanica Park.* idonea sanè appellatione. Trifolium halicacabum sive vesicarium *f.B.* perperam. Circa *Messanam* & alibi non in *Sicilia* modò, sed & in *Italia*.

Loto affinis *v. Anthyllis* & *Auricula muris*.

Lunaria radiata Robini f.B. v. Securidaca.

peltata v. Thlaspi clypeatum minus.

biscutata v. Thlaspi clypeatum.

Lupinus sativus flore albo *C.B.* sativus albus *Park.* vulgaris flore & semine albo sativus *f.B.* In *Italia* prope *Licurnum Etruriæ* portum & alibi satum vidimus.

Lupinus sylv. flore cæruleo *C.B.* flore cæruleo *Ger.* *sylv.* purpureo flore, semine rotundo vario *f.B.* In *Sicilia* circa *Messanam* spontè & copiosè.

Lupinus flore luteo *Ger. Park.* *sylv.* luteo flore, semine compresso vario *f.B.* In arenosis ad *Fretum Siculum* inter *Messanam urbem* & *Pharum Messanensem* copiosè.

N. Hæc sola planta è leguminosis gustu est amaro. *f.B.*

Lychnis

- Lychnis coronaria* vulgò *℞.B.* *coronaria sylvestris* *C.B.* *coron. vulgaris* *Park.* *cor. rubra* *Ger.* In Italia passim, ubi & flore albo, medio incarnato cernitur.
- Lychnis erecta* parva flore rubello, folio longo angusto. Inter segetes Lini vidimus, medio quasi itinere à Massa ad Lucam.
- Lychnis minima* rigida *Cherleri* *℞.B.* In collibus prope Florentiam. Apud alios Botanicos nulla hujus mentio, quod sciam.
- Lychnis sylv. hirta* *Lob. Ger. sylv. hirta major* *Park. sylv. lanugine canescens, flore majusculo rubescence, Clusio* *℞.B.* Circa Neapolin primò, deinde circa Messanam.
- Lychnis parva* flore rubello è calyce oblongo angusto. Sunt a. petala in medio profundè fissa seu bifida. Juxta Messanani in primo montium ascensu. Suspicerer hanc eandem esse cum *Ocymoides* flore rubro minore *Cret.* si florum petala responderent.
- Lychnis sylvestris calyculis striatis* *Park. cal. str. & Clusii* *Ger. sylv. latifolia calyculis turgidis striatis* *C.B.* *Muscipula major, calyce turgido ventricoso* *℞.B.* In Germania agris prope Rhenum copiose.
- † *Lychnis montana viscosa alba latifolia* *C.B.* An *Muscipula* altera flore albo *Park. ? Polemonium petraum* *Gesneri* *℞.B.* Genevæ in ipsius urbis muris & in collibus vicinis frequens. In Germaniæ quoq; meridionalibus nusquam non obvia. Hanc nuper in Anglia spontaneam observavimus, vide *Cat. Ang.*
- Lychnis montana repens* v. *Saponaria minor.*
- Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis* *C.B.* *Muscipula Lobelii* *Ger. Park. Centaurium minus adulterinum, quibusdam Lychnidis viscidæ genus* *℞.B.* In agris montosis ad Rheni ripas inter segetes.
- Lychnis viscosa erecta annua caryophylloides.* In marginibus Grammontiæ sylvæ prope Monspelium.
- Lychnis segetum rubra foliis Perfoliatæ* *C.B.* *Lychnis seg. Vaccaria rubra dicta* *Park. Vaccaria* *℞.B. Ger.* Inter segetes in Gallia & Germania passim.
- Lyfimachia lutea* in alis foliorum florens *Cas. lutea minor* *℞.B. Ger. Park. lutea II, five minor foliis nigris punctis notatis* *C.B.* In Alpibus Stiriacis.
- Lyfimachia lutea flore globofo* *Ger. Park. bifolia flore globofo luteo* *C.B.* altera lutea *Lobelii, flore quasi spicato* *℞.B.* In fossis palustribus prope *Sevenhuys* in Hollandia.
- Lyfimachia filiquosa speciosa* v. *Chamaenerium.*

M

M Achaleb v. Cerasus sylvestris.
 Maiz sive Frumentum Indicum *Ger. Maiz*, frumentum Indicum vel Turcicum vulgare *Park.* Frumentum Indicum *Mays* dictum *C.B.* Triticum Indicum *f.B.* Seritur nunc dierum non in Italia duntaxat, verum etiam in Germania. Farina ejus subflava est non alba. Nequicquam multiplicant species Tabernamontanus & Gerardus obsolum granorum aut florum colorem; cum in eadem spica grana flava & spadicea observaverimus.

Panis hinc confectus lentus est & gravis, nec fermento intumescit dum pinfitur aut coquitur, proinde obstruentis naturæ sit necesse est, & difficilis concoctionis, velut panis azymus.

Marrubium album fatuum *P. Castelli* in Cat. plantarum Messanensium. An Marrubium album peregrinum brevibus & obtusis foliis *C.B.*? In glareosis ad mare non longè à Messana. Hæc planta à nonnullis credita est Pseudodictamnus alter *Ponæ*; verum non respondent acetabula, quæ Moluccæ similia esse dicit.

Marrubium album angustifolium peregrinum *C.B.* Creticum *Ger. Park.* album angustiore folio *f.B.* Ad vias & agrorum margines prope Viennam Austriæ. Miramur interim Clusium aliam proposuisse ab hac diversam Marrubii speciem circa Viennam spontaneam, quæ nobis ibi non visa.

Marrubium nigrum longifolium *C.B.* v. Herba venti Monspelienisium.

Martagon Chymistarum *Lob.* Lilium aureum *Ger.* purpureo-croceum majus *C.B.* rubens vel croceum majus *f.B.* In sylvis supra Neapolin prope Camaldulensium cœnobium.

Martagon v. Lilium floribus reflexis.

Medica major erectior floribus purpurascensibus *f.B.* Trifolium siliquâ cornutâ, sive Medica *C.B.* Trifolium Burgundiacum *Ger.* Fœnum Burgundiacum, sive Medica legitima *Park.* Circa Genevam & Monspelium, & alibi. Circa Avenionem in agris satam vidimus.

Medica scutellata *f.B.* Trifolium cochleatum *Ger.* cochleatum fructu latiore *C.B.* Ad agrorum margines prope Liburnum Etruriæ portum.

Medica orbiculata *f.B.* Trifolium cochleatum vel scutellatum, fructu latiore, folio minuto obtuso *C.B.* In insula ad Prom. Pachynum & alibi in Sicilia. Me-

Medica orbiculata fructu minore. Prope Messanam. Hujus orbiculi dimidio minores sunt quam precedenti, & plures simul in eodem ramulo sive communi pediculo confertim nascuntur.

Medica magna turbinata *f. B.* *Medicæ majoris Bæticæ spinosæ species altera* *Ger. emac. p. 1200.* In insula ad Promont. Pachynum mox dicta.

Medica coronata Cherleri parva *f. B.* In Sicilia circa Messanam; itémq; circa Monspelium & Neapolin.

Medica doliata spinosa. In arenosis maris litoribus ad Messanam & alibi tum in Sicilia, tum etiam in Italia.

Medica doliata lenis. Ubi invenimus jam non recordamur.

Medica orbiculata elegans fructu circum oras rugis veluti crispato. In Sicilia non longè à *Puzallu* vico & *Punto Cerciolo*.

Medica fructu compresso circum oras dentato. An *Medica lunata* quædam minor *f. B.*? Prope Messanam ad margines vinearum.

Medica echinata, fructu ovato, spinulis brevibus, crebris, rigidis. Prope Messanam Siciliæ.

Medica Catalonica elegans vulgò dicta. Hanc ubi collegimus jam non recordamur. Fructus figuræ doliaris est & crebris tuberculis scaber, persimilis ligno illi quo brachia manusq; muniunt Itali ad pilam defendendam & feriendam propellendamve in ludo dicto.

Medica ciliaris Guilandini. Hanc in Alpibus invenimus. Fructus orbiculum aut rotulam imitatur, habetq; in circumferentia molles & oblongas spinulas seu setas, ciliorum æmulas.

Medica marina *Park.* *Medicæ marinæ spinosæ species* *Ger. Trifolium cochleatum* maritimum spinosum *C. B.* *Trifolium cochleatum* marinum, seu *Medica marina* *f. B.* Ad litora Maris Mediterranei frequens. Hæ duæ species proximè scriptæ perennes sunt, reliquæ omnes annuæ.

Medica echinata fructu parvo oblongo, spinis rarioribus rigidis. Hanc etiam in Sicilia collegimus.

Melampyrum multis sive *Triticum vaccinum* *f. B.* *Melampyrum purpurascens* comâ *C. B.* *Melampyrum purpureum* *Ger. Cratægonon* flore vario *Park.* *Melampyrum ejusdem.* Inter segetes per Germaniam & Galliam vulgatissimum.

Melampyrum cæruleâ comâ *C. B.* *cæruleum* *Ger. Melampyro affinis* *Parietaria cærulea* quorundam *f. B.* In sylvis montosis non longè à Gratianopoli, qua indè ad max. Carthusianorum cœnobium itur.

Melampyrum erectum flore luteo amplo. Ad latera montium Messanæ imminens. Melam-

Melampyrem erectum flore vario ex albo & purpureo. An *Antirrhinum* album ferrato folio *J.B.* ? Cum priore, & quo etiam fortasse non differt specie. Possunt hæ plantæ ad *Euphrasias* aut *Cristas Galli* referri.

Melanthium v. Nigella.

Melica sive *Sorghum* *Dod. Ger. Park.* *Sorghi J.B.* *Milium* arundinaceum subrotundo semine, *Sorgo* nominatum *C.B.* In Foro Julii ad panificia feritur: estq; haud dubiè *Milium* illud quod suo tempore ex *India* in *Italiam* inventum scripsit *Plinius*, nigrum colore, amplum grano, harundineum culmo, quòdque adolescit ad pedes altitudine septem prægrandibus culmis. E paniculis hujus à granis repurgatis scopulas efficiunt ad mundandas vestes aliòsq; usus, cujusmodi *Venetis* vanales vidimus.

Melilotus quinta Tragi *v. Securidaca.*

Melilotus major candida *Trag.* Germanica *Ger.* flore albo albo *Park.* In Germania, Italia & Gallia Narbonensi frequens. Hæc reverà specie differt à vulgari nostra lutea, quamvis *C. Bauhinus*, qui alias plerumq; nimis multiplicat species, eandem faciat.

Melilotus Messanensis procumbens folliculis rugosis sublongis, spicis florum brevioribus. In loco humido, in lingua illa inter portum Messanensem & fretum Siculum.

Melissa sylvestris hirsutior minùs odorata. *Melissophylli* sylvestris genus *Matthiolo.* In sepibus prope Liburnum & Salernum copiosè. Hæc est, puto, quam *J. Bauhinus* memorat *Hist. lib. 28. cap. 12.* Habemus (inquit) nos quandam *Melissam* nigriorem & hirsutiorẽ, à nemine memoratam. Hic *Matthiolus* à Botanicis injustè arguitur, quasi *Melissophyllum* suum sylvestre à sativo non esset distinctum.

Melissæ similis foliis minoribus, floribus albis, labello punctato. Circa Messanam, in insula ad Ptom. Pachynum in Sicilia.

† *Menthastrum* *Ger.* hortense, sive *Mentha* sylvest. *Park.* *Mentha* sylvestris folio longiore *C.B.* *Menthastrum* spicatum folio longiore candicante *J.B.* In agris & pascuis prope Arnun flumen non longè à Florentia.

Mespilus J.B. sativa *Ger.* vulgaris sive minor *Park.* Germanica folio laurino non ferrato *C.B.* In Etruriæ sepibus non procul Viterbo.

Mespilus Aronia *Ger.* *Aronia* Veterum *J.B.* *Aronia* sive Neapolitana *Park.* Apii folio laciniato *C.B.* Sponte provenire dicitur in montibus Gallie Narbonensis, quamvis me non vidisse fateor spontaneam.

Meum alterum Italicum quibusdam *J.B.* alterum Italicum

Ger. spurium Italicum Park. latifolium adulterinum C.B.
 In collibus & clivis maritimis Regni Neapolitani.
Mezereon Germanicum, an Chamædaphne Dioscoridis
Lob. ? Laureola folio deciduo, flore purpureo C.B. Laur.
fol. dec. sive Mezereon Germanicum F.B. Chamæla
Germanica sive Mezereon Ger. Cham. Ger. sive Meze-
reon vulgò Park. In montosis Germaniæ passim. Ha-
betur & in collibus & montibus circa Geneviam. Facul-
tatis est causticæ & adurentis, nec intra corpus tuto su-
mitur.

Millium arundinaceum C.B. v. Melica.

Millefolium nobile Trag. Achillea sive Millefolium nobile
Ger. Achillea Sideritis, sive nobilis odorata Park. A-
chillea millefolia odorata F.B. Tanacetum minus album
odore Camphoræ C.B. In Germania ad Rhenum, Gal-
lia Narbonensi circa Monspelium, & in Italia passim.

Millefolium luteum Ger. Park. tomentosum luteum F.B.C.B.
Circa Avenionem, & juxta viam quæ Auriaco Avenio-
nem ducit, ubi & Clusio observatum Hist. lib. 3. cap. 37.

Mollugo montana latifolia ramosa C.B. Gallium sive Mol-
lugo montana Ger. Gallium flore albo majus, sive Mol-
lugo montana Park. Rubia sylvatica lavis F.B. In syl-
vis, agro Luceburgensi & Aquisgranensi.

Moly moschatum capillaceo folio C.B. moschatum vel Zi-
bettinum Monspeliense Park. Allium sylv. perpuillum
juncifolium moschatum F.B. In collibus prope Monspe-
lium & Sellam novam, aux Garigues.

Moly parvum caule triangulo C.B. caule & foliis triangula-
ribus Park. Primò inter Lericium & Massam; deinde
circa Baias copiosè.

Monophyllon Ger. Mon. sive Unifolium Park. Mon. recen-
tiorum Lob. Mon. sive Liliun convallium minus C.B.
Unifolium, sive Ophrys unifolia F.B. Primò in luco
quodam juxta Hagam Comitum Hollandiæ, deinde in
omnibus ferè editioribus Belgii & Germaniæ sylvis &
dumetis.

Morus alba Ger. Park. F.B. fructu albo C.B. The white
Mulberry. In Sicilia, Italia & Gallia Narbonensi co-
piosissimè feritur ad bombyces alendos; sunt enim folia
ejus teneriora & vermiculis hisce gratiora quàm nigra.

Morus nigra Park. F.B. fructu nigro C.B. Morus Ger. The
black Mulberry-tree. Cum priore.

N. 1. Fructus nigra (mora Celsi officinis dicti) imma-
 turi refrig. sicc. astringunt validè. Usus præcip. in diar-
 rhœa, dysenteria, fluxu menstruo, expuitione sanguinis:
 Extrinsecus in faucium ac oris inflammationibus ulceri-
 búsq;. Schred.

2. Mora

2. Mora matura refrigerant, alvum subducunt initio paſtus & ante alios cibos ſumpta, nam poſt alios cibos facile corrumpuntur; ſitim ſedant, appetitum excitant, &c. *Schrod.*

3. Cortex radicis abſtergit, aſtringit, hepar ac liem aperit, alvum laxat, tineaſ lãtas necat: Circa meſem circumſoſſa & incifa dat ſuccum qui concreſcit & ad dentium dolores efficax eſt. Quin & folia vel ſola vel cum cortice cocta odontalgiam ſedant. Veteres plura habent, quos conſule. Syrupus mororum ad ſupradicta omnia valer, & grãta ſua aciditatẽ febrilem ardorem reſtinguit.

4. Morus urbanarum noviffima germinat, nec niſi exacto frigore, ob id dicta ſapientiſſima arborum. *Plin.* Muſcus Alpinus flore inſigni dilutẽ rubente *J.B.* Gentianella omnium minima *C.B. Park.* In altiffimis verticibus montium max. Carthufianorum cœnobio imminentium. Muſcus denticulatus *Ger.* denticulatus major *C.B. Park.* terreſtris denticulatus *Lob.* pulcher parvus repens *J.B.* In aggeribus umbroſis in Italia & parte meridionali Germaniæ.

Muſcus capillaceus longiſſimus, i.e. Muſcus arboreus II; *C.B.* Hunc longiſſimis capillaceis filamentis denſẽ ſtipatis ex Abietibus dependentem in Germania vidimus & collegimus. Charta in quibus compoſita fuit colore flavo ad ruſſum tendente inficit.

Myagro affinis herba capitulis rotundis *J.B.* Myagro ſimilis ſiliquã rotundã *C.B. Park.* Hanc inter plantas noſtras ſiccas habemus, ubi collegimus jam non recordamur.

Myrica 1 *Cluſ.* Tamarifcus folio tenuiore *Park.* Narbonenſis *Ger.* Tamarix altera folio tenuiore, ſive Gallica *C.B.* major ſive arborea Narbonenſis *J.B.* Ad mare propẽ Monſpelium abunde.

Myrica ſylv. altera *Cluſ.* Tamarifcus folio latiore *Park.* Germanica *Ger.* Tamarix frutiçoſa folio craſſiore, ſive Germanica *C.B.* Germanica, ſive minor frutiçoſa *J.B.* Ad ripas fluviorum; v.g. circa Auguſtam Vindelicorum, Genevam, &c.

N. 1. Abſterg. ac ſubaſtringit. Uſus præcip. in obſtructione ac tumore lienis. Adeo mirabilem antipathiam contra ſolum hoc viſcerum faciunt (inquit Plinius) ut affirmant, ſi ex alveis factis bibant ſues ſine liene inveniri. De ligno Ægyptii (teſte Alpino) decoctum parant ad luem Veneream curandam non ſecus ac noſtri de Guaiaco, quod exhibent leproſis, ſcabioſis, &c. cum

felici successu. Idem faciunt in melancholicis, ictericis, nigris & hydropicis. Extrinsecus in tinea capitis & obstructione mensium valet.

2. Doliola è Myricæ assulis Francofurti ad Mœnum venalia memorat Clusius, quibus contentus liquor lie-nosis prodest.

3. Curæ Edmundi Grindalli Archiepiscopi Cantuariensis Tamaricem Angli debent, quam induratum lienis passionem eximie juvare expertus primus in Angliam transtulit. *Camden. Annal. Elizab.*

Myrtus communis Italica C.B. An Myrtus fructu albo *Ger.?* Myrtus vulgaris nigra & alba, sativa & sylvestris *J.B.* In Italia & Gallo-provincia frequentissima, ad mare inferum, itémq; in Sicilia.

N. 1. Hujus tum folia, tum bacce (myrtilli Officinarum) refrigerant temperatè, siccant validè astringuntq;. Usus internus rarior est, nihilominus tamen adhibentur in fluxu alvi ac expuitione sanguinis. Extrinsecus usus utriusq; crebrior.

Folia emendant foetorem sub axillis ac inguinibus (pulvis aspersus) sudorem corporis immodicum sistunt (frictione) membris catarrhosis opitulatur, alvi fluxui succurrunt, defensivum exhibent in herpetibus, putredinem oris sanant, hæmorrhagiam narium sistunt; polypo medentur (cum melle ac vino.)

Bacca mitigant oculorum inflammationes; juvant luctatos articulos ac ossa fracta; subveniunt procidentie uteri ac ani; capitis tineas furfuraceaq; excrementa abigunt. *Schrod.*

Præcipuæ eorum vires dependent ab adstrictione & suavitate odoris, ut singulas examinanti manifestum fiet.

2. Bellonius refert Illyricos Myrti foliis coria perficere, quemadmodum Macedones Rhoe; Ægyptios Acaciae siliquis; Asiæ minoris incolas glandium Æsculi calycibus; Gallos Quercus libro; Phryges sylvestris Pini corticibus. *Clus. hist. lib. 1. cap. 43.*

N

Narcissus medioluteus *Lob. Ger.* An medioluteus polyanthos *Ger.* ? medioluteus XI, sive copioso flore, odore gravi *C. B.* Narcissus multos ferens flores, medioluteus Narbonensis *J. B.* Itinere à Lericio ad Massam, & à Massa ad Lucam inter segetes copiosè.

Natrix Plinii v. Anonis lutea major.

Nasturtium Alpinum tenuissimè divisum *J. B. C. B.* Cardamine Alpina *Ger.* Alpina minor *Park.* In summis jugis montium Juræ & Salevæ locis humidioribus.

Nerium Alpinum v. Ledum.

Nerium v. Oleander.

Nigella arvensis *Park.* arvensis cornuta *C. B.* Melanthium Sylvestre *Lob. Ger.* Sylv. sive arvense *J. B.* Per Germaniam, Italiam & Galliam Narbonensem inter segetes passim.

N. 1. Usus semin. præcip. in mucilagine pulmonum resolvenda & expectoranda, lacte augendo, urinâ ac menses ciendis, moribus venenatis corrigendis. Specificè in febribus quartanis & quotidianis. Extrinsecus crebrius est in Cephalalgia sedanda, catarrhis exiccandis, in cucuphis epithemat, &c. applicatum *Schrod.*

2. Radix sistit proprietate sua hæmorrhagiam, si dentibus masticetur, naribusque imponatur. *Idem.*

3. Exprimitur ex semine isto oleum, quo imperiti Pharmacopœi plerique pro oleo nardino non absque gravi utuntur errore. *Dod.*

O

Ocymastrum Valerianthon v. Valeriana.

Ocymoides repens v. Saponaria minor.

Ochrus sive Ervilia *Dod. Lob. Ger.* Och. sive Erv. flore & fructu albo *Park.* Och. folio integro capreolos emittente *C. B.* Lathyri species quæ Ervilia sylvestris *Dodonæo J. B.* Inter segetes propè Liburnum portum.

Olea sativa *J. B. Ger. Park. C. B.* In territorio Lucæ urbis,

urbis. In Gallo-provincia, & alibi in Italia & Gallia Narbonensi copiosissimè.

N. Oleæ vires & usus explicare nimis prolixum foret & perdifficile. Sic breviter Schroderus. *Folia* refrigerant, exiccant & astringunt. Usus externus & præcip. in fluxu alvi, mensium, in herpetibus & sim. *Fructus* immaturi exiccant & astringunt, præsertim sylvestres. *Olivæ conditæ* excitant appetitum, movent alvum, humentem ventriculum exiccant & confortant. Condiuntur a. antequam planè maturuerint.

2. Oleum quod exprimitur ex olivis maturis calfacit & humefcat moderatè (N. vetus calidius est recenti) emollit, digerit, vulnerarium est, alvum laxat (cum cerevisia calida assumptum ʒi) ariditatem pectoris corrigit, tormina ventris mitigat, meatus urinarios laxat, erosos abstergit & consolidat. Extrinsecus creberrimi usus est in clysteribus, tumoribus calidis, &c. Cum aqua tepida assumptum movet vomitum.

3. Oleo quidem non Apes tantum sed & omnia insecta exanimantur. *Plin. lib. 11. cap. 19.* quod Cl. Vir M. *Malpighius* in Bombyce aliisque experiendo verum invenit. Ratio est, quia oleum meatus Spiritus, seu poros quibus aer attrahitur & redditur obstruit, ob cujus defectum animalculum illico moritur. Nec enim minimis hisce insectis respiratio minus necessaria est ad vitam quam majoribus & perfectioribus animalibus: saltem sine aeris beneficio diu movere & vivere non possunt.

4. Oleum picem è pannis extrahit, quod aqua non facit. Vulgatum est, (inquit Sennertus) ut si quis manum pice inquinet, eam aqua non mundet sed oleo aliquo aut pinguedine, quæ picem liquefaciat. *Hypomn. 1. cap. 5.*

5. Scribit F. Licetus, se vidisse Rechi in horto patris sui stipitem oleæ sativæ aridum ferè ac levem, per decennium & ultra à trunco separatum, neque posthac unquam terræ implantatum, ad alterius ligni fulcrum in terram demissum, & ligno cui fulcimentum præstabat clavis ferreis affixum, pullulasse, germinasseque eodem anno, plures olivarum novellas foliis & fructibus onustas, atque in posterum etiam per plures annos protulisse. *Sennert. Hypomn. 5. cap. 7.* Unde abundè confirmatur illud Poetæ, *Truditur è sicco radix oleagina ligno.*

6. In Hispania oleas admotis scalis manu legunt, & non decutiunt ut in Gallia Narbonensi; nè sc. sequentis anni spem decussis germinibus præripiant. Vehementer enim laborant percussæ & detrimentum capiunt. *Clus.*

7. Olivæ

7. *Olivæ* quàmvis per maturitatem nigræ sunt, sapore quoque acri, amaro & nescio quid nauseosi admixtura habente; oleum tamen quod inde exprimitur ferè pellucidum est, nonnihil flavicans, sapore dulci & grato, unde patet saporem hunc & odorem parti aqueæ seu amurcæ inhærere. Laudatissimum autem apud nos habetur oleum, quod coloris omnis & saporis maximè expers est.
- Oleander* flore rubro *Park.* *Nerium* sive *Oleander* *Ger.* *Nerium* sive *Rhododendron* *J. B.* *Nerion* floribus rubescentibus *C. B.* In *Sicilia* ad aquarum rivulos in ascensu montis *Etnæ*.
- Onobrychis* spicata flore purpureo *Park. C. B.* flo. purpureo *Ger.* quibusdam, flore purpureo *J. B.* In loco quodam glareoso non longè à *Vienna Austriæ*.
- Onobrychis* vulgaris minor *Park.* fructu echinato minor *C. B.* Ad radices *Vesuvii* montis & in insula sæpius memorata ad *Prom. Pachynum*. Flos hujus purpureus est & minor quàm vulgaris; fructus a. echinatus major.
- Onobrychis* arvensis *C. B. v.* *Speculum Veneris*.
- Onobrychis* semine clypeato aspero *v.* *Hedysarum* clypeatum.
- Opuntia* marina *Park.* *Scutellaria* sive *Opuntia* marina *J. B.* *Lichen* marinus rotundifolius *Ger.* *Fucus* folio rotundo *C. B.* *Sertolara Imper.* In maris litora rejectam collegimus ad *Punto Cerciolo*, non longè à *Castello Puzallu* in *Sicilia*.
- † *Orchis* galeâ & alis ferè cinereis *J. B.* *Cynosorchis* latifolia hiante cucullo minor *C. B.* *Cynosorchis* altera *Dod. de floribus*, ubi bona ejus habetur descriptio. *Cynosorchis* major altera *Ger.* latifolia minor *Park.* Circa *Genevam* ad agrorum margines. *Aprili* & *Mai*o mensibus floret. Hanc non ità pridem in *Anglia* sponte natam observavimus. *V. Car. Ang.*
- Orchis* anthropophora flore fusco. In marginibus agrorum quorundam propè ripas *Rhodani* non longè à *Geneva*.
- Orchis* macrophyllus *Columnæ Park.* *Orchis* sive *Testiculus* maximo flore *J. B.* *Orchis* montana Italica flore ferrugineo, linguâ oblongâ *C. B.* Per totam ferè *Italiam* ad mare inferum, vidimus enim *Massæ*, *Liburni*, *Neapoli* in pascuis siccioribus.
- Orchis* magna, latis foliis, galeâ fuscâ vel nigricante *J. B.* Ad latera montis *Salvæ* propè *Genevam*. *Thyrus* florum speciosus est.
- Orchis* strateumatica minor *Ger. J. B.* *Cynosorchis* militaris

- taris minor *C. B. Park.* In pascuis ad latera montis Salevæ.
- Orchis rotunda Dalechampii* *f. B.* *Cynorchis capitulo globofo* *Park.* *Cyn. milit. IX,* five globofo flore *C. B.* In summitatibus Juræ montis.
- Orchis palmata minor* odoratissima purpurea five nigra *f. B. palmata XXI,* five Alpina angustifolia nigro flore *C. B. palmat. angustifolia minor* odoratissima *Park.* In herbidis jugis & pascuis montium Juræ & Salevæ copiose.
- Orchis foetida III,* five odore hirci minor *C. B. Tragorchis foemina* *Ger. minor & verior* *Park.* *Tragorchis minor* flore fuliginoso *f. B.* In pascuis quibusdam non longe à Geneva.
- Oreoselinum v. Apium montanum* nigrum.
- † *Ornithogalum luteum C. B. Dod. luteum,* five *Cæpe agraria* *Ger. Bulbus sylvestris Fuchsi* flore luteo, five *Ornithogalum luteum f. B.* In agro Pedemontano ad sepes & inter segetes. Invenimus etiam in Helvetia.
- Ornithogalum spicatum* *Ger. spic. flore albo* *Monspessulanum f. B. majus spicatum flo. albo C. B.* In insula ad Prom. Pachynum, atque etiam *Monspeli* inter segetes.
- Ornithogalum vulgare* *Ger. vulgare & verius,* majus & minus *f. B. umbellatum medium angustifolium C. B.* In Lombardia, Pedemontio, & agro Lucensi inter segetes.
- Ornithogalum spicatum flore virente v. Asphodelus.*
- Ornithopodio* similis hirsuta *Scorpioides C. B. Scorpioides leguminosa f. B. Dod. Ger. Park.* Circa Messanam Siciliæ & Neapolin Italiæ frequens.
- Orobanche ramosa* *Ger. Park. C. B. minor* purpureis floribus, five *ramosa f. B.* In arvis demessa segete primo circa Ratisponam in Germania observavimus, postea etiam in Italia & Gallia Narbonensi.
- Orobis receptus herbariorum Lob. Ger. vulgaris* herbariorum *Park. filiquis articulatis, semine majore C. B. Orobis* five *Ervum multis f. B.* In agris circa *Monspelim* & *Genevam.*
- Orobis sylvaticus purpureus vernus C. B. Pannonicus 1 Clus. sylvaticus purpureus major* *Park. sylvat. vernus* *Ger. emac. Galea nemorensis verna f. B.* In dumetis à *la Bastie,* & alibi circa *Genevam,* inque Germaniæ & Helvetiæ sylvis frequens.
- Orobis sylvaticus Viciæ foliis C. B. Pannonicus 2 Clus. Astragaloides* *Ger. Astrag. herbariorum* *Park. Astragalus* major

major Fuchſio *ſ. B.* Abundat in colle *La Baſtie*, ad ripas Rhodani & in montis Salevæ ſylvofiſ prope Genevam : in Germania quoq; non admodum rarus eſt.

Oryza Lob. Ger. Park. ſ. B. Italica C. B. In Italia paluſtribus Ferrariam inter & Bononiam ſatam vidimus.

N. In cibis admodum eſt familiaris, gratiſſimi ſaporis; multum nutrit & ſemen auget : verum obſtruentis naturæ eſt & alvum leniter adſtringit. Proinde datur in cibis utiliter dyſentericis, coeliacis & diarrhœâ affectis : *Oryzâ* nunc dierum veſcitur (ſi Americanos excipias) humani generis pars maxima, Turcæ, Perſæ, Indi, Africani, Sinenſes, &c.

Oxalis maxima ſylvatica ſ. B. Acetoſa montana maxima C. B. Acetoſa max. Germanica Park. In monte *Tbuiri* prope Genevam.

Oxyacantha Theophrasti Ger. v. Pyracantha.

Oxys lutea Ger. ſ. B. lutea corniculata repens Lob. luteo flore Park. Trifolium acetosum II, ſive corniculatum *C. B.* In Italia & Sicilia, umbroſis præſertim, ubique ferè obvium.

Oxycedrus v. Cedrus Lycinia reſuſa ſ. B. & Juniperus.

P

P Aliurus *Lob. Dod. Ger. Paliurus ſive Rhamnus 3 Dioſcoridis Park.* Rhamnus ſive Paliurus folio Jujubino *ſ. B.* Rhamnus folio ſubrotundo, fruſtu compreſſo *C. B.* In ſepibus circa Veronam, Bergamum, Romam & alibi in Italia, necnon circa Monſpelium.

Palma ſive Manus marina ſ. B. Urtica marina X, ſive Manus marina C. B. Habuimus ex ſinu Adriatico, & mari infero circa Romam.

Palma humilis v. Chamærrhiphes.

Palma. Chriſti v. Ricinus.

Panax Herculeum majus Ger. paſtinacæ folio, an Syriacum Theophrasti C. B. Heracleum alterum ſive peregrinum Dodonæi Park. Sphondylion, vel potiùs Paſtinacæ Germanicæ affinis, *Panax*, vel Pſeudo-coſtus flore luteo *ſ. B.* In Sicilia non longè à caſtello *Puzallu.*

N. Ex hujus vulnerato circa radicem caule ſuccus æſtivis menſibus manat æſtate fervida, etiam in Belgio. *Dod.* In Opopanacis grumis reperta ſemina in Belgio ſata hanc plantam produxere. *C. Hoffman.*

Pancra-

- Pancratium** *Lob. marinum Ger. Monspessulanum*, multis
Scylla alba parva J.B. Narcissus maritimus C.B. In
 arenoso maris litore prope Neapolin copiosè. Post sol-
 stitium æstivum floret.
- Panicum** sylvestre *v. Gramen panicum.*
- Paronychia** sive *Alsinefolia incana J.B. Anthyllis mariti-
 ma incana Park. marit. Alsinefolia C.B. marina incana
 Alsinefolia Ger.* In vineis circa Messanam & Monspe-
 lium.
- Passerina** *Lobelii J.B. P. Linariæ folio Lobelii Ger. Li-
 thospermum Linariæ folio Monspeliense Park. IX, sive
 Linariæ folio Monspeliacum C.B. Circa Monspelim.
 In insula ad Promont. Pachynum proceriorem observa-
 vimus.*
- Passerina** *Tragi J.B. Pas. altera Ger. Lithospermum Li-
 nariæ folio C.B. Lithospermum Germanicum, Passerina
 Tragi Park. In arvis demessa segete circa Basileam,
 Genevam, Monspelim, &c.*
- Pastinaca** marina *Lob. v. Cithmum.*
- Pedicularis** Alpina lutea. *Yellow mountain Louse-wort,
 Rattle or Cocks-comb.* In altissimis montibus maximum
Carthusianorum cœnobium cingentibus.
- Peganium** *Narbonensium Lob. v. Ruta sylvestris minima.*
- Pentaphyllum** sive prope *Heptaphyllum argenteum flore
 muscoso J.B. Alchimilla Alpina quinquefolia C.B. mi-
 nor quinquefolia Park. In monte Jura & in Alpibus
 Sabaudicis copiosè. De hac planta v. J.B.*
- Pentaphyllum** *v. Quinquefolium.*
- Peplus** minor *J.B. In agris prope Ladum Monspeliacum
 annem non longè à Castelneuf.*
- Perfoliatum angustifolium montanum** *Col. Perfoliata minor
 angustifolia, Bupleuri folio C.B. Perf. angustif. Alpina
 minor Park. Auriculæ Leporis affinis, Odontitis lutea
 Valerandi ac Dalechampii J.B. In agris quibusdam Si-
 cilix sterilioribus prope Punto Cerciolo, non procul Pu-
 zallu vico.*
- Perfoliata minor foliis gramineis** *J.B. P. Alpina gramineo
 folio, sive Bupleuron angustifolium Alpinum C.B. An
 Perfoliata Alpina angustifolia minima C.B. ? In summis
 montibus max. Carthusianorum cœnobio vicinis. Icon
 Ponzæ, quam proponit Parkinsonus sub titulo Bupleuri
 angustifolii Alpini ; Gerardus sub tit. Sedi petraei Bu-
 pleuri folio, huic nostræ plantæ non bene convenit.*
- Periclymenum perfoliatum** *Ger. J.B. C.B. perfoliatum ca-
 lidarum regionum Lob. perfoliatum sive Italicum Park.
 In Italia & Gallia Narbonensi.*

Periclymenum rectum fructu rubro *J.B. Park.* rectum Germanicum *Ger.* *Chamæcerasus* dumetorum fructu gemino rubro *C.B.* In Germania, ad sepes & in dumetis vulgatissimum.

Periclymenum rectum fructu nigro *Park.* rect. fructu gemino nigro *J.B.* *Chamæcerasus* Alpina fructu nigro gemino *C.B.* In sylvis juxta Sacellum Brunonis, à la grand Chartreuse.

Periclymenum rectum fructu rubro *Ger.* fructu rubro singulari majore *Park.* sed perperam, nam semper geminum habet. *Chamæcerasus* Alpina fructu rubro gemino, duobus punctis notato *C.B.* *Chamæcerasus* Gesneri, seu *Chamæpericlymenum* quoddam Alpinum *J.B.* In monte Saleve copiosè.

Petasites albus anguloso folio *J.B.* minor *C.B. Park.* In declivibus montium quos transivimus eundo à Gavia ad Genuam.

Peucedanum majus *Ger.* majus Italicum *Lob. J.B. C.B. Park.* In lingua illa Portum Messanensem à Freto Siculo dirimente.

Phalangium pulchrius non ramosum *J.B.* An *Phalangium* flore Lili *ejusdem*? *Phalangium* I, sive magno flore, & fortè etiam II, sive parvo flore non ramosum *C.B.* *Phalangium* non ramosum *Ger.* In monte Sabaudix Genevæ vicino, Saleve dicto.

Phalangium parvo flore ramosius *J.B.* III, sive parvo flore ramosum *C.B.* ramosum *Ger. Park.* Circa Francofurtum, Basileam, Genevam, &c. in collibus, pascuis montosis & ericetis.

Phalangium Cretæ Salonenfis *Lob. Ger.* *Asphodelus* VII, sive foliis fistulosis *C.B.* minor foliis fistulosis *J.B.* In campis lapideis seu Salonenfi Creta vulgò *The Craux*, inter Arelaten urbem & oppidum Salonam copiosissimè.

Phalaris semine nigro *Park.* major semine nigro *J.B. C.B.* Circa Messanam in Sicilia; Bajas & Neapolin in Italia; & Monspelium in Gallia Narbonensi. Ab hac non differre suspicor Gramen phalaroides majus sive Italicum *C.B.* Grana hujus minora sunt quàm Phalaridis vulgaris, garis.

Phillyrea serrata 2 Clusii *Ger.* & *Phillyrea* latifolia spinosa *C.B.* seu 1 Clusii. *Phillyrea* folio Alaterni, & *Phillyrea* folio Ilicis *J.B.* *Phillyrea* latifolia aculeata, & *Ph.* folio lato serrato *Park.* Existimo enim has duas non differre specie. In Etruria copiosissimè, itémq; circa Monspelium in præruptis clivis non longè à specu Frontignana; ad montem Lupi & alibi.

Phillyrea

Phillyrea angustifolia *J.B. Ger. Lob. angustifolia prima C.B. angustifolia secunda Park.* In Etruria abunde, necnon circa Monspelium.

Phillyrea latiusculo folio J.B. latiore folio Ger. angustifolia prima Park. Phil. 4, sive folio Ligustri C.B. In Etruria inter Massam & Lucam; item in Provincia Gallica. Hæc fortè non differt specie à priori, nam in hujus plantæ, ut & Alaterni, foliorum figurâ, magnitudine, colore, incisuris mirè ludit natura.

Phthora v. Thora.

Phyllon marificum & fœminificum Park. arrhenogonon & thelygonon folio incano Monpessulanum J.B. Phyllon testiculatum, & Phyllon spicatum C.B. Phyl. arrhenogonon sive marificum, & Phyl. thelygonon sive fœminificum Ger. In aggeribus fossarum & viis publicis Monspelii, præsertim prope aquas.

Phyteuma Monspeliensium Lob. J.B. Resedæ affinis Phyteuma C.B. Res. aff. Phyteuma Monspeliensium dicta Park. Circa Monspelium passim; in Italia quoq; circa Romam & alibi. Hæc planta omnino Resedis annumeranda est.

Picea Latinorum v. Abies mas Theophrasti.

Pilosella minor folio angustiore minùs piloso repens J.B. major repens minùs hirsuta C.B. In pascuis & collibus circa Genevam.

Pilosella minore flore hirsutior & elatior non repens J.B. Pil. major erecta C.B. major Ger. altera erecta Park. Et hanc circa Genevam inveni.

Pilosella sive Pulmonaria lutea angustiori folio, valdè pilosa altera J.B. In monte Saleva Genevæ propinquo.

Pilosellæ majoris seu Pulmonariæ luteæ laciniatæ species minor J.B. In prædicto monte Saleva, in rupium fissuris.

Pinaster, sive Pinus sylvestris Hispanicus major Clus. J.B.

Pinus VI, sive maritima altera C.B. Ab hoc non differt specie, ipso Clusio monente, *Pinaster Austriacus major albus Clus. J.B. Pinus II, sive sylvest. C.B. Parkinsonus & Gerardus* in hac arbore mihi non satisfaciunt. Habet a. folia longa, in viriditate nigricantia; conos oblongos, turbinatos, ramorum alas spectantes & reflexos, nucleis parvis, nec mali vulgaris nucleis multo majoribus, quibus & figurâ suâ accedunt. Habetur in viridariis nostris in Anglia frequens; nonnullis *The mountain Pine* dicta: ubi (ut rectè Clusius) in Pini sat. altitudinem excrescit. Provenit, autore Clusio, in Aquitania & Pyrenæis frequentissime; quod & *D. Willughby nobis*

nobis confirmavit; & plurimam Resinam fundit; est etiam in Suevia, Bavaria, Austria, &c. passim obvia. Suspicatur J. Bauhinus non differre hanc à Pinu sua sylvestri & Tæda.

Pinaster alter *Hispanicus* vel minor *Hispanicus Clus.* Pinus V, five *maritima major C. B.* sylvestris sterilis elatior *Park* sylv. *maritima* conis firmiter ramis adhærentibus *fr. B.* In Alpibus *Stiriacis.* Hujus folia breviora sunt & magis glauca quàm præcedentis, conii minores. Hortulanis nostris perperam *the Scotch-Firre*, i. e. *Abies Scotica* dicitur.

Pinus sativa C. B. sativa five domestica *Ger.* urbana five domestica *Park.* aliculis duris, foliis longis *fr. B.* In Gallia *Narbonensi* & Italia: copiosissimè autem propè *Ravennam.*

N. 1. Hæc arbor vulnerata Resinam fundit liquidam, quæ postea coquendo fit arida.

2. Pix liquida seu navalis è Pinu vi ignis excoquitur hoc modo. Pinuum vetustarum stipites pingues & Resinâ adeo prægnantes ut accensi instar facis ardeant, (hujusmodi arbores Antiqui tædas appellant) assulatim cæsos super area seu pavimento è luto usto aut lapidibus antea præparato, & à centro undique ad circumferentiam paulatim declivi, in strues aut acervos componunt, iis similes quos extruunt qui carbonès faciunt. Strues hæc ramulis faginis pineisve circumcirca contegunt, & deinde pulvere aut luto superimposito curiosè loricant, ne quæ fumus aut flamma exire possit. Ignem postea desuper accendunt, quemadmodum carbonarii solent, qui liquorem ligni oleosum inferiùs subsidere ad ima compellit. Is autem ob pavimenti declivitatem, in canalem, (qui acervum undique coronæ instar cingit) promptè delabatur, indeque per alios ductus in foveas aut vasa ei recipiendo destinata, derivatur. Ex hoc in cortinas injecto, & tandiu decocto donec humor omnis absumatur, fit Pix arida & rasilis, Græcis *πυρίμαστα* dicta. Nostrates Picem liquidam *Tarre* vocant; siccam verò seu aridam *Pitch.*

3. Pini cujuscunque cortices & folia refrigerant & astringunt, undè in dysenteria & fluore mensium profunt. Nuces pineæ caliditate temperatæ sunt & humidæ, maurant, leniunt, impinguant. Nuclei saporis sunt delicatissimi, & in Italia mensis secundis adjiciuntur. Usus præcip. in phthisi (quia nutriunt bene) tussi, stranguria ac acrimonia urinæ, quàm mitigant: Segnem excitant Venerem, ulcera renum mundificant, &c.

4. Decoctum

4. Decoctum aut infusum summitatum Pinus in cerevisia aliòve idoneo liquore ad calculum renum & vesicæ plurimum valere creditur, necnon ad scorbutum aliòsque thoracis affectus.

N. Resina omnis confert præcipuè tussi aliisque pulmonum affectibus (cum melle) urinæ ac alvo ciendæ; calculum pellit, arthriticos affectus juvat, gonorrhœam sistit. Extrinsecus Chirurgis usitatissima est in emplastris; movet enim pus, maturat, & scabiei medetur. Sunt qui Terebenthinam vulgarem (est autem ea laricis resina) in cerevisia infundunt, atque simul deservere sinunt, pro potu ordinario in præservatione calculi viscerumque obstructionibus.

Plantago quinquenervia cum globulis albis pilosis *f. B.* angustifolia VIII, sive paniculis Lagopi *C. B.* angustifolia paniculis Lagopi *Park.* Circa Messanam. Habetur quoque Monspelii & Nemausi.

Plantago angustifolia Alpina *f. B.* Holosteum III, sive hirsutum nigrans *C. B.* In summis jugis montis Juræ.

Plumbago Plinii *Ger.* Dentilaria Rondeletii *f. B.* Lepidium Dentellaria dictum *C. B.* Lep. Monspeliacum, Dentilaria dictum *Park.* Circa Syracusas in Sicilia, Romam & alibi in Italia, Monspelium in Gallia Narbonensi.

Polemonium sive Trifolium fruticans *Ger.* Polem. sive Trif. frut. vel Jasminum luteum vulgare *Park.* Trifolium fruticans, quibusdam Polemonium, flore luteo *f. B.* Jasminum V, sive luteum vulgò dictum, bacciferum *C. B.* In sepibus circa Monspelium; vidimus etiam in Regno Neapolitano propè Scaleam.

Polium montanum album *C. B.* *Ger.* Monspellulanum *f. B.* P. Mont. Monspeliacum *Park.* In Italia & Gallia Narbonensi. C. Bauhinus malè, meo quidem iudicio, distinguit inter Polium montanum album & P. maritimum erectum Monspeliacum, cum una & eadem planta sint.

Polium montanum Lavendulæ folio *Park.* montanum I, seu Lavendulæ folio *C. B.* Pol. Lavendulæ folio, flore albo *Ger.* In montosis circa Basileam, Genevam & alibi.

N. Polium cum acre sit & amarum, urinam & menses ciet, venenatis moribus auxiliatur, Hydricos & ictericos juvat, secundum veteres. Theriacam & Mithridaticum ingreditur.

† Polygonatum *Lob. Ger.* latifolium vulgare *C. B.* Polyg. vulgò Sigillum Solomonis *f. B.* In Belgio, Germania, Gallia & Italia, in saxosis & ad sepes ubique. Hæc planta in Angliæ Australibus sponte provenit, v. *Cat. Ang.*

† Polygonatum floribus ex singularibus pediculis *f. B.* latifolium

folium 2 *Clus.* latifolium IV, flore majore odore *C.B.* majus flore majore *Park.* latifolium 2 *Clusii Ger.* In rupibus montis *Saleve.* Et hæc Angliæ indigena est. *V. Cat. Ang.*
Polygonatum minus Lob. Ger. angustifolium *Park. f. B.* angustifolium non ramosum *C.B.* In sylvis circa Spadam oppidulum acidulis celebre copiosissimè. Vidimus & in sylvosis montis *Salevæ.*

Polygonum montanum niveum Park. montanum *Ger.* minus candicans *C.B.* *Paronychia Hispanica Clusii* sive *Anthyllis nivea f. B. White Mountain-Knotgrass.* Circa Mesfanam copiosè.

Polygonum vel Linifolia per terram sparsa, flore *Scorpioidis f. B.* In Etruria non longè à Viterbo, cum Romam contenderemus, copiosam observavimus. *J. Bauhinus* extra scopum jaculatur, cum hanc refert ad *Millegranam* minimam *Lobelii*, à qua longè differt.

Polygonum bacciferum maritimum v. Tragos.

Portulaca sylvestris Lob. Ger. Park. sylv. minor sive spontanea *f. B.* angustifolia, sive sylvestris *C.B.* In Italia, Sicilia, Gallia Narbonensi & Germania, in vervactis & ad vias. Sativam ab hac culturæ tantum ratione differre existimo, quamvis in magnitudine omnium partium insignis sit differentia.

N. 1. In acetariis frequens usus est *Portulacæ*, stomachi ardorem lenit & bilis fervorem, & hinc in febribus putridis ac malignis, ardore urinæ, & *Scorbuto* prodest; venerem inhibet, venerisque insomnia. Dentium stuporem commanducata tollit, & mobiles dentes stabilis. Verminantibus pueris cum successu exhibetur. Verum esus ejus nimius cavendus est quoniam ob frigiditatem suam & humiditatem in ventriculo putrescere apta est, ejusque & viscerum reliquorum tonum dissolvere.

2. Solet apud nos condiri ad intinctus eodem modo quo *Cappares*, *Genistæ* flores, *Lingua avis*, &c. condiuntur.

Portulaca marina, v. Halimus.

Prunella angustifolia f. B. hyssopifolia C.B. Circa *Montspelium* variis in locis.

Prunella cæruleo flore C.B. magno flore purpureo *Park.* flore magno folio non laciniato *f. B.* Primò observavimus hanc *Moguntia*, postea circa *Genevam* & alibi.

Prunella laciniata flore magno purpureo f. B. *Prunella Lobelii Ger.* *Prun. laciniato folio Park.* Cum priore.

Pseudo-asphodelus quibusdam *f. B.* *Asphodelus Lancastriæ* verus *Ger. emac.* minimus *Norvegicus* luteus palustris *Scoticus* & *Lancastriensis Lob.* *Pseudo-asphodelus minor folio*

folio Iridis angustifoliae *Park.* Pseudo-asphodelus palustris Scoticus, & Pseudo-asphodelus Alpinus *C. B.* qui hos duos (ut mihi videtur) malè separat. Ad radices montis Salevæ in aquosis. Vidimus quoque nonnusquam in Germania.

Pseudo-melanthium glabrum. In Sicilia inter segetes propè castellum *Puzallu*, & in montibus Messanæ imminetibus. Simile est Pseudo-melanthio vulgari, diversum tamen, & ut puto, nondum descriptum.

Pseudo-stachys Alpina *C. B. Park.* In summis jugis montis Juræ.

Psyllium majus supinum *C. B. F. B.* majus semper virens *Park.* semper virens Lobelii *Ger.* Plinianum fortè, radice perenni, supinum *Lob.* Circa Monspelium & in Italia frequens.

Psyllium vulgare *Park.* majus erectum *C. B. F. B.* Psyllium sive Pulicaris herba *Ger.* Circa Monspelium in agris copiosè. Psyllium dicitur quia semina ejus pulicibus similia sunt.

N. Evacuat bilem flavam, mucilaginéque sua acrimoniam humorum obtundere aptum est. Hinc convenit maximopere in Dysenteria & corrosione intestinorum. Semen Psyllii hoc peculiare præ cæteris purgantibus habet, quod qualitate refrigerandi sit præditum. Verùm enīverò non tamen extra reprehensionem positum est, quam incurrit ratione vigilentia suæ. *Schrod.* Nimio usu stomachum offendit, & animi deliquium inducit.

Psarmica Imperati, v. Xeranthemum.

Pulegium angustifolium *Ger. C. B.* angustifolium sive cervinum *Lob. Park.* cervinum angustifolium *F. B.* Primò vidimus ad Rhodanum proximè pontem S. Spiritus dictum, deinde circa Monspelium in humidioribus.

Pulmonaria maculosa *Lob. Ger.* maculata *Park.* Symphytum maculosum, sive Pulmonaria latifolia *C. B.* Pulmonaria Italorum ad Buglossum accedens *F. B.* In sylvis propè Coloniam Agrippinam primò, postea in omnibus ferè montosis dumetis juxta Rhenum & propè Genevam in conspectum se nobis dedit.

Pulmonaria Gallorum v. Pilosella.

Pulsatilla alba *F. B. Park.* flore albo *C. B. Ger.* In summis Juræ montis jugis. Hæc non floris colore tantum, sed etiam totà specie distincta est à vulgari Pulsatilla, quam memini me alicubi vidisse flore albo.

Tunica malus sylvestris *C. B. Ger.* Punica sylvestris major, sive Balaustrum majus *Park.* Malus Punica *F. B. The Pome-*

Pomegranate-tree. In Gallia Narbonensi & Provincia passim.

N. Poma in genere censentur boni succi, ventriculo convenientia sed pauci nutrimenti.

Dulcia eorumque syrupus adhibentur in tussi chronica & pleuritide: in febribus minus commoda sunt, quia Ventriculo inflationes causant.

Acida frigida sunt & adstringentia, stomachica. Usus præcip. in febribus biliosis, in Gonorrhœa, pica gravidarum compescenda, orisque putredine corrigenda & sim.

Vinosa (acido-dulcia, *Granata mura*) mediæ sunt naturæ inter dulcia & acida, cardiaca ac cephalica. Usus præcip. in syncope, vertigine, &c. Ex malis hisce ad usus supradictos succus exprimitur & fermentatus depuratusque vinum dicitur.

Flores, tam *Balaustia* quam *Cytini*, ejusdem sunt naturæ, terrestres sc. valide adstringentis; unde creberrimus eorum usus esse solet in omnis generis fluxionibus v. g. diarrhœa, dysenteria, fluxu uterino, &c. in sanguine vulnere cohibendo, gingivarum laxitate emendanda, in hernia curanda, &c. Hæc omnia Schroderus.

Cortex (malicorium, psidium) ejusdem naturæ cum floribus est. Utilis etiam ad coria præparanda, & ad atramentum vice gallarum. Addit Constantinus, Malicorium vino decoctum ac potum omnes ventris tineas necare, maxime eas quas Ascaridas vocant.

Nuclei refrigerant itidem, astringuntque, imprimis qui ex pomis acidis collecti. *Schrod.* Breviter Flores, Cortex, nuclei, [adde & folia] ad ea conducunt quibuscunque adstrictione opus est.

Ex malis Punicis contusis cum suis corticibus exprimitur succus qui purgat bilem flavam, ut scribit Cæsalpinus.

Pyracantha Lob. *Clus.* Pyr. quibusdam *Æ. B.* *Oxyacantha* Theophrasti *Ger.* *Oxyacantha* Dioscoridis, sive Spina acida Pyri folio *C. B.* Circa Florentiam & alibi in Etruria copiosè.

Pyrola folio serrato *Æ. B.* folio mucronato serrato *C. B.* tenerior *Park.* 2 tenerior *Clusii Ger.* In montibus Genevæ vicinis, inque sylvis montosis non longe à Constantia versùs Scaphusiam.

N. In flore *Pyrolæ* vulgaris insignem observavi varietatem. In una enim planta inferior floris lacinia sive labellum magis propendet quam in altera: Stylus etiam

in una magis dependet & deorsum incurvatur quàm in altera. Fortè una infœcunda est, flores duntaxat proferens, illa nimirum cujus labellum & stylus propendent, cùm & caulis exuccus & evanidus videatur, altera fœcunda, cùm & caulis robustior sit & succulentior.

Q

Quinquefolium album majus caulescens *C.B.* verùm descriptio non bene convenit huic nostræ plantæ: Melius respondet figura J. Bauhini sub titulo Pentaphylli recti. Vidimus primò in Alpibus Carinthiacis, deinde in monte Salevæ, tandem ad exteriorem portam max. Carthusianorum cœnobii, ubiq; è rupium fissuris exiens.

Quinquefolium album majus alterum *C.B.* sylvaticum majus flore albo *Ger.* Pentaphyllon album *J.B.* majus alterum album *Park.* In Alpibus Stiriacis inter oppidulum S. Michaelis & *Knittelfeld.*

Quinquefolium minus repens luteum *C.B.* An Quinquefolium minus repens lanuginosum luteum *ejusdem?* Pentaphyllum incanum *Ger.* repens minus *Park.* Pentaphyllon parvum hirsutum *J.B.* In Episcopatu Tridentino & Helvetia, itémq; circa Genevam *en plain palais.* Martio & Aprili florēt, unde à *Schwenckfeldio* rectè denominatur, Quinquefolium vernum minus.

Quinquefolium minus repens Alpinum aureum *C.B.* minus flore aureo *Ger. emac.* Alpinum splendens flore aureo *J.B.* Pentaphyllum incanum repens Alpinum *Park.* In montis Juræ summo vertice *La Dole* dicto.

Quinquefolium rectum luteum minus. An Quinquefolium montanum erectum hirsutum luteum *C.B.*? Pentaphyllum montanum erectum *Park.*? In sylva *Valna* prope montem *Lupi.* Folia longis insident pediculis & circumcirca dentata sũnt, denticulis majoribus, non admodum hirsuta. Caules ex eadem radice plures exeunt, dodrantales, qui in summitatibus suis numerosos gestant flores.

Quinquefolium Alpinum argenteum album. In altiss. montibus max. Carthusianorum cœnobio proximis. Per simile est Trifolio Alpino argenteo *Pona.*

Quinquefolium fragiferum *C.B.* Pentaphyllum fragiferum *Ger. Park.* Pentaphylloides erectum *J.B.* In monte Salevæ prope arcem antiquam jam fere collapsam.

Quinque-

Quinquefolio fragifero affinis *C.B.* Pentaphyllum supinum
 Potentillæ facie *Ger. Park.* Pentaphylloides supinum
J.B. In Germania prope Rhenum, infra Mogun-
 tiam.

R

R Adix cava v. *Fumaria bulbosa.*
Rapistrum monospermon J.B. C.B. Park. In Italia
 non longè à Liburno, circa Genevam etiam & Mon-
 spelum.

Rapunculus spicatus C.B. Spicatus sive comosus albus &
 cæruleus *J.B.* Spicatus alopecaroides *Park.* Rapuntium
 majus *Ger.* Primò eum observavimus circa Spadam Epi-
 scopatus Leodiensis urbiculum acidulis celebrem, in
 montosis; postea in collibus Genevæ vicinis, ut *Lz*
Bastie, &c.

Rapunculi genus folio serrato rotundiore *J.B.* In monte
 Jura. Hæc planta an ab aliis descripta sit necne non-
 dum comperimus.

Ranunculus albus simplici flore J.B. Alpinus albus *Ger.*
 montanus albus minor simplex *Park.* mont. Aconiti fo-
 lio, flore albo minore *C.B.* In Jura & Saleva monti-
 bus copiosè. Maio floret.

Ranunculus montanus albus hirsutus J.B. montanus Pen-
 nzi *Park.* mont. hirsutus purpureus *Ger. emac.* montanus
 VI, sive montanus hirsutus purpurascente flore *C.B.* In
 sylvis Juræ montis prope verticem *Thuri.*

Ranunculus tenuifolius montanus luteus J.B. In montis
 Juræ præalta parte *Thuri* J. Bauhino & nobis etiam in-
 ventus.

Ranunculus montanus lanuginosus foliis Ranunculi pratensis
repentis C.B. Park. Ran. magnus valde hirsutus, flore
 luteo *J.B.* cujus descriptio quæ desumpta est è Phyto-
 pinæ *C.B.* nostro Ranunculo (quem in Saleva copio-
 sum invenimus) adamussim respondet.

Ranunculus v. Aconitum.

Reseda alba J.B. maxima *Ger.* C. Bauhini (quem sequi-
 tur Parkinsonus) mentem non capio; nam Resedam suam
 majorem cum floribus luteis describit. In Italia satis
 frequens.

Resedæ affinis v. Phyteuma.

Rhamnus 1. *Clusii* flore albo *Ger.* secundus *Monspeliensis* five primus *Clusii Park.* cujus figura plantæ huic non respondet. *Rham.* spinis oblongis, flore candicante *C.B.* *Rh.* cortice albo *Monspeliensis* *J.B.* Circa Florentiam & *Monspelim.*

Rhamnus folio subrotundo v. *Paliurus.*

Rhododendron v. *Oleander.*

Rhus folio *Ulmi C.B.* coriaria *Dod. Ger.* obsoniorum *Lob. Clus.* *Sumach*, five *Rhus* obsoniorum & coriariorum *Park.* *Rhus* five *Sumach* *J.B.* In collibus circa *Monspelim* prope *Castelneuf, aux Garigues, &c.*

N. 1. In agro *Salmanticensi* (referente *Clusio*) quæstus gratiâ diligenter colitur. Caduntur singulis annis enati surculi cubitales ad radicem usq; deinde desiccantur, in pollinem rediguntur, & ad coria densanda adhibentur.

2. Semen & folia refrigerant & astringunt, unde fluxum quemcunq; alvi, uteri, mensiumve, hæmorrhoidum compescunt, vomitum sistunt, bilem obtundunt, seu intus in iusculis & sorbitionibus sumpta, five extus adhibita. Dentes denigrant; putredini & Gangræne resistunt. Gummi dentibus inditum odontalgiam sedat. *Schröd.*

Rhus myrtifolia *Monspeliaca C.B.* myrtifolia *Ger.* *Plinii* putata *J.B.* *Plinii* myrtifolia *Park.* Circa *Monspelim* copiose, præcipue ad ripas *Ladi* amnis. Ad coria firmanda cunctæ *Narbonæ* notissimam & usitatissimam dicit *Lobelius.*

Ricinus major vulgaris *J.B. C.B.* *Ricinus* five *Palma Christi Ger.* *Ricinus* five *Cataputia* major vulgatio *Park.* Circa *Messanam* *Siciliæ* & *Rhegium* *Calabriæ* in sepibus frequens, ubi in fruticem satis grandem, *Sambuci æmulum* adolescit, & multos annos durat. Semen *Ricino* insecto simile, unde plantæ nomen.

N. Semen seu nuclei potenter bilem & pituitam ævo ætate pellunt, verum ob vehementiam rarissimi usûs sunt. Ex semine oleum exprimitur ad multa utile, v.g. tumores & flatus præsertim ventris, coli & ilei dolores, artus contractos, duritiem alvi & ventris tineas in pueris, tumores & duritias mammarum, si partes eo illinantur, & duæ aut tres guttulæ in lacte aut pingui aliquo jure sumantur. Oleum hoc ficus infernalis oleum vocant. Hæc ferè *Monardes* & *Clusius.*

Rosa rubello flore parvo, simplici non spinosa *J.B.* sylv. minor rubello flore *C.B.* In montibus circa *Genevæ.*

Rosa

Rosa sylvestris rubella parvo frutice *ℑ. B.* In collibus propè Genevam, v. g. *la Bastie, Champe, &c.*

Rosmarinus coronarius fruticosus ℑ. B. Spontaneus latiore folio *C. B.* *Rosmarinus coronarius Ger.* Libanotis coronaria, sive *Rosmarinum vulgare Park.* In Italia & Gallia Narbonensi in collibus saxosis propè mare affatim.

N. In ulu sunt folia, flores (Anthos officinis dicti) semen. Cephalica sunt è præcipuis ut & uterina. Usus præcip. in affectibus capitis ac nervorum, Apoplexia, Epilepsia, Paralysis, Vertigine, Caro, &c. visum acuiunt, foetorem halitus emendant; Epatis, Lienis ac Uteri obstructions resolvunt, ictero ac fluori albo mulierum medentur, corque confortant. Herba ipsa suffitu & vapore suo pestis tempore aerem emendat & salubrem reddit.

Rubia angustifolia spicata Park. C. B. Circa Monspelium plurimis in locis, v. g. collibus juxta *Castelneuf*: Agris Gramontæ sylvæ vicinis, &c.

Rubia marina Ger. Park. marina Narbonensium ℑ. B. maritima C. B. Ad Mare Mediterraneum, in litoribus arenosis propè Syracusas; Cataniam, Terracinam, Monspelium collegimus.

† *Rubia erecta quadrifolia ℑ. B.* In pascuis quibusdam propè Genevam trans Rhodanum fluvium. Hanc non ita pridem in Westmorlandia Angliæ Provincia inventi.

Rubia lævis Taurinensium Park. *Rubia cruciata lævis Ger. quadrifolia, vel latifolia lævis C. B. quadrifolia Italica hirsuta ℑ. B.* In Italia à *D. F. Willughby* inventa.

Rubia echinata Saxatilis v. Cruciatæ minima.

Rubia sylvatica lævis v. Mollugo.

Ruta capraria v. Galega.

Ruta canina v. Scrophularia.

Ruta pratensis v. Thalictrum.

Ruta sylvestris Lob. sylv. major C. B. ℑ. B. Park. sylv. montana Ger. In collibus petrosis circa Monspelium & Nemausum. In Etruria non longè ab oppido Massa eam vidimus sponte natam.

Ruta sylvestris minor C. B. ℑ. B. Park. sylv. minima Ger. Peganium Narbonensium Lob. In agris sterilibus non circa Monspelium tantum sed per totam Narbonensem Galliam.

N. *Ruta Alexipharmaca* est, cephalica ac nervina. Usus præcip. in peste aliisque affectibus malignis præservandis ac curandis (unde & *Theriaca pauperum* nonnullis

dicatur) visu acuendo, lasciviâ reprimendâ (Ruta facit castum. *Schol. Salern.*) pleuritide curanda, imbecillitate ventriculi corrigenda, colicâ discutiendâ, morsu canis rabidi debellando. *Schrod.* qui plura habet de usu ejus extrinseco, quem adi ut & Parkinsonum. Summatim Internè sumpta ad tria præcipuè celebratur, viz. 1. pestem præservandam aut arcendam; 2. oculorum caliginem discutiendam, & acuendum visum, 3. appetitus venereos cohibendos.

S

SAbina baccifera v. Cedrus Lycia.

Salix Alpina latifolia pumila glabra, An Salix pumila latifolia prior *Clus.*? An Salix pumila folio utrinque glabro *Æ. B.*? In supremis jugis montis Juræ propè Genevam.

*Salvia fruticosa lutea v. Verbascum IV *Matth.*

Sambucus racemosa rubra *C. B. Park.* racemosa acinis rubris *Æ. B.* racemosa vel cervina *Ger.* In Alpibus Carinthiacis, & in sylvis propè max. Carthusianorum cœnobium.

N. Cervum Sambucum racemosam sicut & Solanum lethale magno desiderio inquirere didici. Ubi namque locorum eas stirpes provenire intellexit eò se confert. Quòdque mirari subit, solent binæ hæ stirpes plerunque eodem sitis occupare. Hisce cervus unicè delectatur, folia utriusque non baccas decerpens, &c. Præterea (quod non minùs admiratione dignum est) observavi cervum solum foliis harum plantarum vesci, non autem cervam, nisi ea prægnans fuerit & cervum in utero gestaverit, tum enim, &c. *Trag. lib. 3. cap. 24.* Sanè vix fidem apud me obtinent quæ hoc in loco *Tragus* scripsit, quamvis se experienciâ doctum assermet.

Sanamunda prima *Clusii v. Tarton-raire.*

Sanamunda tertia *Clusii Ger. Park.* Sesamoides parvum Dalechampii, Sanamunda 3 *Clusii Æ. B.* Thymelæa tomentosa foliis Sedi minoris *C. B.* In insula ad Promont. Pachynum.

Sanicula guttata *Ger. Park.* Alpina guttata *Æ. B.* montana rotundifolia major *C. B.* In Alpibus Helveticis; irem in montibus Jurâ & Salevâ.

Sanicula scæmina *Matth. v. Astrantia nigra.*

Sapo-

Saponaria minor quibusdam *J. B.* *Ocymoides repens Park.* repens montanum *C. B.* *Lychnis montana repens Ger.* In colle *la Bassie* propè Genevam, inque Etruria non procul à Massa, viâ quâ indè Lucam itur.

Satureia hortensis Ger. vulgaris *Park.* durior *J. B.* montana *C. B.* In Gallia Narbonensi circa Monspelium, Nemausum, &c. in collibus. Invenimus etiam in Etruria in alveo cujusdam torrentis propè Radico-fanum.

Satureia æstiva hortensis Ger. hortensis *Park.* sativa *J. B.* hortensis, sive *Cunila sativa Plinii C. B.* In agris circa *Castelneuf*, non longè à Monspelio copiosè.

Satureia S. Juliani Ger. spicata *C. B.* spicata *S. Juliani Park.* foliis tenuibus, sive tenuifolia, *S. Juliani* quorundam *J. B.* In collibus Messanensis agri, non minùs frequens quàm in ipso monte *S. Juliani*. Vidimus & in ipsis urbis Florentiæ muris.

N. 1. Saporis & odoris est acris & calidi. Usus in affectibus *ventriculi*, cruditate, anorexia, &c. *pectoris*, asthma; *uteri*, mensibus obstructis; visum acuit. Extrinsecus discutit tumores, dolorem ischiadicum lenit; ejusque succus cum tantillo olei ros. auribus instillatus tinnitum & surditatem aufert.

2. Germanis in usu est ad Brassicas capitatas condendas, quæ sit, ut illæ jucundissimum odorem & saporem gratissimum acquirant; quin & fabis, aliisque leguminibus incoqui solet, ad eorum flatuositatem corrigendam. *J. B. Schrod.*

Saxifragia Venetorum Ad. *Daucus selinoides major Park.* montanus *Aprii folio major C. B.* *Libanotis altera quorundam*, aliis dicta *Cervaria nigra J. B.* *Lib. Theophrasti nigra Ger.* In pascuis montosis & vineis juxta Rhenum in Germania, & in collibus Genevæ vicinis copiosè.

Scabiosa montana max. Park. Ger. Alpina foliis *Centaurii majoris C. B.* Alpina maxima *Ad.* In ascensu montis Juræ non longè ab altissimo vertice *Thuri*.

Scabiosa argentea angustifolia Park. C. B. graminea argentea *J. B.* In planis Fori Julii depressis, quæ aquæ ex Alpis ubertim delabentes hyberno tempore aliquoties latè inundant; alveos torrentum dicere posses nisi latitudo obstaret.

Scabiosa latifolia rubro flore J. B. montana *V.* sive latifolia rubra non laciniata secunda *C. B.* rubra *Austriaca Ger. emac.* In montibus Genevæ proximis, inque Germanicis montosis sylvis passim luxuriat.

Scabiosa Pannonica flore albo *Park.* montana calidarum regionum major *Lobelio* *f. B.* montana alba *Ger.* pratensis & arvensis *V.*, sive fruticans angustifolia alba *C. B.* In collibus saxosis agri Narbonensis perquam familiaris. Ab hac non multum differt *Scabiosa glabra foliis rigidis viridibus*, ut ipsemet *Lobelius* fatetur.

Scabiosa multifido folio, flore albo vel potius *αρχελευκω* *f. B.* multifido folio, flore flavescente *C. B.* flo. pallido *Ger. emac.* Pannonica flore albo quoad figuram *Park.* Circa Viennam Austriæ ad sepes & in pascuis. Simillima est superiori, ideoque non immerito ejus icone pro priore usus est *Parkinsonus*.

Scabiosa 10, sive repens *Clusii* *f. B.* minima *Bellidis* folio *Ger.* *Scab. Globulariæ Bellidis* foliis *Park.* *Bellis* cærulea *IV*, sive montana frutescens *C. B.* quem justè reprehendit *Parkinsonus*, quòd eam frutescere dicat. Ad radices montis Salevæ copiosè.

Scammonea Monspeliaca dicta *Park.* *Monspel.* flore parvo *C. B.* *Monspeliaca* foliis rotundioribus *C. B.* *Monspeliensis* *Ger.* Ad mare propè *Monspelim*.

Scammoneæ Monspeliacæ affinis *Park.* *Scam.* *Monspeliacæ* affinis foliis acutioribus *C. B.* *Apocynum latifolium* amplexicaule *f. B.* cur a. latifolium appellat? Juxta *Cataniam* *Siciliæ* urbem.

Scolymus Theophrasti *Park.* v. *Cinara sylvestris*.

Scorpioides Bupleuri folio *Ger.* *C. B.* *Scor.* siliquâ campepoide hispidâ *f. B.* *Scorp.* *Bupleuri* folio minor pluribus corniculis asperis *Park.* quamvis ille hanc à nemine ante se editam gloriatur. *Messanæ* in collibus, & *Monspeli* in fossis & aggeribus ipsius arcis.

Scorpioides Telephium Anguillaræ *Lob.* *Scorpioides Matthioli* *Ger.* *Scorp.* *Matthioli*, sive *Portulacæ* folio *Park.* *Telephium* *Scorpioides* *f. B.* *Telephium Dioscoridis*, seu *Scorpioides* ob siliquarum similitudinem *C. B.* Circa *Liburnum*, *Messanam*, *Monspelim*, &c.

Scorpioides leguminosa v. *Ornithopodio* similis.

Scorpioides leguminosa altera *f. B.* In vineis & hortis ad latera montium *Messanæ* imminentium. Hanc plantam à nullo alio scriptore proditam censemus.

Scrophularia Ruta canina dicta *Park.* *Scroph.* *Ruta canina* dicta, vulgaris *C. B.* *Ruta canina* *Lob.* *Ger.* *Scroph.* 3 *Dodonæi* tenuifolia, *Ruta canina* quibusdam vocata *f. B.* Ad *Rheni* ripas propè *Basileam* primò, deinde in *Italia*, *Gallia Narbonensi*, & circa *Genevam* observavimus.

Scrophularia folio Urticæ *C. B.* peregrina *Park.* flore rubro

bro Camerarii *f. B.* Circa Pisas copiose in muris ipsius urbis, & alibi in Italia.

Scutellaria *f. B. v.* Opuntia marina.

Securidaca minor *Lob.* minor lutea *Ger.* altera five minor *f. B.* lutea minor cotniculis recurvis *C. B.* Hedyfarum minus *Park.* In collibus circa Messanam.

Securidaca major articulata *Park.* dumetorum major flore vario, siliquis articulatis *C. B.* Melilotus ; Tragi *f. B.* Ad agrorum margines in Germania passim.

Securidacæ genus triphyllon *f. B.* An Fœnugræcum sylv. alterum polyceration *C. B.* ? Fœnum Græcum sylvestre *Ger. Park.* In collibus propè *Castelneuf* cis Ladum Monspeliacum ænnem;

Securidaca siliquis planis dentatis *Ger.* siliquis planis utrinque dentatis *C. B.* peregrina Clusii *Park.* Lunaria radiata Robini *f. B.* In lingua illa procurrente inter Portum Zanchæum & fretum Siculum, & alibi circa Messanam.

Sedum majus vulgare *C. B. f. B. Park.* Sempervivum majus *Ger.* In summis Jugis montis Juræ, inque Alpibus Sabaudicis & Helveticis, &c.

Sedum minus luteum ramulis reflexis *C. B.* minus luteum, flore se circumflectente *f. B.* Aizoon Scorpioides *Ger.* Vermicularis Scorpioides *Park.*

Sedum ferratum *f. B.* Cotyledon media foliis oblongis serratis *C. B.* Umbilicus Veneris minor *Ger.* In montibus Tyrolensibus & Helveticis, itémque in Jura & Saleva Genevæ vicinis.

Sedum ferratum alterum foliis longis angustis. An Sedum Pyrenæum ferratum longifolium *Hort. Blas* ? A priori differt longitudine & angustia foliorum. Invenimus in Alpibus non longè à *Ponticba*: vidimus postea in horto Regio Parisiensi.

Sedum Alpinum minimum foliis cinereis, flore candido *f. B.* Saxatile & Alpinum II, five album foliolis compactis *C. B.* minimum Alpinum Muscoides *Park.* In montibus non longè à Bolzano Martio mense floruit.

Sedum Alpinum 4 Clusii *Ger. emac.* minimum Alpinum villosum *Park.* Alpin III, five hirsutum lacteo flore *C. B.* Chamæiasme Alpina *f. B.* in *Append. tom. 3.* In altissimo cacumine montis Juræ *la Dole* dicto. Flos candidus ætate rubescit, dum receptus odoratissimus est Jasmini instar.

Sedum parvum folio circinato, flore albo *f. B.* minus folio circinato *C. B.* Vermicularis dasphylllos *Park.* Circa Monspelium, Genevam, &c. in muris & rupibus copiosè.

Sedum

Sedum echinatum vel *stellatum* flore albo *J.B.* In muscosis sepium aggeribus non longè à Geneva, secus viam quæ indè ad oppidum *Fay* ducit. *Messianæ* quoq; similibus in locis invenimus. Descriptio *J. Bauhini* plantæ huic nostræ per omnia exactè non congruit.

Sedum echinatum flore luteo *J.B.* Circa *Portum Veneris* & alibi in Italia. Planta hæc & proximè antecedens à *F. Columna* describuntur. Nostra a. ab illius nonnihil diversa videtur; folia enim habet ad *Alfinem* accedentia & ut memini nonnihil crenata.

Sedum Alpinum hirsutum luteum *C.B.* petraeum *Ger.* petraeum montanum luteum *Park.* *Phyllon thelygonon* *Dalechampio J.B.* In monte *Saleva* *Genevæ* vicino.

Sedum montanum filiquosum flore albo, an *Hesperidis* *Alpinæ* specis? In suprema parte montis *Salevæ* ad aquarum scaturigines.

Sedum montanum minimum non acre flore purpurascente parvo. In altissimis rupibus *Juræ* montis.

Sedum minimum non acre totum rubrum flore hexaphyllo purpureo. *Catanæ* in muris & tectis copiosè.

Sedum medium flore albo staminibus luteos apices gestantibus. In muris quibusdam prope *Messanam* *Siciliæ*.

Sempervivum v. Sedum.

Senecio folio non laciniato *J.B.* folio non laciniato *Myconi Park.* VI, sive folio non laciniato *C.B.* In sabulosis inter oppidum *Rot* & *Norimbergam* *Germaniæ* urbem. Eundem etiam *Messianæ* in ascensu montium observavi.

Sertolaria Imperati v. Opuntia marina.

Seseli Æthiopicum *Salicis* folio *C.B.* *Sesl. Æthiopicum* frutex *Park. Ger.* *Sesl. Æthiopicum* fruticosum folio *Periclymeni J.B.* In rupibus oppido *S. Chamas* in Galloprovincia vicinis: Aiunt & circa *Monspelim* sponte provenire; verum nos ibi non vidimus.

Seseli Creticum minus *v. Caucalis* minor pulchro semine. *Massiliensium v. Foeniculum* tortuosum.

Officinarum v. Siler montanum.

Sideritis Monspessulana J.B. *Scordioides Ger.* *Monspeliensis Scordioides Lob.* *Monspeliensis Lobelii Park.* foliis hirsutis profundè crenatis *C.B.* *Monspeli* circa patibulum copiosè, & alibi aux *Garigues*.

Sideritis vulgaris Ger. vulgaris *Clusii Park.* vulgaris hirsuta *J.B.* hirsuta IV, sive vulgaris hirsuta erecta *C.B.* Per *Germaniam*, *Italiam* & *Galliam* in agrorum marginibus vulgarissima.

Sideritis

Sideritis genus verticillis spinosis *℥.B.* In Italia & Gallia Narbonensi prope Monspelium in agris. Icon *Sideritidis* procumbentis non ramosæ *Clus.* huic non dissimilis est.

Sideritis Valerandi Dourez brevi spicâ *℥.B.* Alpina hyssopifolia *Ger. C.B.* montana hyssopifolia *Park.* In monte *Tbuiri.* Attendantur figura & descriptio *℥.B.* Nam aliorum neque figuræ, neque descriptiones per omnia quadrant.

Sideritis pratensis lutea *v.* *Euphrasia* pratensis lutea.

Sigillum Solomonis *v.* *Polygonatum.*

Siler montanum *Officinarum Lob. Ger.* Sefeli sive *Siler* montanum vulgare *℥.B.* *Siler* montanum, vulgò *Siseli* *Park.* Ligusticum, quod *Sefeli* officinarum *C.B.* In Jura & *Salève* montibus prope Genevam, inq; Alpibus *Ponticæ* vicinis.

Silica arbor sive *Ceratia ℥.B.* *Sil. edulis C.B.* *Sil. dulcis* sive vulgatio *Park.* *Ceratia* *Silica* sive *Ceratonia Ger.* In Sicilia non longè à *Puzallu* oppido, & sponte & copiosè provenit. *Officinis Caroba* dicitur hæc arbor, Germanis & Belgis *Panis S. Johannis.*

N. *Silicarum* (ut rectè Plinius) cortex ipse manditur, estque dulci & melleo sapore, per siccitatem intellige, nobis tamen nonnihil nauseosus & ventriculo ingratus. *Miror a.* Veteres scripsisse quòd astringat & ventrem sistat, cum nobis (quotquot de eo comederimus cum essemus Venetiis) alvum solvit non secus ac *Cassia.* Non tamen negaverim posse eos qui huic fructui assueverunt eo innoxie vesci.

Sinapi Genevense sylvestre *℥.B.* In alveo fluvii *Arve* prope Genevam copiosè. Hæc planta an ab alio ququam descripta sit nescio.

Sinapi echinatum *v.* *Eruca* echinata.

Smilax aspera *Lob. Ger. ℥.B.* aspera fructu rubente *C.B.* aspera fructu rub. *Park.* In Sicilia, Italia & Gallia Narbonensi in sepibus passim.

N. *Succedaneum* est *Sarlaparillæ* in curanda lue Venerea, inque articulorum & nervorum doloribus; noxios humores per sudorem & transpirationem evacuat, cutis vitia expurgat. Datur vel in pulverem redacta vel in aqua aliòve liquore decocta.

Smyrnum Lob. Creticum Ger. Park. *Creticum* perfoliatum *℥.B.* peregrinum rotundo folio *C.B.* In Sicilia circa *Punto Cerciolo.*

Solidago Saracenica *Dod. Lob.* *Saracenica* vera *Salicis folio Park.* *Virga aurea angustifolia ferrata C.B.* aurea angustifolia

angustifolia serrata; sive Solidago Saracenica *J.B.* In foliis prope Argentoratum, inque summis jugis montis Juræ ad scaturigines aquarum.

N. Vulneraria insignis censetur, nec Saniculæ aut Bugulæ inferior, usu interno & externo adhiberi apta.

Solanum halicacabum *v.* Alkekengi.

Solanum vulgare sive Officinarum acinis luteis. Circa Florentiam in Italia, & Monspelium in Gallia Narbonensi in vineis. Hanc baccarum differentiam Matthiolum etiam olim observavit.

Sonchus lanatus Dalechampii *J.B.* villosus luteus major *C.B. Park.* Circa Messanam & Monspelium.

Sonchus cæruleus latifolius *J.B.* montanus I, i.e. lævis laciniatus cæruleus sive Alpinus cæruleus *C.B.* Alpinus cæruleus *Park.* In monte Jura, inq; montibus max. Carthusianorum cœnobio imminentibus.

Sonchis affinis Terra-crepola *J.B.* Sonchus lævis angustifolius *C.B. Ger. emac. Park.* Herba quæ nobis Monspelii pro Terra-crepola ostensa fuit, similior erat figuræ istius plantæ quam J. Bauhinus Chondrillis affinem aliquam laciniatam an *Trinciattellam* nuncupat. Icones Terra-crepola apud Lobelium, Gerardum & Parkinsonum ei bene respondent. Apud Monspelienfes in acetariis frequens hujus usus est.

Soldanella Alpina quibusdam *J.B.* Alpina major & minor *Park. Ger. emac. III.* sive Alpina rotundifolia *C.B.* In monte Jura & Alpibus Sabaudicis copiose.

Sorbus *J.B. Ger. domestica Lob. legitima Park. sativa C.B.* In montibus supra Messanam spontaneam vidimus. In alsiosis montibus ad Rhenum, neq; non sylvis Mediomaticum ad fluvios Sarum & Blisam dictos admodum familiaris, autore Trago. Nos Viennæ Austriæ Sorba fructum antea nobis incognitum in foro primum venalem vidimus.

N. Sorba sed præcipue immatura valde astringunt, unde fluxui cujuscunq; generis conveniunt, & vomitum etiam sistunt. Pueris quibus ob dentitionem alvus fluit commodè exhibentur.

Sorghum *v.* Melica.

Speculum Veneris *Ger. majus Park.* Avicularia Sylvi quibusdam *J.B.* Onobrychis arvensis, sive Campanula arvensis erecta *C.B.* In Germania, Italia & Gallia Narbonensi inter segetes passim.

Spartum max. maritimum Hollandicum spicâ lecalinâ. In arenosis ad vicum *Schevelingam*, uno ab Haga Comitum milliari.

Spartium

Spartium arborescens v. *Genista Hispanica*.

Staphylodendron *J.B.* *Nux vesicaria* *Ger. Park.* *Pistacia* 3
sive *sylvestris* *C.B.* *The Bladder-nut Tree.* In clivis ma-
ritimis Regni Neapolitani prope Salernum.

Stella leguminosa v. *Glauz peregrina annua.*

Stœbe Salamantica prima *Clusii Park.* *Salmanticensis* prior
Clusio, sive *Jacea iatybacea* *J.B.* *argentea major* *Ger.*
major foliis Cichoraceis, mollibus lanuginosis *C.B.* Cir-
ca *Monspelim* passim, nec minùs frequens in *Sicilia* &
Italia.

Stœbe calyculis argenteis *C.B.* *argentea minor* *Ger.* *Sala-*
mantica argentea sive *tertia Clusii Park.* *Scabiosa*
squammata argentea *J.B.* In *Italia* prope *Tropiam*
Calabriz urbeculam.

Stœbe major calyculis non splendentibus *C.B.* *Austriaca*
elatio *Park.* *Centaurii majoris species tenuifolia* *J.B.*
In *Germania, Italia* & *Gallia Narbonensi* frequens.

Stœchas citrina Germanica latiore folio *J.B.* *Elichryson*
sive *Stœchas citrina latifolia* *C.B.* *Amarantus luteus la-*
tifolius *Ger.* In sterilioribus prope *Rhenum* supra *Colo-*
niam Agrippinam plurima.

N. Hujus flores vino decocti & poti lumbricos ventris
tris expellunt, quod ego experientia verum esse didici.
Trag.

Stœchas citrina tenuifolia Narbonensis *J.B.* *Elichrysum*
sive *Stœchas citrina angustifolia* *C.B.* *Stœchas citrina*
sive *Amarantus luteus* *Ger.* *Chrysocome* sive *coma aurea*
& *Stœchas citrina vulgaris* *Park.* Circa *Monspelim*
& alibi in *Gallia Narbonensi* vulgatissima.

Stœchas citrina altera tenuifolia sive Italica *J.B.* *Eli-*
chrysum foliis oblongis, Stœchadi citrinæ similis *Dod.*
In montibus *Liguriz* non procul *Gavia* oppido, & alibi
in *Italia.*

Stœchadi citrinæ affinis, capitulis parvis, raris, squamo-
sis, in pappos evanescentibus *J.B.* *Elichryson sylv. an-*
gustifolium capitulis conglobatis *C.B.* *Stœchas citrina*
altera odora *Park.* In saxis & rupium fissuris circa
Monspelim variis in locis.

Stœchas citrina altera odora *Park.* v. *Chrysocome.*

Stœchas sive *Spica hortulana* *Ger.* *vulgaris* *Park.* *purpurea*
C.B. *St. Arabica vulgò dicta* *J.B.* In *sylva Grammon-*
& alibi circa *Monspelim*, itémq; medio circiter itinere
inter *Monspelim* & *Arelaten.*

N. 1. *Stœchas Arabica* præcipui usûs est in affectibus
capitis ac nervorum, sc. in vertigine, Apoplexia, Para-
lysi ac Lethargo: in morbis pectoris idem præstat quod
Hysopus

Hyssopus. Insuper urinam & menses ciet, venenis resistit, affectibus hypochondriacis succurrit. Extrinsecus in lotionibus capitis, suffitu, &c. *Schrod.*

2. *Stœchadis citrinæ* flores diuretici sunt & vulnerarii; usus præcip. in obstructione urinæ, epatis, lienis, mensium; coagulatum sanguinem resolvunt, catarrhos exiccant, menses nimios sistunt, lumbricos fugant: Commendantur & inprimis ad exiccandas defluxiones acres pulmonum, &c. Extrinsecus faciunt ad emolliendam uteri duritiem (in balneo) lentes abigunt (in lixivio) capitis defluxiones siccant & discutiant (suffitu.) *Schrod.*

Styrax arbor *Ger. ꝯ B.* St. arbor vulgaris *Park.* *Styrax* folio mali cotonei *C.B.* Circa Tusculum in sepibus & sylvis copiosè: ubi & *Casalpinus* eam observavit.

N. *Styrax cephalicus* inprimis est & nervinus; medetur tussi, catarrhis, raucedini, gravedini; vulvæ præclusæ duritiæ laboranti extra & intra datus convenit. Immiscetur cardiacis & lætificantibus; alvum leniter mollit si cum *Terebinthinâ* in forma Catapotii assumatur. Miscetur utiliter malagmatis discutientibus & acopis. *Schrod. è Diosc.*

Suber latifolium *ꝯ B. Ger. Park.* II, sive latifolium perpetuò virens *C.B.* *The broad-leaved Cork-tree.* *D. Willughby* hanc arborem observavit itinere à Neapoli ad Romam.

N. 1. Cortex tritus ex aqua calida potus sanguinis fluxum sistit. Eiusdem cinis ad idem valet. Usus ejus est ad anchoralia navium, piscantium tragulas, cadorum obturamenta, scœminarum calceatum hybernium, alvearia, &c.

2. Detrahendis corticibus hæc est ratio. Quæ stipes telluri committitur, circumscinditur ad lignosam usq; materiam, pariterq; in summis humeris antequam in brachia dividat sese: mox à summo ad imum finditur detrahiturq; cortex. Non explanantur aqua sed igni, nec demuntur cortices nisi tertio mox anno. Quod si paucis diebus à tonsura largi imbres supervenerint, arbor interit: quod raro evenit nimirum regione calida & sicca, & temporum observatione raro fallente. *Clus. è Quinquerano.*

Sumach v. Rhus.

Symphytum maculosum v. Pulmonaria maculosa.

Sysyrynchium majus *Ger. Clus. Park.* majus flore luteâ maculâ notato *C.B.* Iridi bulbosæ affinis *Sysyrynchium majus* *ꝯ B.* In lingua illa quæ Portum Messanensem à Freto Siculo dividit, & in insula ad Prom. Pachynum, utrobique copiosè.

Tamarix

T

T Amarix v. Myrica.

Tanacetum inodorum *Park.* non odorum *Ger.* montanum inodorum minore flore *C. B.* album *J. B.* In colle *la Bassie* propè Genevam & ad Rhodani ripas.

N. Hæc planta florem habet radiatum Bellidis majoris æmulum, ideòque cum nec odorem Tanaceti habeat, rectius ad Bellides refertur, & Bellis leucanthemos Tanaceti folio à D. Morrifono denominatur.

Tarton-raire Gallo-provinciæ *Lob. Ger.* Massiliensium *Park.* Massil. Sanamunda i Clusii *J. B.* Thymelæa foliis candicantibus, Serici instar mollibus *C. B.* In rupibus maritimis non longè à Salerno.

Telephium Scorpioides *J. B. v.* Scorpioides.

Terræ glandes v. Chamæbalanus leguminosa.

Terebinthus *Ger. J. B.* vulgaris *C. B.* angustiore folio vulgarior *Park.* Circa Monspelim : invenimus eam & in Etruria.

N. 1. Terebinthi folia, fructus, cortex (tradente Dioscoride) quæ pollent adstringendi vi, ad eadem ad quæ Lentiscus conveniunt. Ejus fructus esculentus est, at stomacho noxius, urinam verò ciet & excalescit. Est & ad excitandam venerem aptissimus : ex vino verò potus contra Phalangiorum morsus prodest.

2. Species sunt Gallæ, magnitudine Avellanæ, intus cavæ, provenientes ex excrescentiis foliorum Terebinthorum masculorum. Has colligunt Rustici Thraciæ & Macedoniæ, ac carè vendunt ad tingenda serica subtilia diversis coloribus in urbe *Bource*. Colligunt a. vere quo tempore nisi colligerentur, in longitudinem semipedalem excrescerent ad formam cornu, *Bellon.*

3. Quæ pro Resina terebinthina in officinis habetur vel Laricis resina est vel abietis, nam vera terebinthina ad nos hodie non adfertur, Botanicorum unanimi sententiâ. Resinæ autem vires & usus vide sub Pinu.

Teucrium *C. B.* majus vulgare *Park.* latifolium *Ger.* Teucrium multis *J. B.* In Sicilia & Italia perquam familiare.

Teucrium

Teucrium Baticum Ger. Baticum & Creticum Clusii *f. B.*
Teucrium Creticum & Teucrium Baticum Park. nam pu-
 tamus hæc duo non differre specie. *Teucr.* peregrinum
 folio sinuoso *C. B.* & *Teucrium Creticum* incanum *C. B.*
 Propè Syracusas, in insula ad Promont. Pachynum, circa
Puzallu, & alibi in Sicilia. Invenit *D. Willughby* in iti-
 nere à Neapoli ad Romam.

N. Ut facie sic viribus cum *Chamædry* convenit.
 Veteres lieñem absumendi validam vim ei attribuunt.
Teucrium majus Pannonicum *v.* *Chamædry*s falsa ma-
 xima.

Alpinum cisti flore *v.* *Chamædry*s.

Thalictrum angustissimo folio *Park.* pratense angustif. fo-
 lio *C. B. Prodr.* Ad fluvium *Lycum* propè Augustam
Vindelicorum in Germania.

Thalictrum majus Hispanicum *Ger. emic.* majus album
Hispanicum Park. maj. folliculis angulosis, caule levi
f. B. 4, sive majus florum, staminulis purpurascens
C. B. In sylvis Juræ montis circa *Thuiri*.

Thapsia latifolia Hispanica *Park.* latifolia Clusii *Ger.*
Thapsia 1 Clusii latifolia, flore luteo, semine lato, si-
 milis *Seseli* Peloponnensi *Lobelii f. B.* An *Thapsia* si-
 ve *Turbith* Garganicum semine latissimo ejusdem ?
Messanæ pro *Turbith* utuntur hac planta, ut rectè no-
 tat Imperatus. *v. f. B.* *Messanæ* in lingua sæpius me-
 morati.

N. Hæc planta violenter admodum purgat, ideoque
 in ea exhibenda cauto opus est. *Messanenses*, ut dictum,
 pro *Turbith* eâ utuntur, cujus vires notæ. *v. Schrode-*
rum & alios.

Thlaspi clypeatum hieracifolium majus *Park.* biscutatum
 asperum hieracifolium & majus *C. B.* clypeatum *Lobe-*
lii Ger. *Lunaria* biscutata *f. B.* In Germania, Italia,
 Sicilia & Gallia variis in locis.

Thlaspi minus clypeatum *Ger.* clyp. minus *Serpylli* folio
Park. clyp. *Serpylli* folio *C. B.* *Lunaria* peltata mini-
 ma, quibusdam ad *Thlaspi* referenda *f. B.* Circa *Mon-*
spelium sed rarius.

Thlaspi Candix *Ger.* umbellatum Creticum Iberidis folio
C. B. Creticum quibusdam floré rubente *f. B.* In sylvis
 montosis propè *Salernum* in Regno Neapolitano, & *Vi-*
terbum in Etruria.

Thlaspi umbellatum arvense amarum *f. B.* umbellatum
 arvense Iberidis folio *C. B. Park.* *Thl.* amarum *Ger.*
 Inter segetes in monte *Saleva*; & circa *Thuiri* duabus à
Geneva leucis copiosè.

Thlaspi

Thlaspi umbellatum Nasturtii folio Monspeliacum *C. B. Park.* umbellatum Narbonense *Ger.* umbellatum, tenuiter diviso folio, amarum Narbonense Lobelii *J. B.* In agris *Castris novi* Monspelio vicinis, & alibi circa Monspelum.

Thlaspi spinosum *Ger.* spinosum fruticosum *Park. C. B.* Leucium spinosum, sive *Thlaspi spinosum* aliis *J. B.* In summis rupibus montis Lupi, tribus Monspelio leucis distantis.

Thlaspi capsulis sublongis incanum *J. B.* fruticosum incanum *Ger. C. B.* incanum Mechliniense *Park.* In agro Romano abundat, ad hyemem usque florens.

Thlaspi Narbonense Centunculi angusto folio *Ad.* Narbonense Lobelii *Ger.* Nasturtium vel *Thlaspi maritimum* *J. B.* *Thlaspi.* Alysson dictum maritimum *C. B.* Ad Mare Mediterraneum ubique feré.

Thlaspi minus quibusdam, aliis Alysson minus *J. B.* *Thl.* Alysson dictum campestre minus *C. B.* *Thlaspi arvense minus luteum* *Park.* *Thlaspi Græcum* *Lob.* Circa Genevam in glareosis passim, atque etiam circa Moguntiam, & Monspel.

Thlaspi oleraceum *Tab.* rotundifolium *Ger.* arvense perfoliatum majus *C. B.* *Park.* Bursa pastoris, foliis Perfoliatæ *J. B.* Circa Bresciam in Italia & Genevam in Gallia.

Thlaspi Alpinum minus capitulo rotundo *C. B. Park.* petrum minus *Ger. emac.* petrum myagryodes *Pona.* In rupibus humidioribus montium Juræ & Salevæ.

Thora Valdensis *Ger.* Phthora folio Cyclamini *J. B.* Aconitum pardalianches II, seu Thora minor *C. B. Park.* itemque I, seu Thora major eorundem. Non enim concesserim has duas specie differre. In altissimis jugis montis Juræ propè *Thuri.*

Thymelæa *Ger. Park.* foliis Lini *C. B.* Monspeliaca *J. B.* In Italia & Gallia Narbonensi, agris depressioribus, inter alios frutices passim.

N. Hujus plantæ fructum coccum seu Granum Gnidium vocant herbarii peritiores. Ast Officinis nostris Mezerei Germanici baccæ Cocci Gnidii appellantur, monente Schrodero. Cocco Gnidio vis ardens est & fauces adurens, Unde mirum nobis videtur quod scribit Clusius, Fructu *Thymelææ* maturo & rubro Perdices & aviculas avidissimè vesci.

Thymelæa minor Cordi *J. B.* *Thymelææ* affinis facie externa *C. B.* *Thymelæa minor* sive Cneorum Matthioli *Park.* In Germania circa Basileam & alibi.

H h h

Thy:

Thymelæa quædam incana Genevensis. In sylvosis rupibus ad latera montis Salève ex parte quæ Genevam respicit, è saxorum fissuris.

Thymelæa tomentosa v. Sanamunda.

foliis candicantibus v. Tarton-raire.

Thymum Creticum Ger. Creticum sive Antiquorum *J.B.*

Thymus capitatus, qui Dioscoridis *C.B.* Thymum legitimum capitatum *Park.* In saxosis prope Syracusas.

Thymum durius Ger. durius vulgare *Park.* vulgare rigidius folio cinereo *J.B.* vulgare folio tenuiore *C.B.* In Gallia Narbonensi vix alia communior planta.

N. Usus hujus herbæ præcip. in affectibus Tartareis, (1.) Pulmonum, ut Asthmate, tussu. (2.) Artuum, ut Podagræ: omnia viscera referat, appetitum excitat. Extrinsecus in tumoribus frigidis, sugillationibus, inflationibus ventriculi, doloribus arthriticis, *Schrod.*

Tithymalus folio longo glauco, caule rubro, seminibus verrucosis. Prope Messanam. Elatior & major est multo Tithymalo verrucofo vulgari.

Tithymalus arboreus *Park.* dendroides *J.B.* dendroides ex codice Cæsareo Ger. dendroides, Italici *Tithymalo arboreo Lob.* myrtifolius arboreus *C.B.* Sed cur appellat myrtifolium, cum folia ejus magis accedant ad Mezereon Germanicum? In montosis non longè à Massa prope Salernum, & alibi in Italia, ubi in magnum & lignosum fruticem adolefcit.

Tithymalus non acris flore rubro *J.B.* Esula sive Pityusa III, i.e. Tithymalus montanus non acris *C.B.* qui huc refert Esulam dulcem Tragi, & Pityusam, sive Esulam minorem alteram floribus rubris *Lob. Ger. Park.* Planta quam volumus optimè descripta est à J. Bauhino: olim nobis missa fuit Londino sub titulo *Apios tuberosa radice.*

Tithymalus myrsinites *Lob. J.B. Park.* myrtifolius latifolius Ger. Figura quam Gerardus exhibet pro Tith. myrtifolio latifolio, Parkinsonus dat pro myrsinite incano. Tith. myrsinites latifolius *C.B.* Juxta arcem Rhegii in Calabria.

Tithymalus myrsinites angustifolius *C.B. Ger.* Parkinsonus hujus iconem ponit pro Tithymalo myrsinite *Lob.* Verùm hæc duæ plantæ specificè inter se differunt: hæc enim minor est, sed tamen erectior priorè: Folia habet angustiora & crebriora; bene etiam respondet figuræ Lobelianæ. Invenimus prope Massiliam ubi & Tragacantham, juxta mare.

Tithymalus

Tithymalus pineus Ger. foliis Pini, fortè Dioscoridis *Pityusa* C.B. *Pityusa*, *Tithymalus pineus*, sive *Esula minor* Park. *Tithymalo cyparissæ* similis, *Pityusa* multis J.B. *Crepidines* sabulosæ fluminum & vicini colles frequentius hunc alunt, inquit J.B. quod & nobis experientia confirmat, nam in locis similibus secus Rhenum copiosum vidimus.

Tithymalus Amygdaloides sive *characias* J.B. *characias* II, sive *rubens peregrinus* C.B. *characias* *Monspeliensium* Ger. Park. In saxosis circa *Monspelim*, quin & in Italia circa *Lericium*, & alibi sæpius nobis conspectus.

Tithymalus serratus *Dalechampii* J.B. *characias serratus* Ger. *characias* folio serrato C.B. *char. serratus* *Monspeliensium* Park. In Gallia *Narbonensi* passim & copiosè; circa *Nemausum*, *Monspelim*, &c.

Tithymalus verrucosus J.B. *verrucosus* *Dalechampii* Park. *myrsinites*, fructu verrucæ simili C.B. Circa pagum *Thurii* duabus à Geneva leucis, quin & in Germania aliquoties eum invenimus.

Tithymalus magnus multicaulis, sive *Esula major* J.B. *Pityusa* sive *Esula* II, i.e. *Tithymalus palustris fruticosus* C.B. *Esula major Germanica* Ger. Park. In Germania ad Rhenum copiosissimè; circa *Genevam* quoq; & in planis campis agri *Lugdunensis*, per quos *Genevæ* *Lugdunum* iter est.

Tithymalus palustris *Pisanus*. An *Tithym. myrsinites* incanus herbariorum? Frequens in paludibus *Pisanis*, unde non dubito hanc esse quam intelligit *Cæsalpinus* per suum *Tithymalum palustrem*. Folia ejus hirsuta sunt, & ad *Tithymali characiæ amygdaloides* nostratis folia accedunt.

Tordylium minus v. *Caucalis minor pulchro semine*, *Trachelium parvum* folio *Bellidis* subrotundo. Radix ei alba, simplex, lignosa, annua: Caulis erectus, striatus: Folia alternatim posita, subrotunda, sine pediculis caulibus adnexa. Flores *Trachelii majoris*. Circa *Messanam*.

Trachelium Alpinum &c. v. *Echium Alpinum luteum*.

Tragacantha C.B. vera Park. *Massiliensis* J.B. *Tragacantha*, sive *Spina hirci* Ger. Ad latera montis *Ætnæ*, 14 supra *Cataniam* milliaribus, prope nivis repositoria. Circa *Massiliam* ad maris litus. Fortè tamen *Massiliensis* ab *Ætnæ* specie differt.

N. E radice hujus plantæ incisa, vel (ut alii volunt) sponte sua exudat gummi *Tragacantha* pariter dictum;

H h h 2

etjus

cujus usus præcip. ad tussim inveteratam, fauces exasperatas, retusas voces, cæterâsq; destillationes (cum melle fit linctus, subditurve linguæ ut lique scat) contra renum dolorem & vesicæ rosiones (in passo vel brodio) in dysenteria. Extrinsecus ad dysenteriam in clysteribus, ad rubedinem & acres destillationes oculorum (soluta in aqua rosacea vel lacte) ad palpebrarum scabritiem. Dof. 3j. *Schrod.*

Tragium v. Androsæmum foetidum.

Tragorchis v. Orchis.

Tragopogon perenne, sive Scorzonera fol. angustis incanis, floribus dilutè purpureis. In insula ad Prom. Pachynum.

Tragos sive Uva marina major herbariorum *Lob.* Uva marina major *Ger.* Tragos sive Uva marina major *J.B.* Polygonum bacciferum maritimum majus *C.B.* In Sicilia prope *Punto Cerciolo*, ubi humanam altitudinem æquat. Polygonum bacciferum sive Uva marina major *Park.*

Tragos sive Uva marina minor *J.B.* Uva marina minor *Ger.* Polygonum bacciferum maritimum minus *C.B.* Polygonum bacciferum minus, sive Uva marina minor *Park.* In arenosis litoribus prope montem Ceti & Frontignan, atq; etiam in saxosis collibus vicinis.

Tribulus terrestris *J.B. Ger. Park.* terrest. ciceris folio, fructu aculeato *C.B.* In Sicilia, Italia & Gallia Narbonensi passim. Serius & sub Autumnum florèt.

Trifolium bituminosum *Ger.* Asphaltites sive bituminosum *Park.* bitumen redolens *C.B.* Asphaltites sive bituminosum odoratum *J.B.* In Italia, Sicilia & Gallia Narbonensi, in saxosis collibus non procul à mari.

Trifolium Alpinum argenteum *Park.* Alpinum argenteum, Persici flore *C.B.* In præruptis altissimorum montium max. Carthusianorum cœnobio imminetum.

† Trifolium capitulis globosis sine pediculis caulibus adnatis. Circa Messanam Siciliæ metropolin alteram. Hanc speciem nuper invenimus in agro Suffolciensi.

Trifolium cochleatum echinatum, peltatum, orbiculatum, &c. v. Medica.

Trifolium fragiferum sive vesicarium floribus nitidis rubellis. Circa Liburnum portum & alibi in Italia. Non longè absumile est, imò fortè idem Trifolio folliculaceo sive vesicario minori purpureo *J.B.*

Trifolium fruticans v. Polemonium.

Trifolium pratense album à Fuchsio depictum sive mas *J.B.* Alii Botanici speciem hanc cum Trifolio albo vulgari confundunt, à quo tamen diversissima est. Circa Genavam in pascuis & ad agrorum margines,

Tri-

Trifolium stellatum C.B. stellatum Monspelienſium Park.
stellatum purpureum Monſpeſulanum J.B. Ad radices
Veſuvii montis copioſe; nec minus circa Meſſanam in
Sicilia, & Monſpelium in Gallia Narbonenſi.

Trifolium annuum erectum capitulis è glumis acroſis con-
ſtatis. Hanc ſpeciem in Regno Neapolitano ad maris
litus collegi, cum Meſſanâ Neapolin redirem.

Tripolium minus J.B. C.B. Park. minus vulgare Ger. Ad
mare prope Monſpelium. Omnibus ſuis partibus noſtrate
minus eſt.

Tubera J.B. Park. Tuber C.B. Tubera terræ Ger. Truffles.
Tartuſali the Italians call them. Hæc quamvis è terra
ipſi nunquam eruimus, quia tamen tum in Lombardia
tum alibi in Italia & Gallia ex agris vicinis petita nobis
in cibis appoſita ſunt, noluimus omittere. Sunt autem
tubera magnè hodie in pretio apud gulæ proceres,
tum ſaporis gratiâ, tum maxime quòd Veneris incentiva
ſint.

N. Ratio ſeu modus quo (ut nobis relatum eſt) ruſtici
tubera exquirunt, aut ſi vis venantur, perridiculus eſt:
Porcellum ſcilicet funiculo ad alterum pedem alligato
præ ſe agunt in pascua ubi horum proventum eſſe norunt,
qui ubi ad locum venit in quo tuber latitat, odore mox
id percipit, roſtroq; è terra eruit, erutum qui inſequun-
tur ſurripiunt, & ad aliâ indaganda porcellum abigunt.
Tuſſilago Alpina Ger. emac. Alpina minor folio rotundo
J.B. II, ſive Alpina rotundifolia glabra C.B. Alpina
folio glabrò Park. In Alpiſbus Stiſiâcis primò, poſt in
monte Jura eam invenimus.

Tuſſilago Alpina folio longo J.B. Alpina folio oblongo
Park. IV, ſive Alpina folio oblongo C.B. In montis
Juræ partibus altiffimis Thuri & Dole dictis. Hæc planta
Alifſmæ Matthioli ſive Plantagini Alpinæ dictæ perſimi-
lis eſt, non tamen eadem, & ad Doronica potius quàm
ad Tuſſilagines referri debet.

Typha minor J.B. minima Park. paluſtris minor C.B. Hanc
plantam in eodem loco in quo olim Lobelius, nimirum
ad flu. Arve prope Genevam inveni. Cum primò eam
obſervavi perexigua fuit, clavâ gracili, unde minime
tum dubitavi quin diſtincta ſpecies eſſet: poſtea verò
caput cylindraceum elavatum in tantam intumuit craſſi-
tatem, ut pieritò dubitaverim, annon ipſius parvitas loco
potius (ſiquidem extra aquam crevit) quàm plantæ na-
turæ imputanda eſſet.

V

- V** Accaria *Ger. v.* Lychnis segetum rubra.
 Vaccinia *v.* Vitis Idæa.
 Valeriana rubra Dodonæi *Ger. Park.* rubra *C. B.*
 latifolia rubra *f. B.* Ocymastrum Valerianthon *Lob.*
 Messianæ in muris antiquis : in Italiæ quoque locis plurimis è muris & saxis erumpit.
 Valeriana rubra angustifolia *C. B. f. B.* Ubi J. Bauhinus eam invenit ibi & nos quoque, nimirum Nantur Sabaudorum, in colle extra portam quæ itur Lugdunum, ad dextram. Provenit quoque copiosè in rupibus montis *Lupi*.
 Valeriana Mexicana *Ger.* Indica sive Mexicana *Park.* peregrina seu Indica *f. B.* Valerianella echinata *C. B.* Circa Messianam Siciliæ copiosè.
 Valeriana Alpina *f. B. XI,* sive Alpina altera *C. B.* Alpina major sive latifolia *Park.* In monte *Salve* supra Carthusianorum cœnobium.
 Valeriana Alpina altera foliis integris, inodora, An Alpina prima *C. B.?* In montibus circa Genevæ copiosè.
 Valeriana pumila supina serpyllifolia. In rupibus maritimis Regni Neapolitani. Ostensa mihi fuit postea Venetiis à Joanne-Maria Ferro pharmacopœo botanico peritissimo, pro Caprifolio n. d. rectius tamen meo judicio ad Valerianas refertur.
 Verbascum latis Salviæ foliis *C. B.* Matthioli *Ger. sylv.* salvisolium exoticum folio rotundiore *f. B.* Salvia fruticosa lutea latifolia, sive Verbascum sylvestre quartum Matthioli *Park.* Circa Tauromenium in Sicilia.
 Verbascum angusto Salviæ folio *C. B. Ger.* Monspeliense flore luteo hiantè *f. B.* Salvia fruticosa lutea angustifolia, sive Phlomis lychnitis Dioscoridis Clusio *Park.* In collibus saxosis circa Monspelium.
 Verbascum crispum & sinuatum *f. B.* laciniatum *Park.* nigrum VI, sive nigrum folio Papaveris corniculati : &
 Cam.

Cam. *C. B.* In Italia ad vias passim. *J. Bauhin* circa
 Monipelum; nos illud ibi non observavimus.

Vermicularis v. Sedum.

Veronica saxatilis f. B. fruticans serpyllifolia Ger. fortè,
Alpina frutescens C. B. malè, non enim fruticat hæc,
 minor *Alpina Park.* qui distinguit *Alpinam* suam mino-
 rem à *Veronica fruticante.* Pro *Veronica min. Alpina*
 ponit figuram fruticantis serpyllifoliæ *Ger.* proque fru-
 ticante sua aliam exhibet iconem: & meâ quidem sen-
 tentiâ, rectè separat *Veronicam fruticantem Clusii* ab
Alpina minima serpyllifolia Pona. Nostra hæc de qua
 agimus non omnino fruticat, sed exigua est & herbacea
 semper. Attende descriptionem *f. B.* In summis jugis
 montis *Juræ* circa *Thuri.*

Veronica saxatilis parva caulibus nudis. In pascuis in sum-
 mitate montis *Juræ.* An planta hæc à quoquam descri-
 pta sit mihi nondum est compertum.

Vicia sylvatica maxima Piso sylvestri simills. f. B. In syl-
 vosis in ascensu montis *Salevæ*, ab eo latere quod *Gene-*
vam spectat.

Vicia seu Lathyrus gramineus flore coccineo. Ad radices
 montis *Vesuvii* non longè à mari: necnon circa *Gene-*
vam inter segetes.

Vicia maritima multiflora alba Messanenfis. In *Sicilia*
 circa *Messanam* & alibi ad maris litus.

† *Vicia luteo flore sylvestris f. B.* Circa *Liburnum* & alibi
 in Italia inter segetes.

Victorialis longa Clus. *Allium Alpinum f. B.* *Alpinum la-*
tifolium, seu *Victorialis Ger.* *anguinum Park. IX,* sive
montanum latifolium maculatum C. B. In summis jugis
 altissimorum montium max *Carthusianorum cœnobio*
proximorum & velut imminetium.

Vinca pervinca v. Clematis daphnoides.

Viola bulbosa v. Leucoium bulbosum.

Viola martia lutea Ger. Park. f. B. martia VII, sive *Al-*
pina rotundifolia lutea C. B. In suprema parte montis
Juræ circa *Thuri.*

Viola lunaris longioribus filiquis Ger. lunaria III, sive
 major filiquâ oblongâ *C. B.* *Lunaria major filiqua lon-*
 giore *f. B.* In montibus *Salevæ & Jura,* sed parcius.

Viola matronalis flore purpureo Ger. matronalis, sive Hes-
peris hortensis C. B. Hesperis f. B. Cùm à *Salerno*
Neapolin iter facerem, hanc in pratis observavi.

Vifnaga f. B. Matth. Lob. Vifnaga, Gingidium appella-
tum Park. Gingidium Hispanicum Ger. Gingid. um-
bellâ

bellâ longâ *C. B.* In pratis quibusdam non longè à *Miravalle*, secus viam quæ *Monspelio* *Frontignanam* ducit; copiosè etiam in *Etruriæ* agris, & circa *Cataniam* *Siciliæ*.

N. *Pediculi* seu *umbellarum* radii pro *dentiscalpiis* multis in usum veniunt, præcipuè *Hispanis*, ob rigiditatem suam & suaveolentiam: undè & nostratibus *Spanish Picktooth* appellatur.

Vitex v. *Agnus castus.*

Vitis *Idæa* foliis carnosis & velut punctatis, sive *Idæa* radix *Dioscoridis C. B.* Radix *Idæa* putata, & *Uva ursi f. B.*

Uva ursi *Galenii* *Clusio Park.* *Vaccinia ursi*, sive *Uva ursi* apud *Clusium Ger. emac.* In montibus. *Salve* & *Jura* *Genève* vicinis, itemque in colle *La Bastie.*

Vitis Idæa v. *Diospyros.*

Ulmaria major *v.* *Barba capræ.*

Unifolium v. *Monophyllum.*

Uva crispa Ger. Dod. Lob. crispa, sive *Grossularia f. B.* *Grossularia vulgaris Park.* *Grossularia simplicis* acino, vel spinosa sylvestris *C. B.* Per totam *Helvetiam* in sepibus vulgarissima. In *Sicilia* studiose in hortis colitur, & pro planta rara, ostensa nobis fuit. Amat enim frigidos tractus; in calidioribus minùs frequens est.

N. *Uvæ* crispæ immaturæ refrigerant, undè febricitantibus & cholericis utiliter exhibentur, sitim sedant; astringunt quoque, unde ad omne ventris profluvium & hæmorrhagiam quamcunque conducunt; Urinam insuper ciere, & calculo aut arenulis laborantibus prodesse dicuntur. Saccharo conditæ gratâ suâ aciditate appetentiam conciliant, & febriles ardores restinguunt. Concinantur & in placentas cupediarum & scitamentorum vice; vulgò *Tartas* vocant.

Uva marina v. *Tragos.*

Ursi v. *Vitis Idæa.*

X

X Ylon v. Gossipium.
 Xeranthemum *f. B.* Jacea Olex folio; flore minore *C. B.* Ptarmica Imperati sive minor *Park.*
 Ptarmica Imperati, An Ptarmica Austriacae species *Clus.?* cur. post. *Ger. emac.?* Primò eam observavimus in *Arni* fluminis alveo propè Florentiam; postea etiam circa Monspelium.

Z

Z Acyntha v. Cichorium verrucarium;
 Zea monococcus v. Briza.
 Zizipha sylvestria *f. B.* Ziziphus sive Jujuba sylvestris *Park.* Jujuba sylvestris *C. B.* In rupibus ad *Tropiam* Calabriz urbiculum copiosè.

Explicatio

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...
 5. Die ...
 6. Die ...
 7. Die ...
 8. Die ...
 9. Die ...
 10. Die ...

2

1. The first of these is the fact that the
2. second of these is the fact that the
3. third of these is the fact that the
4. fourth of these is the fact that the
5. fifth of these is the fact that the
6. sixth of these is the fact that the
7. seventh of these is the fact that the
8. eighth of these is the fact that the
9. ninth of these is the fact that the
10. tenth of these is the fact that the

Explicatio Nominum abbreviatorum.

- A** *D. & Ad. Lob.* Adversaria Penæ & Lobelii.
C. B. Caspari Bauhini Pinax.
C. B. Prod. Caspari Bauhini Prodrömus.
Cæs. Cæsalpinus.
Cam. Camerarius.
Cat. Ang. Catalogus Plantarum Angliæ.
Clus. & Clus. hist. Caroli Clusii historia.
Col. Fabius Columna.
Dod. Dodonæus.
Fuch. Leonardus Fuchsius.
Ger. & Ger. emac. Jo. Gerardi historia emaculata à
 Tho. Johnson.
Gesn. Conradus Gesnerus.
Hort. Pat. Hortus Medicus Patavimus.
J. B. Joannes Bauhinus Caspari frater.
Lob. ob. Lobelius in Observationibus. *Lob. ico.* Idem
 in iconibus à Plantino editis.
Lon. Adamus Lonicerus.
Lugd. Historia Lugdunensis.
Matth. Matthiolus in Dioscoridem.
Park. Jo. Parkinsoni Theatrum Botanicum.
Park. parad. Ejusdem Paradisus terrestris seu Hortus.
Schrod. Schroderus in Pharmacopœa Medico-chy-
 mica.
Tab. Tabernæmontanus.
Thal. Thalius in Hærcynia.
Trag. Hieronymi Tragi historia.
 Nota hæc † cuicumque plantæ præfigitur indicat illam
 in Anglia sponte provenire.

F I N I S.